

الجمهورية التونسية

وزارة التربية

رياضيات

لتلامذة السنة الثامنة من التعليم الأساسي

تأليف

عبد السلام الحبشي

متفقد أول

علي الرحموني

متفقد أول

فوزي الغربي

أستاذ أول

محمد طارق السلطاني

متفقد

تقييم

نجيبة محمدى

متفقدة

الطاھر الدرقاو

متفقد

المركز الوطني البيداغوجي

مقدمة

يسّرنا أن نضع بين أيديكم هذا الكتاب آملين أن يكون مساعدا على إكساب المتعلم المهارات التي تستهدفها برامج المادة. وهو يتكون من محاور قدم أغلبها وفق التّمثي التالي:

* **أستحضر**: مجموعة أنشطة تساعد المتعلم على استحضار المكتسبات الضّروريّة ذات العلاقة بالمحور.

* **أستكشف وأطبق**: مجموعة أنشطة تمكن من مقاربة المفاهيم الجديدة وتركيزها.

* **تمارين مرفقة بحلول**: مجموعة تمارين تهدف إلى تدريب المتعلمين على :

- اختيار تمثيّات ملائمة.
- توخي منهجهية عمل ناجعة.
- صياغة حلول.

* **أحصل**: ملخص لأهم المفاهيم والخاصيات والقواعد المدرّوسة.

* **التمارين** : مجموعة تمارين تساعد المتعلم على استيعاب المفاهيم المدرّوسة وتوظيفها في وضعيات مألوفة أو غير مألوفة وتستنفر معارفه ومهاراته في حل المسائل.


أملنا أن يكون هذا الكتاب مساعدا للّطلّاب في دراسته وسندًا للأستاذ في عمله. وفي الختام نشكر عضوي لجنة التقييم الذين واكبوا هذا العمل وساهموا في إثرائه بلاحظاتهم القيمة. كما نشكر كافة أعضاء المركز الوطني البيداغوجي على المجهودات التي بذلوها لإنجاز هذا المؤلّف.

المؤلفون

الفهرس

5	أنشطة في الحساب	.1	أنشطة عدديّة
16	الأعداد الكسرية النسبية	.2	
30	الجمع والطرح في مجموع الأعداد الكسرية النسبية	.3	
42	الضرب والقسمة في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية	.4	
55	القوى في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية	.5	
69	أنشطة حول العبارات الحرفية	.6	أنشطة جبرية
78	معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد	.7	
89	التناسب	.8	
105	أنشطة حول الإحصاء والاحتمالات	.9	
127	التناظر المركزي	.10	أنشطة هندسيّة
150	الزوايا الحاصلة عن تقاطع مستقيم ومستقيمين متوازيين	.11	
165	المثلثات المتقاييسة	.12	
182	رياضيات الأضلاع	.13	
202	الهرم والمخروط والكرة	.14	
215	التواري في الفضاء	.15	

أنشطة في الحساب



الخوارزمي

إذا ذكر علم الجبر ذكر الخوارزمي لأنّه مؤسس هذا العلم وأول من ألف فيه وفي علم الحساب والجداول الفلكية وهو أول من استعمل علم الجبر بشكل مستقل عن الحساب وفي قالب علمي، والخوارزمي هو محمد بن موسى الخوارزمي الذي ولد بإحدى مناطق آسيا الوسطى عام 780 م (164 هـ) وعاش في بغداد وتوفي بها عام 850 م (235 هـ) ويطلق علماء أوروبا على القرن الثالث هجري "عصر الخوارزمي" باعتباره أعظم رياضي في هذا القرن، بل يعتبره علماء الغرب أحد أعظم الرياضيين في كل العصور.

المجلة العربية العلمية للفتيا

قم للمعلم وفه التجليل

كاد المعلم أن يكون رسولا

أحمد شوقي

قابلية القسمة على 4 ، 25 ، 8

استحضر

يكون العدد الصحيح
الطبيعي المخالف للصفر b
casama للعدد الصحيح
الطبيعي a إذا كان a قابلاً
للقسمة على b أي إذا كان
باقي القسمة الإقليدية للعدد a
على b يساوي صفراء.
في هذه الحالة نقول أيضاً أنّ
مضاعف لـ b .

عدد أولي هو عدد صحيح
طبيعي أكبر من 1 ولا يقبل
القسمة إلا على 1 وعلى نفسه

كيف يمكن اختيار العدد a ليكون $\frac{a}{6}$ عدداً صحيحاً؟

1

قياس مساحة مستطيل بالصنتيمتر المربع تساوي 24 ما هي أبعاد هذا المستطيل إذا علمت أنها أعداد صحيحة طبيعية؟

2

في كل حالة من الحالات التالية عوض الرمز (*) بما يناسب
الحصول على عدد صحيح طبيعي

$$\frac{31}{*}, \quad \frac{13}{*}, \quad \frac{7}{*}, \quad \frac{15}{*}$$

3

بدأ أحمد ومحمد وعلي في ترتيب الأعداد الصحيحة الطبيعية الأصغر من 1000 في جداول مبنية
كما يلي :

4

القسمة الإقليدية للعدد الصحيح

الطبيعي a على العدد الصحيح
الطبيعي المخالف للصفر b تعني
كتابة a على شكل $bq+r$ حيث
 q عدد صحيح طبيعي و r عدد
صحيح طبيعي أصغر قطعاً من b
 a يسمى المقسم و b يسمى القاسم
و r خارج القسمة و b باقي القسمة

جدول على	جدول محمد	جدول أحمد
5 4 3 2 1	5 4 3 2 1	3 2 1
6 7 8 9 10	10 9 8 7 6	6 5 4
15 14 13 12 11	15 14 13 12 11	9 8 7
16 17 18 19 20	20 19 18 17 16	12 11 10
.....

- (أ) في أي عمود يوجد العدد 97 بالنسبة لكل جدول من الجداول الثلاثة
 (ب) في أي عمود يوجد العدد 574 بالنسبة لكل جدول من الجداول الثلاثة
 (ج) هل يوجد عمود مشترك بين جدول محمد و جدول علي؟ حدهه و ميزه
 (د) هل توجد أودية مشتركة بين جدول محمد و علي؟ ما ترتيب هذه الأودية

5

- (1) فك كل عدد من الأعداد التالية 56 ، 95 ، 225 ، 490 إلى جذاء عوامل اولية
- (2) ابحث عن ق.م.أ (56,490) و م.م.أ (95,225)
- (3) اختزل إلى أقصى حد الأعداد الكسرية التالية $\frac{95}{225}$ و $\frac{56}{490}$

انقل الجدول التالي و اتمم تعميره

6

9	5	3	2	يقبل القسمة على
نعم			لا	207
				330
				540
نعم	نعم	نعم	نعم	7..

7

- أ) عوض في كل حالة العلامة * بالرقم المناسب لكي يكون العدد قابلاً للقسمة على 2 و 3 في نفس الوقت 7*68 ; 345* ; 180 * (أعط جميع الحلول الممكنة)
 ب) أوجد كل الأعداد الممحضورة بين 800 و 900 و القابلة للقسمة على 5 و 9 .

استئناف وأطريق

قابلية القسمة على 4

نشاط 1

- (1) من بين الأعداد الأصغر من 100 اذكر تلك التي تقبل القسمة على 4
- (2) أقارن باقي قسمة 2768 على 4 و باقي قسمة 68 على 4
 ب) انقل وأكمل الجدول التالي :

العدد	باقي القسمة على 4
40	
440	
81	
1681	
75	
875	
68	
2768	

1) انقل و اتمم الفراغات بما يناسب 2

$$4527 = \dots \times 100 + 27 \quad 265 = \dots \times 100 + 65$$

$$71845 = \dots \times \dots + \dots \quad 35291 = \dots \times 100 + 91$$

(2) أكتب العدد 17143 على شكل مجموع عددين $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 100 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 100. ماذا تمثل أرقام العدد b بالنسبة للعدد 17143

(3) قارن باقي قسمة 17143 على 4 وبباقي قسمة 43 على 4

(4) تعتبر الأعداد التالية 657 ، 375700 ، 1152 ،

أ) اكتب كل عدد من هذه الأعداد على شكل $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 100 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 100

ب) بالنسبة لكل عدد من الأعداد السابقة قارن بين باقي قسمته على 4 وبباقي قسمة العدد b الموافق له على 4.

يكون عدد (أكبر من 99) قابلاً للقسمة على 4 إذا كان العدد المكون من رقميه الآخرين (رقم الآحاد ورقم العشرات)

قابلاً للقسمة على 4

باقي قسمة عدد على 4 هو نفس باقي قسمة العدد المكون من رقميه الآخرين على 4.

تطبيقات

(1) أ- اذكر من بين الأعداد التالية تلك التي تقبل القسمة على 4

2131404 ، 71 ، 235348 ، 12345678 ، 10254324 ، 275

ب- ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد السابقة على 4

(2) عوض في كل حالة الرمز * بما يناسب ليكون العدد المتحصل عليه قابلاً للقسمة على 4

2586482*8 ، 7347*8 ، 340* ، 18*4

تمرين مرفقة بحل

ضع رقماً مكان كل نقطة لكي يصبح العدد قابلاً للقسمة في نفس الوقت على 4 و 5 و 9
(أعط جميع الحلول الممكنة)

الحل :

(1) ليكون 60*8 قابلاً للقسمة على 5 يجب أن يكون رقم آحاده 0 أو 5 وفي هاتين الحالتين فإن العدد المكون من رقميه الآخرين هو 60 أو 65

- * ليكون $60 \cdot 8$ قابلاً للقسمة على 4 يجب أن يكون العدد المكون من رقميه الأخيرين قابلاً للقسمة على 4 فإذا فإن العدد هو $80 \cdot 60$
- * ليكون $60 \cdot 8$ قابلاً للقسمة على 9 يجب أن يكون مجموع أرقامه قابلاً للقسمة على 9 إذن رقم المئات هو 4 العدد المطلوب هو 8460

ملاحظة

تأكد بالرجوع الى القواعد المدرستة أن العدد $60 \cdot 8$ يقبل القسمة على 4 و 5 و 9

(1) باعتماد نفس التمشي بالنسبة للعدد $5040 \cdot 60$ نجد حلين 5040 و 5940

(2) بالنسبة للعدد $73 \cdot 00$ ما هو الحل ؟ تحقق من صحة إجابتك.

قابلية القسمة على 25

نشاط 1 أ) من بين الأعداد الأصغر من 100 اذكر تلك التي تقبل القسمة على 25

ب) قارن باقي قسمة 2538 على 25 وبباقي قسمة 38 على 25

ج) أنقل وأكمل الجدول التالي :

العدد	باقي القسمة على 25
80	
280	
62	
1162	
25	
325	
38	
2538	

نشاط 2

1) أنقل و اتمم الفراغات بما يناسب

$$9537 = \dots \times 100 + 37$$

$$462 = \dots \times 100 + 62$$

$$50875 = \dots \times \dots + \dots$$

$$29219 = \dots \times 100 + 19$$

2) أكتب العدد 7887 على شكل مجموع عدد ين $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي

مضاعف لـ 100 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 100. ماذا تمثل أرقام العدد b بالنسبة للعدد 7887

3) قارن باقي قسمة 7887 على 25 و باقي قسمة 87 على 25

نعتبر الأعداد التالية $675, 1432, 173200, 1537$

4) أكتب كل عدد من هذه الأعداد على شكل $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 100 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 100

ب) بالنسبة لكل عدد من الأعداد السابقة قارن بين باقي قسمته على 25 وبباقي قسمة العدد b المواقف له على 25 .

يكون عدد (أكبر من 99) قابلاً للقسمة على 25 إذا كان العدد المكون من رقميه الأخيرين قبلاً للقسمة على 25 .

باقي قسمة عدد على 25 . هو نفس باقي قسمة العدد المكون من رقميه الأخيرين على 25 .

1

2

3

حدد باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على 25
، 12345678925 ، 33200 ، 2561 ، 73

عوض النقاط بما يناسب ليكون العدد قابلاً للقسمة على 25 و على 3
، 8020 ، 10600

ثمن كتاب هو 10 دنانير و ثمن قلم حبر رفيع هو 15 ديناراً.
اشترى كتبى عدداً من الكتب و مثل ذلك العدد أقلاماً .

ما هو المبلغ الذي يمثل ثمن المشتريات من بين المبالغ التالية
د 3120 ، د 3125 ، د 3130

قابلية القسمة على 8

نشاط 1

(1) ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على 8
، 808 ، 157 ، 94 ، 16

(2) ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على 8
، 6856835112 ، 867112 ، 2112 ، 112

(3) ما هو باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على 8
، 1567567173 ، 236173 ، 5173

نشاط 2

(أ) أكتب العدد 5283 على شكل $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 1000 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 1000

(ب) قارن بين باقي قسمة 5283 على 8 و باقي قسمة العدد b على 8

(2) نعتبر الأعداد التالية 3528 ، 41252 ، 375720

(أ) اكتب كل عدد من هذه الأعداد على شكل $a + b$ حيث a عدد صحيح طبيعي مضاعف لـ 1000 و b عدد صحيح طبيعي أصغر من 1000 .

(ب) بالنسبة لكل عدد من الأعداد السابقة قارن بين باقي قسمته على 8 و باقي قسمة العدد b الموافق له على 8 ماذا تستنتج ؟

يكون عدد (أكبر من 999) قابلاً للقسمة على 8 إذا كان العدد المكون من أرقامه الثلاث الأخيرة (رقم الآحاد و رقم العشرات و رقم المئات) قابلاً للقسمة على 8
باقي قسمة عدد على 8 هو باقي قسمة العدد المكون من أرقامه الثلاث الأخيرة على 8

تطبيقات

- أذكر باقي قسمة كل عدد من الأعداد التالية على 8 :
1. 796864 ، 984 ، 67355 ، 574024 ، 9767439
2. عوض في كل مرة ، النقطة بما يناسب لكي يصبح العدد قابلاً للقسمة على 8
65979243•48 ، 67453•6 ، 4562 •
3. طفل 8 على صغيرة تحتوي كل منها على كويرات بعضها أحمر وبعضها أخضر. عدد الكويرات في هذه العلبة مبين بالجدول التالي :

العلبة 1	العلبة 2	العلبة 3	العلبة 4	العلبة 5	العلبة 6	العلبة 7	العلبة 8
11	10	9	18	28	31	46	62

ضاعت إحدى العلب فأصبح عدد الكويرات الحمراء في السبع علب المتبقية سبعة أضعاف عدد الكويرات الخضراء. ما هو عدد الكويرات الحمراء المتبقية ؟

تمارين مرفقة بحل

تمرين 1

عوض النقطتين بما يناسب لكي يصبح العدد 12571 قابلاً للقسمة على 5 وعلى 8

الحل :

يكون العدد 12571 قابلاً للقسمة على 5 إذا كان رقم آحاده 0 أو 5

الحالة الأولى: رقم الآحاد يساوي 0

يقبل العدد 12571•0 القسمة على 8 إذا كان العدد 1•0 قابلاً للقسمة على 8

الأعداد التي تكتب 0•10 هي 100 و 110 و 120 و 130 و 140 و 150 و 160 و 170 و 180 و 190

نلاحظ أن من بين هذه الأعداد 120 و 160 فقط يقبلان القسمة على 8

إذا العددان هما 1257120 أو 1257160

الحالة الثانية : رقم الآحاد يساوي 5


يقبل العدد 12571•5 القسمة على 8 إذا كان العدد 1•05 قابلاً للقسمة على 8

لا يوجد أي عدد من الأعداد التالية 105 ، 115 ، 125 ، 135 ، 125 ، 145 ، 155 ، 165 ، 175 ، 185 ، 195 ، يقبل القسمة على 8

وبالتالي فإن 1257120 و 1257160 هما العددان الذين يستجيبان للشروطين

تمرين 2

أضلاع الأشكال التالية هي أعداد صحيحة طبيعية



ما هو قيس محيط كل شكل من الأشكال التالية إذا علمت أنه عدد صحيح طبيعي ينتمي إلى المجموعة {292 و 715 و 120 و 279 و 274} وأن الأشكال مساحاتها مختلفة.
ملاحظة : لم يقع اعتماد نفس السلم في رسم هذه الأشكال.

الحل :

- محيط المثلث A هو عدد قابل للقسمة على 3 إذا فهو 120 أو 279
- محيط المربع B هو عدد قابل للقسمة على 4 إذا فهو 120 أو 292
- محيط الشكل C هو عدد قابل للقسمة على 8 إذا فهو 120 (العدد الوحيد القابل للقسمة على 8) ما هما إذا محيط المثلث و محيط المربع ؟
ما هو محيط المستطيل ؟

تمرين 3

بمحطة توزيع وقود 5 خزانات سعتها باللتر كما يلي
760 - 475 - 950 - 640 - 225

خزان واحد مملوء بنزيننا رفيعا وكل خزان من الخزانات المتبقية مملوء إما بترولا أو بنزيننا عادي
حدد السائل الموجود بكل خزان إذا علمت أن كمية البترول ضعف كمية البنزين العادي

الحل :

السعة الجملية لهذه الخزانات هي 3050 لترًا
بما أن كمية البترول هي ضعف كمية البنزين العادي فإن مجموع كميتي البنزين العادي والبترول هو عدد قابل للقسمة على 3
إذا للتعرف على خزان البنزين الرفيع يجب التعرف إلى العدد الذي إذا طرح من 3050 يعطي عددا قابلا للقسمة على 3

استنتج أن كمية البنزين الرفيع هي 950 لترًا
ما هو إذا السائل الموجود بكل خزان من الخزانات المتبقية ؟

أحوصل

- القسمة الإقلية للعدد الصحيح الطبيعي a على العدد الصحيح الطبيعي المخالف للصفر b تعني كتابة a على شكل $a = bq + r$ حيث q عدد صحيح طبيعي و r عدد صحيح طبيعي أصغر قطعاً من b
 a يسمى المقسم و b يسمى القاسم و q خارج القسمة و r باقي القسمة
- يكون العدد الصحيح الطبيعي b المخالف للصفر قاسماً للعدد الصحيح الطبيعي a إذا كان a قابلاً للقسمة على b أي إذا كان باقي القسمة الإقلية للعدد a على b يساوي صفراء
- عدد أولي هو عدد صحيح طبيعي أكبر من 1 ولا يقبل القسمة إلا على 1 وعلى نفسه
- يكون عدد (أكبر من 99) قابلاً للقسمة على 4 إذا كان العدد المكون من رقميه الآخرين (رقم الأحاد ورقم العشرات) قابلاً للقسمة على 4 باقي قسمة عدد على 4 هو نفس باقي قسمة العدد المكون من رقميه الآخرين على 4
- يكون عدد (أكبر من 99) قابلاً للقسمة على 25 إذا كان العدد المكون من رقميه الآخرين قابلاً للقسمة على 25 باقي قسمة عدد على 25 هو نفس باقي قسمة العدد المكون من رقميه الآخرين على 25
- يكون عدد (أكبر من 999) قابلاً للقسمة على 8 إذا كان العدد المكون من أرقامه الثلاث الأخيرة (رقم الأحاد ورقم العشرات ورقم المئات) قابلاً للقسمة على 8 باقي قسمة عدد على 8 هو باقي قسمة العدد المكون من أرقامه الثلاث الأخيرة على 8

نَمَارِيَه

- 1** ضع رقما مكان كل نقطة لكي يصبح العدد قابلا للقسمة على 2 و 5 و 3
7300 ، 5040 ، 8060 .
(أعط جميع الحلول الممكنة)
- 2** ضع رقما مكان كل نقطة لكي يصبح العدد قابلا للقسمة على 8 و 5 و 9
7300 ، 5040 ، 8060 .
(أعط جميع الحلول الممكنة)
- 3** حدد بواسطة الآلة الحاسبة خارج وباقى القسمة
الإقليدية لـ
أ) 267 على 15
ب) 5532 على 235
ج) 33555 على 824
- 4** سأل رجل علي ابن أبي طالب "ما هو أصغر عدد مضاعف في نفس الوقت لـ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10" فأجابه "أضرب عدد أيام الأسبوع في عدد أيام الشهر في عدد أشهر السنة فستجد ما تبتغي" تحقق من مدى صحة هذه الإجابة.
- 5** قطعة أرض مستطيلة الشكل مساحتها بالمتر المربع 900 ومحيطها بالمتر 122 ما هما بعدها إذا علمت أنها أعداد صحيحة طبيعية ؟
- 6** بين أن $2^{2004} + 2^{2006}$ هو عدد قابل للقسمة على 5 وأن $2^{73} + 2^{74} + 2^{75}$ قابل للقسمة على 7
- 7** دون إجراء عملية القسمة أذكر من بين الأعداد التالية التي لها نفس باقي القسمة على 8
81076 ، 8112 ، 623 ، 51228 ، 11623 ، 75368974623 ، 923600
- 8** ثمن كتاب هو 3 دنانير وثمن قلم حبر رفيع هو 5 دنانير اشتري كتبى نفس العدد من هذه الكتب والأقلام ودفع مقابل ذلك 1296 ، ما هو عدد الكتب المشتراء
- 9** ما هي الأعداد القابلة للقسمة على 7 من بين العداد التالية 3500 و 1325 و 507 و 147 و 773 و 77 و 763 ؟
- 10** اخترل إلى أقصى حد الأعداد الكسرية التالية:
 $\frac{36650}{51975}$ ، $\frac{3600}{5400}$ ، $\frac{588}{840}$ ، $\frac{255}{595}$
- 11** ابحث عن أصغر عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر ويقبل القسمة على 3 و 4 و 5 في نفس الوقت هل يقبل هذا العدد القسمة على 15 ؟ هل يقبل هذا العدد القسمة على 20 ؟

12

- 1) نعتبر الأعداد التالية : 5454 ، 2323 ، 3838 ، 1919
ما هو خارج قسمة كل واحد منها على 101 ؟ مازا تلاحظ ؟
- 2) أكتب عدداً ذا رقمين واكتب بجانبه نفس ذاك العدد تتحصل بذلك على عدد ذي أربعة أرقام.
ما هو خارج قسمته على 101 ؟ مازا تلاحظ ؟
فسر ذلك.

13

- (1) نعتبر الأعداد التالية :
748748 ، 103103 ، 351351 ، 512512
ما هو خارج قسمة كل منها على 7 و 11 و 13 و 1001
- (2) أكتب عدداً ذا ثلاثة أرقام واكتب بجانبه ذاك العدد نفسه . تتحصل على عدد ذي ستة أرقام.
ما هو خارج قسمته على 1001 ؟ مازا تلاحظ ؟
فسر ذلك.
- (3) هل يمكنك تعميم ما توصلت إليه ؟.

14

نعتبر العدد $a = 12345679$
باستعمال الآلة الحاسبة أحسب $18a$ ، $27a$ ، $54a$
ما زا تلاحظ ؟ هل بإمكانك تعميم النتيجة وتفسيرها ؟

الأمراض الكنسية النسبية



أبو بكر الرازى

هو طبيب إيراني عاش في بغداد وكان واحداً من الرواد الذين دعوا إلى التحكيم العقلاني في العلم الإسلامي وهو يشبهه في ذلك معاصره الفارابي في ميدان الفلسفة. من أشهر مؤلفاته كتاب "الحاوي" و"الطب المنصوري". كما أن كتابه في الحميات ذات البثور كالحصبة والجدري اعتمد عليه الأطباء زمناً طويلاً. ويعد كتاب الرازى في أمراض الأطفال الأول من نوعه. وقد ترجمت كتب الرازى إلى اللغة الإنجليزية عدة مرات وفي تواريخ مختلفة، وقد أعيد طبع ترجمة كتابه الجدري والحمصة في عام 1745 وظلت كليات الطب الأوروبية تعتمد على كتبه زمناً طويلاً.

المجلة العربية العلمية للفتيان

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت


فإن هم ذهبوا أخلاقهم ذهبوا

أحمد شوقي

الأعداد الكسرية النسبية

استخدم

احسب بالمتر قيس محيط كل شكل من الأشكال التالية




لحساب $9,48 - 7,6$ قدم أربعة تلاميذ الإجابات التالية واحدة منها صحيحة.

. 2,88 ; 2,42 ; 1,88 ; 2,28

(1) ما هي الإجابة الصحيحة من بين الأجوبة المقدمة ؟

(2) هل يمكنك تقديم تفسير للإجابات الخاطئة ؟


إعط بالметр المربع قيمة تقريبية برقمين بعد الفاصل لمساحة كل شكل من الأشكال التالية .




يمثل الشكل التالي مثلثا MNP والارتفاع الصادر من P.

احسب PH إذا علمت ان محيط المثلث MNP يساوي $8,7 \text{ cm}$ وأن مساحته

تساوي $3,564 \text{ cm}^2$



احسب أحجام المجرمات التالية



أحسب :

6

$$7,38 : 12,5 = 101,25 : 4 = 0,32 : 0,6 = 2,38 : 0,9 = 68 : 0,04$$

أحسب :

7

$$(a) 2,513 \times 10 = 120,7 \times 1000 = 0,572 \times 10^4$$

$$(b) 21,34 : 10 = 923,005 : 1000 = 789,1 : 10^6$$

أ) كيف يمكنك إظهار الأعداد التالية على شاشة الآلة الحاسبة بدون استعمال زر الفاصل •

8

ب) اكتب العدد 58,17 على شاشة الآلة الحاسبة. كيف يمكنك استعمال هذا العدد الموجود على الشاشة لإظهار الأعداد التالية 5817,7 ; 5817 ؟

9

وقد السهو عن وضع الفاصل عند كتابة النتيجة في كل جزء من الجذاءات التالية .
وضع الفاصل في المكان المناسب بدون إجراء العملية.

$$13,2 \times 15,6 = 20592 ; 0,25 \times 14,7 = 3675 ; 2,26 \times 3,25 = 7345 \\ 125,33 \times 0,12 = 150396 ; 3,15 \times 1,002 = 35702 ; 253 \times 0,0002 = 00506$$

استكشف وأطبق

الأعداد العشرية النسبية

نشاط

* 13,72 هو عدد عشري

* يسمى الجزء الصحيح لهذا العدد

و 72 يسمى، الجزء العشري، له

* الكتابة $\frac{1372}{10^2}$ أو $\frac{1372}{100}$ هي كتابة

للعدد العشري 13,72 على صورة

$\frac{a}{10^n}$ حيث $a=1372$ و $n=2$

(1) قارن 13,72 و $13 + \frac{72}{100}$ و

(2) ماهما الجزء الصحيح والجزء العشري للعدد 5,432 ؟

أكتب هذا العدد على صورة $\frac{a}{10^n}$

حيث a و n عدد ين صحّيّين طبيعيين

نشاط

أنقل وأتمّ تعمير الجدول التالي :

كتابته على صورة $\frac{a}{10^n}$	الجزء العشري	الجزء الصحيح	العدد
$\frac{1342}{10^2}$	72	13	13,72
$\frac{31}{10}$			
			2,575
	25	0	
	047	3	

18

نشاط 3

أ- أكتب كل عدد من الأعداد التالية على صورة $\frac{a}{10^n}$ حيث a و n عددان صحيحان طبيعيان

$$5,5; \frac{7}{5}; \frac{7}{4}; 13,123$$

ب- استنتج كتابة على صورة $\frac{a}{10^n}$ لكل عدد من الأعداد التالية حيث a و n عددان صحيحان طبيعيان.

$$-13,125 ; -1,4 ; -5,5 ; -0,35$$

نشاط 4

1- نعتبر الأعداد التالية 10^1 و 10^2 و 10^3 و 10^4 و 10^7 و 10^n

أ- فك كل منها إلى جداء عوامل أولية.

ب- ما هي القواسم الأولية لكل واحد منها؟

2- أ- هل يمكن كتابة العدد $\frac{2}{3}$ على صورة $\frac{a}{10^n}$ ؟ هل العدد $\frac{2}{3}$ هو عدد عشري؟

ب- اخترز $\frac{80}{120}$ إلى أقصى حد. هل العدد $\frac{80}{120}$ هو عدد عشري؟

ج- هل العدد $\frac{105}{84}$ هو عدد عشري؟

لتكن $\frac{a}{b}$ كتابة مختزلة إلى أقصى حد لعدد كسري موجب.
يكون هذا العدد الكسري عدداً عشرياً إذا كانت القواسم الأولية
للمقام b هي 2 أو 5 أو 2 و 5

تطبيقات

ما هي الأعداد العشرية من بين الأعداد التالية $\frac{8}{44}$; $\frac{10}{14}$; $\frac{3}{5}$; $\frac{51}{6}$; $\frac{12}{8}$; $\frac{15}{60}$

تمرين مرفق بحل

تعرف، من بين الأعداد التالية، إلى الأعداد العشرية واكتتبها على صورة $\frac{a}{10^n}$ حيث a و n عددان صحيحان طبيعيان $\frac{27}{60}$ ، $\frac{630}{4500}$ ، $\frac{15}{66}$ ، $\frac{21}{24}$

الحل

1) هل العدد $\frac{21}{24}$ هو عدد عشري؟

نختزل أولاً $\frac{21}{24}$ إلى أقصى حد

$$\frac{21}{24} = \frac{3 \times 7}{3 \times 8} = \frac{7}{8} = \frac{7}{2^3}$$

إذن فالكتابية $\frac{7}{8}$ (أو $\frac{21}{24}$) هي كتابة للعدد مختزلة إلى أقصى حد.

* القاسم الأولي للعدد 8 هو 2 إذن العدد $\frac{7}{8}$ (أو $\frac{21}{24}$) هو عدد عشري ويمكن وبالتالي كتابته على صورة

حيث a و n عدوان صحيحان طبيعيان كما يلي:

$$\frac{7}{8} = \frac{7 \times 5^3}{2^3 \times 5^3} = \frac{875}{(2 \times 5)^3} = \frac{875}{10^3}$$

2) هل العدد $\frac{15}{66}$ هو عدد عشري؟

$$\frac{15}{66} = \frac{5}{22} = \frac{5}{2 \times 11}$$

المقام 22 له قاسم أولي يختلف عن 2 و 5 وهو العدد 11 وبالتالي فالعدد $\frac{5}{22}$ (أو $\frac{15}{66}$) ليس عشريا.

3) اعتمد نفس التمثيل بالنسبة للعددين $\frac{27}{4500}$ و $\frac{630}{60}$.

الأعداد الكسرية النسبية

نشاط 1

نعتبر المستقيم المدرج التالي




1) ما هي فاصلات النقاط M و N؟

2) انقل الرسم وعين النقاط O و A و B و C و D و E التي لها الفاصلات التالية

0 و 5 , -2 و 4 و 5 , -3 و 6 , 5

1) تأمل التعين التالي في المستوى



- أ- اكتب إحداثيات كل نقطة من النقاط A و D و G و H
- ب- ما هي النقاط التي لها فاصلات موجبة
- ت- ما هي النقاط التي لها ترتيب سالبة
- ث- انقل وأتم الجدول التالي

الترتيب	الفاصلة	زوج الإحداثيات	النقطة
2	1	(1,2)	B(1,2)
		(-4,1)	
-2	-4		H(,)
		(3,0)	
3	-3		

رموز ومصطلحات

نرمز بـ \mathbb{N} لمجموعة الأعداد الصحيحة الطبيعية

وبـ \mathbb{Z} لمجموعة الأعداد الصحيحة النسبية

وبـ \mathbb{D} لمجموعة الأعداد العشرية النسبية

كما نرمز بـ

\mathbb{Z}^+ لمجموعة الأعداد الصحيحة النسبية الموجبة

$$\mathbb{Z}^+ = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; \dots\} = \mathbb{N}$$

\mathbb{Z}^- لمجموعة الأعداد الصحيحة النسبية السالبة

$$\mathbb{Z}^- = \{\dots ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0\}$$

\mathbb{D}^+ لمجموعة الأعداد العشرية الموجبة

\mathbb{D}^- لمجموعة الأعداد العشرية السالبة

لتكن A و B مجموعتين :

$A \subset B$ يعني كل عنصر من المجموعة A هو

أيضاً عنصر من المجموعة B

$A \not\subset B$ يعني يوجد على الأقل عنصر من

المجموعة A لا ينتمي إلى المجموعة B

لتكن A و B مجموعتين
* اتحاد المجموعتين A و B هي
مجموعه العناصر المنتهية إلى المجموعة A
أو إلى المجموعة B
ونرمز لها بـ $A \cup B$
* تقاطع المجموعتين A و B هي مجموعه
العناصر المنتهية إلى المجموعة A والى
المجموعة B .
ونرمز لها بـ $A \cap B$.

نلاحظ أن كل عدد صحيح طبيعي هو أيضا عدد
صحيح نسبي
نقول أن:
”المجموعه N محتوا في المجموعه Z “ ونكتب $N \subset Z$:
نلاحظ أيضا أن $Z \subset D$

تطبيق

نعتبر المجموعات التالية:

$$C = \{-1; 2; 4\} \quad B = \{-1; 0; 2; 2,25; 3; 4,15; 29; 37\} \quad A = \{2; 3; 15; 29\}$$

(1) انقل واتم بـ $\in, \notin, \subset, \subsetneq$

أ- $2 \dots A$; $A \dots B$; $C \dots B$; $2,5 \dots C$; $A \dots B$; $-1 \dots A$; $C \dots A$
ب- $D \dots Z$; $B \dots D$; $C \dots N$; $A \dots Z$


(2) حدد عناصر المجموعات التالية

$$A \cup B ; A \cap B ; B \cap C ; C \cup A ; C \cap Z -$$

أ- $Z - \cap Z +$; $Z + \cup Z -$; $C \cap N$; $B \cap Z$
ب-

نشاط 3

يمثل الرسم أسفله مستقيما مدرج



- (1) انقل الرسم على كراسك ثم عين النقطة A التي فاصلتها 3,5
- (2) أ- ارسم النقطة A' التي فاصلتها مقابله لفاصلة النقطة A
ب- ما هو من بين الأعداد الكسرية التالية $\frac{7}{2}$; $\frac{17}{5}$; $\frac{15}{4}$ العدد الذي يمثل فاصلة النقطة A ؟
- (3) عبر إذا بعدد كسري عن فاصلة النقطة A . ما هو مقابله؟

إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا كسريا موجبا فإن مقابله هو العدد الكسري السالب $-\frac{a}{b}$. ونرمز له أيضا $\frac{-a}{b}$ أو $-(\frac{a}{b}) = \frac{a}{-b}$
مقابل العدد $\frac{a}{b}$ هو $\frac{a}{b}$ ونرمز لذلك بالكتابة التالية $\frac{a}{b}$
إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا كسريا موجبا فإنه يكتب أيضا $\frac{a}{b}$

تطبيق

- أكتب كل عدد من الأعداد التالية: $-\frac{5}{9}; \frac{2}{-3}; -2,5; -4; \frac{1}{-7}; -\frac{11}{2}$
- على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a عدد صحيح نسبي و b عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر.

2

1) ما هو مقابل كل عدد من الأعداد التالية $\frac{3}{10^2}$; $\frac{2}{9}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{-2}{7}$; -1.23 ; $\frac{5}{3}$; $-\frac{19}{3}$; $\frac{11}{4}$

نسمي عددا كسريا نسبيا كل عدد يمكن كتابته على صورة $\frac{a}{b}$ حيث a عدد صحيح نسبي و b عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر.

نرمز بـ

للمجموعة الأعداد الكسرية النسبية

+ لمجموعة الأعداد الكسرية الموجبة

- لمجموعة الأعداد الكسرية السالبة

2) انقل وأتمم بـ $\in, \notin, \subset, \not\subset$

$$\frac{5}{3} \dots \mathbb{Q}; -\frac{2}{11}; \mathbb{Q} \dots \mathbb{D}; \mathbb{Z} \dots \mathbb{Q}; \mathbb{N} \dots \mathbb{Q}; \mathbb{N} \dots \mathbb{Q}$$

مقارنة الأعداد الكسرية

نشاط

ليكن $\frac{a}{b}$ عددا كسريا موجبا

$a > b$ يعني $\frac{a}{b} > 1$

$a < b$ يعني $\frac{a}{b} < 1$

قارن كل عدد من الأعداد التالية $\frac{15}{7}, \frac{11}{23}, \frac{21}{35}, \frac{175}{105}$ بالعدد 1

1 تأمل الشكل التالي حيث $a = CD$ و $b = AB$ و $a > b$ عددان صحيحان طبيعيان و $b > 0$



* عددان كسريان موجبان لهما نفس المقام أكبرهما هو الذي له أكبر بسط.

$a > c$ يعني $\frac{a}{b} > \frac{c}{b}$

* عددان كسريان موجبان لهما نفس البسط أكبرهما هو الذي له أصغر مقام.

$b < c$ يعني $\frac{a}{b} > \frac{a}{c}$

1 - أ) عبر بأعداد كسرية وبدالة a عن AM و AN

ب) عبر بأعداد كسرية وبدالة b عن CP و CQ

- قارن $\frac{b}{3}$ و $\frac{a}{6}$ ثم $\frac{b}{3}$ و $\frac{a}{6}$

- قارن $\frac{b}{3}$ و $\frac{a}{6}$ ثم $\frac{b}{6}$ و $\frac{a}{3}$

قارن

$$\frac{29}{25} \text{ و } \frac{17}{15} \quad (j)$$

$$\frac{4}{25} \text{ و } \frac{2}{15} \quad (b)$$

تطبيقات

قارن في كل حالة العددين الكسريين
 أ) $\frac{11}{3}$ و $\frac{15}{4}$
 ب) $\frac{19}{21}$ و $\frac{13}{15}$

رتّب تصاعدياً الأعداد التالية

ج) $\frac{11}{35}$ و $\frac{11}{25}$
 ب) $\frac{11}{2}$; $3,5$; $\frac{16}{3}$; $\frac{31}{6}$; $\frac{14}{15}$

أ) $\frac{15}{4}$; $\frac{2}{5}$; $\frac{84}{25}$; $\frac{4}{7}$

1

2

نشاط

4 يمثل الجدول التالي درجات الحرارة الدنيا المسجلة بمدينة عين دراهم خلال أحد أسابيع شهر ديسمبر

الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الإثنان	اليوم
- 4	3	- 1	- 2	4	7	- 3	درجة الحرارة

1) ما هي أقل درجة حرارة مسجلة خلال هذا الأسبوع؟

2) ما هي درجات الحرارة السالبة المسجلة؟

3) ما هي أكبر درجة حرارة سالبة مسجلة؟


4) ما هي الأيام التي سجلت فيها درجات حرارة متقابلة؟

5) أ- رتب تصاعدياً درجات الحرارة المسجلة هذا الأسبوع.

ب- مثل درجات الحرارة هذه على مستقيم مدرج.

5

يمثل الرسم التالي مستقيماً مدرجًا



1- أ- انقل الرسم وعين النقاط O و A و B و A' و B' والتي فاصلاتها

مهما كانت الأعداد الصحيحة الطبيعية a و b و c و d حيث $d \neq 0$ و $b \neq 0$ فإن $-\frac{c}{d} \leq 0 \leq \frac{a}{b}$

ليكن $\frac{c}{d}$ و $\frac{a}{b}$ عددين كسريين موجبين

$$-\frac{c}{d} > -\frac{a}{b} \text{ يعني } \frac{a}{b} > \frac{c}{d}$$

على التوالي 0 و 2 و 3 و -2 و -3- و 3- و 2- و 0 و 1 و 1 و 0 و 1 و 2 و 3 و x.

3- عين النقاطين C و D مناظري C و D بالنسبة للنقطة O.

$$\text{أ- قارن } +\frac{16}{5} \text{ و } +\frac{13}{4}$$

$$\text{ب- قارن } +\frac{16}{5} \text{ و } +\frac{13}{4}$$

$$\text{ب- ماهما فاصلتها } C' \text{ و } D' \text{ ؟ قارن } -\frac{16}{5} \text{ و } -\frac{13}{4}$$

$$\text{ج- قارن } -\frac{9}{4} \text{ و } -\frac{9}{5} \text{ و } +\frac{16}{5}$$

$$\text{3- رتب تصاعدياً الأعداد التالية } 0 \text{ و } \frac{9}{4} \text{ و } \frac{9}{5} \text{ و } +\frac{11}{4} \text{ و } -\frac{11}{5}$$

تطبيقات

1

1 - قارن $\left(\frac{17}{14} - \frac{27}{21} \right)$ و $\left(\frac{11}{4} - \frac{13}{15} \right)$ و $\left(\frac{12}{15} - \frac{7}{15} \right)$

2 - أ) رتب تصاعدياً الأعداد التالية $\frac{3}{4}$ و $\frac{4}{5}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{5}$

ب) استنتج ترتيباً تصاعدياً للأعداد $\frac{3}{4}$ و $\frac{4}{5}$ و $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{5}$

1 - رتب تصاعدياً الأعداد 2 و $\frac{3}{4}$ و $\frac{7}{10}$ و $\frac{3}{2}$ و $\frac{11}{5}$

2 - أرسم على مستقيم مدرج النقاط A,B,C,D,E التي فاصلاتها على التوالي الأعداد السابقة.

2

نعتبر المستقيم المدرج التالي

3



كل عدد كسري نسبي يمثل نقطة وحيدة من مستقيم مدرج.

1 - حدد فاصلات النقاط M و N و P .

2 - أرسم النقاط A و B و C و D التي فاصلاتها على التوالي

$$-\frac{7}{6} \text{ و } \frac{1}{3} \text{ و } \frac{2}{3} \text{ و } \frac{5}{2}$$


3 - أ) أرسم نقطة K فاصلتها عدد كسري نسبي a حيث $\frac{10}{3} < a < \frac{11}{3}$

ب - أرسم نقطة L فاصلتها عدد كسري نسبي b حيث $-2 < b < -\frac{5}{3}$

القيمة المطلقة لعدد كسري نسبي

نشاط

نعتبر المستقيم المدرج التالي ونعتمد OI كوحدة لقياس الأطوال.



1-أ) أنقل الرسم وعين النقطة A التي فاصلتها 4 ثم عين A' مناظرها بالنسبة للنقطة O أصل التدرج. ما هي فاصلة A' ؟

ب) ما هو البعد OA بين النقطة A والنقطة O ؟ ما هو البعد OA' بين النقطة A' والنقطة O ؟

2-أ) أرسم النقطتين C و D فاصلاتها على التوالي $\frac{5}{4}$ و $\frac{3}{2}$

ب) أرسم C' و D' مناظرتا C و D بالنسبة للنقطة O. ما هي فاصلة C' D' ؟ ما هي فاصلة OC' ؟

ج) قارن OC و OD و OC'

3-أ) لتكن M نقطة من المستقيم المدرج بعدها $\frac{9}{4}$ عن النقطة O ما هي فاصلتها ؟ أرسم M

ب) لتكن N نقطة من المستقيم المدرج فاصلتها عدد كسري نسبي $\frac{a}{b}$. ما هو بعدها عن النقطة O ؟

ليكن $\frac{a}{b}$ عددا كسرريا نسبيا و نقطة M فاصلتها $\frac{a}{b}$ على مستقيم مدرج أصله O .

* القيمة المطلقة للعدد الكسري النسبي $\frac{a}{b}$ هو البعد OM . نرمز بـ $\left| \frac{a}{b} \right|$ للقيمة المطلقة للعدد الكسري النسبي $\frac{a}{b}$

إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا كسرريا موجبا.

إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا كسرريا سالبا.

تطبيقات

1 - أحسب $\left| \frac{2}{5} \right| ; \left| -3,8 \right| ; \left| -\frac{5}{13} \right| ; |0| ; \left| -9 \right| ; \left| -\frac{7}{4} \right|$

2 - جد إن أمكن ذلك العدد a في كل حالة من الحالات التالية

$$|a|=0 ; |a|=2 ; |a|=-6 ; |a|=\frac{4}{5}$$

3 - ليكن $\frac{a}{b}$ عددا كسرريا. أثبت أن


$$\left| \frac{a}{b} \right| = \left| -\frac{a}{b} \right|$$

$a=0$ يعني $\frac{a}{b}=0$ يعني $\left| \frac{a}{b} \right|=0$

1

2

1 - أنقل المستقيم المدرج التالي



2 - وحدة قيس الطول هي OI .

أ-عین نقطة M حيث $OM = \frac{12}{5}$. ما هي فاصلة M ؟

ب-ماهي النقاط المنتمية لهذا المستقيم والتي تبعد 4,8 عن النقطة O ؟

3-أ)عین النقاط التي فاصلاتها a حيث $|a| = \frac{17}{5}$.

-ب) عین النقطة N التي فاصلتها b حيث $\left| b - \frac{3}{2} \right| = 0$

أحومد

* كل عدد عشري موجب يمكن كتابته على صورة $\frac{a}{10^n}$ حيث a و n عددان صحيحان طبيعيان

* كل عدد عشري سالب يمكن كتابته على صورة $-\frac{a}{10^n}$ حيث a و n عددان صحيحان طبيعيان

* لتكن $\frac{a}{b}$ كتابة مختزلة إلى أقصى حد لعدد كسري موجب.
يكون هذا العدد الكسري عدداً عشرياً إذا كانت القواسم الأولية للمقام b هي 2 أو 5 أو 2 و 5

* إذا كان $\frac{a}{b}$ عدداً كسرياً موجباً فإن مقابله هو العدد الكسري السالب $-\frac{a}{b}$

* مقابل العدد $-\frac{a}{b}$ هو $\frac{a}{b}$ و نرمز لذلك بالكتابة التالية
 $-(-\frac{a}{b}) = \frac{a}{b}$
 - عدان كسريان موجبان لهما نفس المقام أكبرهما هو الذي له أكبر بسط.
 - عدان كسريان موجبان لهما نفس البسط أكبرهما هو الذي له أصغر مقام

* إذا كان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين موجبين فإن :

$$-\frac{c}{d} > -\frac{a}{b} \text{ يعني } \frac{a}{b} > \frac{c}{d}$$

* ليكن $\frac{a}{b}$ عدداً كسرياً نسبياً و M نقطة فاصلتها $\frac{a}{b}$ على مستقيم مدرج أصله O.

$$\left| \frac{a}{b} \right| = OM \text{ هي القيمة المطلقة لـ } \frac{a}{b}$$

$$\text{إذا كان } \frac{a}{b} \text{ عدداً كسرياً موجباً } \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{a}{b}$$

$$\text{إذا كان } \frac{a}{b} \text{ عدداً كسرياً سالباً } \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{-a}{b} *$$

ملاحظة: في كل ما يلي الكتابة $\frac{a}{b}$ هي كتابة لعدد كسري حيث $b \in N^*$ و $a \in Z$

نَهَارِيَه

انقل وأتمم بـ \subset ; \in ; \notin ; \subseteq

(أ) $\mathbb{N} \dots \mathbb{Q}_+ ; \frac{5}{9} \dots \mathbb{Z} ; -545 \dots \mathbb{D}$
 $\mathbb{Q} \dots \mathbb{Z} ; \frac{2}{3} \dots \mathbb{D}$

(ب) $\left\{\frac{5}{4}; 0; -\frac{15}{14}; 5,21\right\} \dots \mathbb{D} ; \{1; -2; 2,5\} \dots \mathbb{Q}$
 $\left\{-37; -25; -\frac{21}{7}; 11,78\right\} \dots \mathbb{Z}$

نعتبر المجموعات التالية :

$$B = \{-9; -5; 3; 18\} \text{ و } A = \left\{-\frac{15}{8}; -5; 0,7; \frac{2}{5}; 3\right\}$$

$$C = \left\{-9; \frac{2}{5}; \frac{5}{3}; \frac{11}{4}, 21,9\right\}$$

1- أ) أي هذه المجموعات محتواة في المجموعة \mathbb{Z}

ب) أي هذه المجموعات محتواة في المجموعة \mathbb{D}

ج) أي هذه المجموعات محتواة في المجموعة \mathbb{Q}_+

2- حدد المجموعات التالية

$$; A \cap \mathbb{Z}_+ ; C \cap \mathbb{D} ; A \cap C ; A \cup B ; B \cap C$$

$$A \cup C ; A \cap B$$


قارن

(أ) ج $\frac{25}{7}$ و $\frac{11}{3}$ و $\frac{18}{5}$ و $\frac{5}{12}$ و $\frac{2}{5}$ و $\frac{18}{5}$ و $\frac{11}{3}$; ب

د $\frac{29}{11}$ و $\frac{8}{3}$ و $\frac{15}{22}$ و $\frac{29}{11}$ و $\frac{8}{3}$; هـ

7

1- انقل المستقيم المدرج التالي



أ) رتب تصاعديًّا الأعداد الكسرية التالية

$$-\frac{7}{4} ; -1,5 ; \frac{11}{5} ; \frac{9}{2} ; -2 ; \frac{4}{5}$$

1- أرسم على كراسك مستطيلاً طوله 7cm وعرضه 4cm.

2- قسمه إلى سبعة مستطيلات متقابسة.

3- لون خمسة مستطيلات

4- أ- عبر بعدد كسري عن المساحة الغير ملونة

ب- عبر بعدد كسري عن المساحة الملونة

5- أ- قسم المستطيل السابق إلى 28 مربعاً


مساحة كل واحد منها 1cm²

ب- عبر بعدد كسري عن المساحة الغير الملونة


ج- عبر بعدد كسري عن المساحة الملونة

2

عبر بأعداد كسرية عن المساحة الملونة بالأحمر في كل شكل من الأشكال التالية :



6



3

حدد الأعداد العشرية من بين الأعداد التالية
واكتبها على صورة $\frac{a}{10^n}$ حيث n و a عدين صحيحين
طبعيين.

$$; \frac{14}{35} ; \frac{5}{17} ; \frac{6}{33} ; \frac{5}{7} ; \frac{21}{15} ; \frac{15}{4} ; 0 ; -5$$

$$-2,75 ; \frac{120}{780} ; -\frac{165}{1320} ; -15,4$$

ب) أحسب القيمة المطلقة لكل عدد من الأعداد السابقة.

3 - أ - عين النقاط A و B و C و D و E و F التي فاصلتها على التوالي

$$-\frac{7}{4}; -1.5; \frac{11}{5}; \frac{9}{2}; -2; \frac{-4}{5}$$

ب - أحسب الأبعاد OA و OB و OC و OD و OE و OF

ج - عين نقطة M من (OI) فاصلتها عدد كسري $m = \frac{5}{2}$ حيث (اذكر كل الحالات).

د - عين نقطة N من (OI) حيث $ON = 3,4$. ما هي فاصلة N؟ (اذكر كل الحالات).

ه - عين النقطة P من (OI) فاصلتها عدد كسري p حيث $|p - 3| = 0$

8

1 - أرسم معينا (J,I,O) في المستوى.

2 - عين النقاط التالية : $E(2,5, \frac{9}{4})$; $D(-\frac{2}{5}, -\frac{11}{4})$; $C(-3,5 ; 0)$; $B(\frac{7}{2}, -\frac{1}{2})$; $A(-2,1)$; $I'(0 ; -1)$

3 - أ - أرسم المستقيم (AI') .

ب - عين النقطة M من (AI') التي فاصلتها 3-. ما هي ترتيبتها؟

ج - عين النقطة N من (AI') التي ترتيبها 2-. ما هي فاصلتها؟

الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية



ابن الهيثم رائد البصريات (الضوء)

ابن الهيثم من عباقرة العرب الذين ظهروا في القرن العاشر للميلاد في العراق، ومن الذين نزلوا مصر واستوطنوها. ترك آثاراً خالدة في الطبيعة والرياضيات، ولولاه لما كان علم البصريات على ما هو عليه الآن. فلقد أحدث انقلاباً في علم البصريات وجعل منه علمًا مستقلاً له أصوله وأسسه وقوانينه. مما جعل علماء أوروبا ينهمكون على كتبه عدة قرون، وقد استقاوا منه معلوماتهم في الضوء. ومن الثابت أن كتاب المناظر لابن الهيثم من أكثر الكتب استيفاء لبحوث الضوء وأرفعها قدرًا. وهو لا يقل مادة وتبويباً عن الكتب الحديثة العالية إن لم يفق بعضها في موضوع انكسار الضوء وتشريح العين وكيفية تكوين الصور على شبكة العين، وبفضل بحوث هذا الكتاب المبتكرة وما يحويه من نظريات استطاع علماء القرن التاسع عشر والعشرين أن يخطو بالضوء خطوات فسيحة، أدت إلى تقدمه تقدماً سادعاً على فهم كثير من الحقائق المتعلقة بالفلك والكهرباء. ولابن الهيثم رسائل عديدة في علم الفلك تزيد على عشرين رسالة، عرف منها ثلث رسائل : تبحث في مائة الأثر على وجه القمر، وفي ارتفاع القطب، وفي هيئة العالم.

كن عالماً في الناس أو متعلماً

أو ساماً فالعلم ثوب فخار

ابن الوادي

الجمع والطرح في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية

استحضر

عملية الجمع في مجموعة الأعداد الكسرية
الموجبة Q_+ هي عملية:
* تبديلية . أي

إذا كان a و b عددين كسريين موجبين فإن
 $a + b = b + a$

* وهي أيضاً تجميعية . أي
إذا كانت a و b و c أعداداً كسرية موجبة فإن:
 $a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$

احسب

1

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{3} + \frac{1}{6} - \frac{1}{2} & \text{ب)} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} & \text{أ)} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} & \text{ج)} \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} & \text{د)} \end{array}$$

٢ تلاميذ إحدى المدارس الإعدادية مرسمون بالسنة السابعة و $\frac{3}{10}$ تلاميذ هذه المدرسة
مرسمون بالسنة الثامنة.

عبر بواسطة عدد كسري عن نسبة التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة؟

يتكون فرض من أربعة تمارين.

أنجز تلميذ التمرين الأول في ربع الوقت المخصص للفرض والتمرين الثاني في سدس الوقت
والثالث في ثلث الوقت والرابع في خمس الوقت وخصص الثلاث دقائق المتبقية لمراجعة ما
كتبه.

عبر بعدد كسري عن الوقت المخصص للمراجعة. ماهي مدة إنجاز هذا الفرض؟

3

استشف وأطبق

نشاط

1

لمتابعة تلاميذه يتوجه أستاذ طريقة خاصة في تسجيل أعدادهم بكنشه في مختلف الفروض. فهو
يسجل على ورقة كل تلميذ العدد المتحصل عليه بينما يسجل بكنشه الفارق (الموجب أو السالب) بين
ذاك العدد والمعدل عشرة.

مثلاً اذا تحصل تلميذ على 15 في فرض يسجل الأستاذ بكنشه 5 (أو 5+) بالنسبة لهذا التلميذ.

و اذا تحصل تلميذ على 7 في فرض يسجل الأستاذ بكنشه -3 (بالنسبة لهذا التلميذ).

1-أ) تحصل اربعة تلاميذ في أحد الفروض على الأعداد التالية: 12,5 و 8 و 14 و 7,25
ما هي الأعداد المسجلة بكنش الأستاذ بالنسبة لهؤلاء؟

ب) سجل الأستاذ بكنشه الأعداد التالية بالنسبة لخمسة تلاميذ: 7 و 0,25 و 0 و -1 و +5,5
ما هي أعداد هؤلاء؟

(2) في مايلي الأعداد التي تحصل عليها عشر تلاميذ في فرضي مراقبة (ف.م 1 و ف.م 2)

												رقم التلميذ
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			العدد المتحصل عليه في الفرض الأول : ف.م 1
17	8	9	12	6,75	11	5,5	9	7	13			العدد المتحصل عليه في الفرض الثاني : ف.م 2
15,25	12,5	6,75	10	9	7	8	11	11	15,5			

يمثل الجدول التالي الأعداد المسجلة بكنش الأستاذ بالنسبة لهؤلاء التلاميذ.

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	رقم التلميذ
								-3	3	ف.م 1
								1	5,5	ف.م 2
								-3+1 = -2	3 + 5,5 = 8,5	الحاصل (بالنسبة إلى المعدل على 20)

(أ) أنقل هذا الجدول واتممه

ب) قارن حاصل التلميذ رقم 2 وحاصل زميله رقم 5 .

ج) قارن حاصل التلميذ رقم 6 وحاصل زميله رقم 8 .

نشاط 2

(1) أحسب ما يلي :

$$0 + (-8) \quad \text{ج} \quad \text{ب) } -10,5 + 16 \quad \text{ب) } 15 + (-27) \quad \text{أ) }$$

$$(-7) + 3 \quad \text{د) } -12 + (-8) \quad \text{د) } -21,5 + (-8,25) \quad \text{ه) }$$

$$\frac{-75 + 45}{10} \quad \text{و) } \frac{-75}{10} + \frac{45}{10} \quad \text{و) } -\frac{75}{10} + \frac{45}{10} \quad \text{أ) } -7,5 + 4,5 \quad \text{ث) قارن} \quad \text{ث) قارن} \quad \text{ث) قارن}$$

$$\frac{-3 + (-5)}{2} \quad \text{و) } \frac{-3}{2} + \frac{-5}{2} \quad \text{و) } -\frac{3}{2} + \left(-\frac{5}{2}\right) \quad \text{ب) } -1,5 + (-2,5) \quad \text{ث) قارن} \quad \text{ث) قارن}$$

$$\frac{438 + (-638)}{100} \quad \text{و) } \frac{427}{100} + \left(-\frac{638}{100}\right) \quad \text{ج) } 4,27 + (-6,38) \quad \text{ث) قارن} \quad \text{ث) قارن}$$

$$-3,25 + 3,25 ; \frac{5}{8} + \left(-\frac{5}{8}\right) ; \frac{-9}{7} + \frac{9}{7} ; -5 + 5 ; 3 + (-3) ; 125 + (-125) \quad \text{أ) } -\text{أحسب} ;$$

ب - حدد العدد a في كل حالة من الحالات التالية :

$$\frac{a}{2} - \frac{3}{2} = 0 ; -\frac{5}{19} - a ; -\frac{2}{7} + a = 0 ; 7,5 - a = 0 ; a - 2 = 0 ; a + 5 = 0$$

إذا كانت $\frac{a}{d}$ و $\frac{b}{d}$ أعدادا كسرية نسبية فإن :

$$\frac{a}{d} + \frac{b}{d} = \frac{a+b}{d}$$

$$\frac{a}{d} + \left(-\frac{a}{d}\right) = \frac{-a}{d} + \frac{a}{d} = 0$$

$$\frac{a}{b} = -\frac{c}{d} \text{ يعني } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = 0$$

تطبيق 1

احسب ما يلي :

(أ) $-13 + (-21)$ (ب) $-7 + (-15)$ (ج) $2,25 + (-12,5)$ (د) $-65 + 29$

(ه) $123 + (-17)$ (و) $0 + (-23,5)$

(أ) $\frac{-4}{5} + \frac{7}{5}$ (ب) $\frac{6}{17} + \left(-\frac{29}{17}\right)$ (ج) $-\frac{31}{23} + \left(-\frac{5}{23}\right)$ (د) $-4 + \left(-\frac{3}{2}\right)$ (ه) $\frac{2}{9} + (-3)$

تطبيق 2

ولد حنبعل سنة 247 قبل الميلاد (نكتب ذلك «ولد سنة 247-»). عندما بلغ عمره 26 سنة تم تكليفه بقيادة الجيش القرطاجي.

من أشهر حيله العسكرية تلك المعروفة بـ«كمين الثيران» وهو الكمين الذي نصبه للقائد «فابيوس» بعد أربع سنوات من توليه قيادة الجيش وتمكن بفضلها من فتح الطريق أمام جيشه. توفي حنبعل وعمره 64 سنة.

في أي سنة كلف حنبعل بقيادة الجيش؟ في أي سنة نصب «كمين الثيران» للقائد فابيوس وفي أي سنة توفي؟

نشاط 3

وحد في كل حالة مقامي العدددين الكسريين ثم أحسب مجموعهما.

(أ) $\frac{5}{9} + \frac{3}{7}$ (ب) $\frac{4}{-15} + \frac{7}{12}$ (ج) $\frac{-8}{21} + \frac{7}{3}$ (د) $\frac{5}{4} + \frac{-5}{3}$ (ه) $3 + \frac{7}{12}$

تطبيق

أحسب ما يلي : $\frac{-5}{2} + \frac{7}{5}$; $-\frac{2}{15} + \left(-\frac{5}{21}\right)$; $\frac{-8}{35} + 3$; $-7 + \frac{1}{4}$; $\frac{-11}{6} + \frac{-3}{4}$

خاصيّات عملية الجمع في المجموعة Q

نشاط

عملية الجمع في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية Q هي عملية

* تبديلية أي

إذا كان a و b عددين كسريين نسبيين فإن

$$a+b = b+a$$

* وتجميعية أي

إذا كانت a و b و c أعداداً كسرية نسبية فإن :

$$a+b+c = (a+b)+c = a+(b+c)$$

أنقل الجدول التالي وأتممه.

a	b	c	$a+b+c$
-11	-7	-6	
$\frac{-5}{3}$	$-\frac{7}{2}$	$-\frac{3}{2}$	
-9	$\frac{2}{5}$	-10	
$-\frac{11}{20}$	$-\frac{2}{10}$	$\frac{3}{4}$	

تطبيق 1

أحسب

$$-4+(-1)+5+(-9) ; -1+(-5)+(-15) ; -8+10+(-3) ; 14+(-2)+(-14) \quad (أ)$$

$$-\frac{4}{9} + \frac{1}{5} + \frac{4}{9} ; \quad \frac{5}{2} + (-\frac{3}{8}) + \frac{1}{4} ; \quad -4 + (-\frac{1}{2}) + (-1) ; \quad 3 + \frac{2}{5} + (-3) \quad (ب)$$

$$-1,5+2,5+(-0,5)+(-4) ; 12,75 + (-13,5)+(-10) ; -5,25 +(-1,75)+3,5 \quad (ج)$$

$$\frac{-5}{12} + \frac{7}{3} + (\frac{-4}{15}) + (-\frac{7}{4}) ; \quad \frac{2}{3} + (-\frac{5}{2}) + (-\frac{1}{4}) + (-\frac{2}{3}) \quad (د)$$

تطبيق 2

أحسب بعد إدخال تغيير مناسب على ترتيب الحدود.

$$\frac{4}{7} + \frac{3}{4} + (\frac{-5}{7}) + (-\frac{5}{4}) + \frac{8}{7} + \frac{1}{4} \quad (أ)$$

$$\frac{1}{28} + (-\frac{1}{14}) + \frac{3}{28} + \frac{1}{7} + (-\frac{5}{28}) + \frac{3}{14} + (-\frac{1}{14}) \quad (ب)$$

الطرح في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية Q

نشاط 1

يبين الجدول التالي درجات الحرارة المسجلة كل ساعة بمدينة تالة في أحد أيام شهر ديسمبر من الساعة الخامسة صباحاً إلى منتصف النهار.

الساعة	12	11	10	9	8	7	6	5
درجة الحرارة	11	7	5	3	0	-2	-4	-7

(1) ما هو مقدار ارتفاع درجة الحرارة

- أ) بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشر ؟
- ب) بين الساعة السابعة والساعة التاسعة ؟
- ج) بين الساعة الخامسة والساعة السادسة ؟
- د) بين الساعة الخامسة والساعة السابعة ؟
- ه) بين الساعة السادسة والساعة الثامنة ؟

(2) أنقل الجدول التالي وأتممه

$7-3 = 4$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة التاسعة والساعة الحادية عشر
$3-(-2)=3+2=5$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة السابعة والساعة التاسعة
$-4-(-7)= \dots + = \dots$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة الخامسة والساعة السادسة
$\dots = \dots = \dots$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة الخامسة والساعة السابعة
$\dots = \dots = \dots$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة السادسة والساعة الثامنة
$\dots = \dots = \dots$	حساب مقدار ارتفاع درجة الحرارة بين الساعة الخامسة ومنتصف النهار

طرح عدد كسري نسبي يعني إضافة مقابله.

* إذا كان $\frac{a}{d}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين فإن

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d} \right)$$

$$\frac{a}{b} - \left(-\frac{c}{d} \right) = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

الفرق بين العدد $\frac{a}{b}$ والعدد $\frac{c}{d}$

يسمى العدد $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$

تطبيق 1

أحسب

$$-\frac{13}{12} - \left(-\frac{5}{8}\right) ; -\frac{4}{7} - \frac{5}{3} ; \frac{1}{15} - \frac{9}{21} ; -\frac{3}{11} - 4 ; 0 - \left(-\frac{5}{6}\right) ; -5 - (-7) ; 2 - 13$$

تطبيق 2

ولد يوغرطة سنة 160- (أي 160 سنة قبل الميلاد). من أشهر المعارك التي خاضها معركة «سوتيل» التي دارت سنة 110- وانتصر فيها على القائد الروماني «أوليسي». توفي سنة 104- في أحد سجون روما إثر أسره.

- (1) كم كان عمره عندما خاض معركة «سوتيل»؟
- (2) كم سنة عاش يوغرطة؟

نشاط 2

(أ) أحسب $\frac{2}{5} - \frac{7}{4}$ و $\frac{7}{4} - \frac{2}{5}$ ثم قارن النتيجين.

(ب) أحسب $\frac{c}{d}$ حيث $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{-a}{b} + \frac{c}{d}$ استنتج أن $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} + \left(\frac{c}{d} - \frac{a}{b}\right)$ عددان كسريان نسبيان.

(2) بين أن $\frac{e}{f}$ أعداد كسرية نسبية. حيث $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} + \frac{e}{f} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} - \frac{e}{f}$

تطبيق 1

و a و b و c و d و e و f عناصر من المجموعة Z^* أكتب بدون أقواس ما يلي :

$$-(+d) ; -(+14) - \left(-\frac{e}{f}\right) ; -\left(-a - \frac{1}{8}\right) ; -\left(-\frac{c}{b}\right) ; -\left(-\frac{5}{6}\right) ; -(+7,5) ; +(-a)$$

تطبيق 2

و a و b و c و d أعداد كسرية نسبية :

(1) أكتب بدون أقواس العبارات التالية :

$$\dots - (c-a+2,5) + (b-d) , a - b - (-c - d + 1) , 5 - (a - b + c) \quad (أ)$$

$$(B) \left(\frac{6}{17} - a - d\right) - (-b + c) ; (12 + a - b) + (-c - d)$$


(2) أكتب بدون أقواس العبارات التالية ثم اختصرها :

$$\frac{1}{2} + b - d + \left(-\frac{2}{3} - b - a\right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{5}{6} - a - c - d\right) ; (a - 3 - b + c) - (c - b + 4)$$

مقارنة عددين كسررين نسبيين باعتماد الفرق بينهما

نشاط

نعتبر المستقيم المدرج التالي :



- 1) عَيِّن النَّقَاط A و B و C و D الَّتِي فاصلاتْهَا $\frac{3}{5}$ و $\frac{12}{5}$ و $-\frac{3}{2}$ و $-\frac{3}{5}$ و $\frac{5}{2}$
- (2) قارن :

$$\frac{5}{2} \text{ و } -\frac{3}{5}, \quad -\frac{3}{5} \text{ و } -\frac{3}{2}, \quad \frac{12}{5} \text{ و } \frac{5}{2}$$

ب) أحسب :

$$-\frac{3}{5} - \frac{5}{2}; \quad -\frac{3}{2} - \left(-\frac{3}{5}\right); \quad \frac{5}{2} - \frac{12}{5}$$

ج - مَاذَا تُسْتَنْدِجُ ؟

و $\frac{c}{d}$ عَدَانَ كَسْرِيَانَ نَسْبِيَانَ و $\frac{a}{b}$

$$\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \quad \text{يعني} \quad \frac{a-c}{b-d} < 0 \quad , \quad \frac{a}{b} \geq \frac{c}{d} \quad \text{يعني} \quad \frac{a-c}{b-d} \geq 0$$

تطبيق 1

قارن باستعمال الفرق :

$$-\frac{11}{12} \text{ و } -\frac{12}{13}, \quad -\frac{15}{16} \text{ و } -\frac{19}{20}, \quad \frac{31}{30} \text{ و } \frac{32}{31}$$

تطبيق 2

c < d و c و b و a أعداد كسرية نسبية حيث b ≥ a و

$$1 - b + d \quad 1 - a + c \quad (ج) \quad c - \frac{3}{4} \text{ و } -\frac{2}{5} + d \quad (ب) \quad b - 2 \quad a + 3 \quad (أ) \quad \text{قارن :}$$

$$c + b + 1 \quad 2 + a + d \quad (هـ) \quad -d + b + 6 \quad -c + a + 7 \quad (د)$$

تطبيق 3

$$\frac{e}{f} - \frac{c}{d} = \frac{5}{4} \quad \text{و} \quad \frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{11}{12} \quad \text{أعداد كسرية نسبية حيث} \quad \frac{e}{f} \quad \text{و} \quad \frac{c}{d} \quad \text{و} \quad \frac{a}{b}$$


$$\frac{e}{f} \quad \text{و} \quad \frac{c}{d} \quad \text{ثُم} \quad \frac{c}{d} \quad \text{و} \quad \frac{a}{b} \quad (أ) \quad \text{قارن :}$$

$$\text{ب) رتب } \frac{e}{f}, \frac{c}{d}, \frac{a}{b}$$

بعد نقطتين من مستقيم مدرج.

نشاط

نعتبر المستقيم المدرج التالي :



(1) نرمز بـ a و b و c و d لفاصلات النقاط A و B و C و D

(أ) حدد a و b و c و d

(ب) أحسب الأبعاد OA ; OB ; OC ; OI ; OD

(أ) أحسب البعد AC قارن AC و $|c-a|$

(ب) أحسب BD ثم قارن BD و $|d-b|$

(ج) قارن : $|d-a|$ و AD ، $|c-b|$ و BC

إذا كانت M و N نقطتين من مستقيم مدرج فاصلتاها على التوالي عدداً كسريان نسبياً

و n فإن البعد MN يساوي $|n-m|$

$$MN = |n-m|$$

تطبيقات

1 - (أ) عين نقطتين O و I حيث $OI = 1 \text{ cm}$

ب) عين النقاط A و B و M و N و P من المستقيم المدرج (OI) التي فاصلتها على التوالي

$$-5,5 \quad -1 \quad \frac{3}{2} \quad 2,5 \quad \frac{14}{5}$$

(أ) أحسب AP و AB و MP و MN و MB

(ب) أحسب ، $(AB-AP) - (-MB + MN - MP)$; $MB - MN + MP$; $AB - AP$

(3) عين نقطة C من المستقيم المدرج (OI) بحيث $IC = 3$ ماهي فاصلة C ؟ (اعط كل الإمكانيات)

(4) عين النقطة D من المستقيم المدرج (OI) بحيث $AD = 3$ و $OD = 0,5$ ما هي فاصلة D ؟

أحوصل

* إذا كان $\frac{a}{d}$ و $\frac{b}{d}$ عددين كسريين نسبيين

* إذا كان $\frac{a}{d}$ عدداً كسرياً نسبياً فإن $\frac{a}{d} + (-\frac{a}{b}) = 0$

* إذا كان $\frac{c}{d}$ عددين كسريين نسبيين فإن :

$$\frac{a}{b} = -\frac{c}{d} \text{ يعني } \frac{a}{b} + \frac{c}{d} = 0$$

عملية الجمع في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية
هي عملية تبديلية وتجميعية.

مهما كانت الأعداد الكسرية النسبية a و b و c

فإن :

$$a + b = b + a$$

$$a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)$$

طرح عدد كسري نسي يعني إضافة مقابله.

إذا كان $\frac{a}{d}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين نسبيين فإن :

$$\frac{a}{b} - \frac{c}{d} = \frac{a}{b} + \left(-\frac{c}{d}\right)$$

$$\frac{a}{b} - \left(-\frac{c}{d}\right) = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

* يسمى العدد $\frac{a}{b} - \frac{c}{d}$ الفرق بين $\frac{a}{b}$ والعدد $\frac{c}{d}$

عدان كسريان نسبيان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$

$\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ يعني $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} < 0$ ، $\frac{a}{b} \geq \frac{c}{d}$ يعني $\frac{a}{b} - \frac{c}{d} \geq 0$

إذا كانت M و N نقطتين من مسقى مدرج فاصلتا هما على الترتيب عدان كسريان

نسبيان m و n فإن بعد MN يساوى $|n - m|$

نَهَارِيَه

احذف الأقواس ثم اختصر العبارات التالية
حيث a و b و c اعداد كسرية نسبية.

4

حدد بالنسبة لكل واد الإجابة أو الإجابات الصحيحة من بين الثلاث إجابات المقترحة.

1

$$A = - (a - b + c) - (b + c - a) \quad (أ)$$

$$B = (a - \frac{1}{2}) - (b - c - \frac{7}{3}) + (b - a - \frac{3}{4}) \quad (ب)$$

$$C = c - [(a-2) - (3 + c-b) - (a-c)] \quad (ج)$$

$$D = - (-a + \frac{7}{2} - \frac{4}{3} - b) - [(a+b) - (c+a-b-1)] \quad (د)$$

$$-\frac{29}{4} \quad (أ) \quad \text{قارن} \quad -\frac{13}{14} \quad \text{و} \quad -\frac{14}{15} \quad \text{و} \quad -\frac{7,75}{13} \quad (ب)$$

5

$$3,2 \quad (ج) \quad \text{و} \quad \frac{13}{4} \quad (د) \quad -\frac{58}{7} \quad \text{و} \quad -\frac{26}{3} \quad (ه)$$

$\frac{3}{4} + \frac{7}{4} =$	$\frac{10}{8}$	$\frac{10}{4}$	$\frac{5}{2}$
$\frac{4}{5} + \frac{7}{3} =$	$\frac{47}{15}$	$3 + \frac{2}{15}$	$\frac{11}{8}$
$\frac{11}{3} - \frac{7}{15} =$	$\frac{4}{12}$	$\frac{48}{15}$	$\frac{144}{45}$
$11 - \frac{2}{7} =$	$\frac{9}{7}$	$10 + \frac{5}{7}$	$\frac{75}{7}$

أنقل الجدول التالي واتم تعميره.

2

a	b	c	a + c	b - c	a + b - c
$-\frac{12}{5}$	$\frac{3}{5}$	$-\frac{1}{5}$			
$\frac{11}{2}$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{5}{3}$			
$\frac{14}{3}$	$-\frac{2}{7}$	$-\frac{5}{2}$			
-5	$-\frac{7}{24}$	$-\frac{4}{15}$			

أحسب

3

$$\frac{7}{15} - \frac{11}{2} + \frac{9}{4} - \frac{8}{9} \quad (أ) \quad \frac{-5}{4} + \frac{5}{2} - \frac{3}{8} - \frac{7}{8} \quad (ب)$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} \quad (د) \quad -\frac{2}{5} - \frac{11}{7} + \frac{4}{5} - \frac{13}{35} \quad (ج)$$

$$\frac{13}{17} - \frac{5}{11} + \frac{12}{5} - \frac{4}{15} - \frac{6}{11} + \frac{21}{17} \quad (ه)$$

(1) أحسب العددين A و B حيث B


7

$$B = (1 - \frac{11}{4} - \frac{2}{5}) - (2 - \frac{9}{8} - \frac{3}{5}) \quad (أ) \quad A = -2,5 + \frac{11}{2} - \frac{3}{5} \quad (ب)$$

قارن A و B

8

١) تأمل المستقيم المدرج التالي وحدد فاصلات النقاط A و B و C و D و E



٢) احسب الأبعاد IA و EB و CD و BD و EB و AB .


٣) عين نقطة M من المستقيم المدرج (OI) بحيث $AM = 2,4$ ماهي فاصلتها (أذكر كل الحالات)؟

٤) عين النقطة P من المستقيم المدرج (OI) بحيث $IP = 2$ و $AP = 3$. ماهي فاصلتها؟

9

١) رتب تصاعديا الأعداد $\frac{7}{5}$ و $-2,8$ و $\frac{3}{2}$ و $\frac{-12}{5}$ و $\frac{4}{5}$

٢) نعتبر المستقيم المدرج التالي :



عين النقاط M و N و P و Q و R التي فاصلاتها على التوالي $\frac{-12}{5}$ و $\frac{4}{5}$ و $-2,8$ و $\frac{3}{2}$ و $\frac{7}{5}$

٣) أحسب الأبعاد MN و PQ و PR و NR و

10

$$z - x = \frac{1}{2} \quad x - y = -\frac{1}{4} \quad \text{و } y - x \text{ عدداً كسريان نسبيان حيث}$$


احسب $|x - z|$ و $|x - y|$

أ- احسب $(z-x) + (x-y)$

ب) قارن z و y ثم احسب $|z - y|$

$$\text{قارن أ) } 1 + y - z + x \text{ و } \frac{2}{5} + x \quad \text{ب) } 1 + z - x \text{ و } \frac{3}{4} + x - y$$

الضرب والقسمة في مجموعة الأعداد الكسرية النسبية



الفلكي الباتاني بطليموس العرب

ولد الباتاني في العراق وهو من اكبر علماء الفلك عند العرب المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين في علم الهندسة وهيئة الأفلاك وحساب النجوم. من مؤلفاته المهمة كتاب "زيج الصابي" وهو يحتوي على نتائج أرصاده للكواكب الثابتة لسنة 299هـ وجدول تتعلق بحركات الأجرام التي هي من اكتشافاته الخاصة وكان لكتاب أثر بالغ في تقديم علم الفلك والرياضيات سواء خلال النهضة العربية الإسلامية أو عند بداية النهضة الأوروبية، وقد تمت ترجمته لللاتينية والإسبانية.

المجلة العربية العلمية للفتىان

كفى بالعلم في الظلامات نورا

يبين في الحياة لنا الأمورا

المعروف الرصافي

الضرب والقسمة في مجموعة الأعداد الكسرية

استخدم

أحسب

$$14 \times \left(\frac{1}{5} + \frac{3}{2} - \frac{5}{4} \right)$$

$$\frac{5}{7} \times \left(\frac{4}{3} - \frac{1}{2} \right)$$

$$\frac{8}{3} \times \frac{2}{9} \times \frac{5}{7}$$

$$\frac{3}{11} \times \frac{25}{4}$$

1

كم يساوي : أ) ربع العشرين ؟ ب) خمس المائة ؟ ج) نصف ثلث التسعين ؟

2

تقدر نسبة الزكاة على المال بربع العشر من النصاب.
ما هي قيمة الزكاة الواجبة على كل مبلغ من المبالغ التالية ؟

3

9584 17450 5000

استكشف وأطبق

نشاط 1

1 - أكتب كل مجموع من المجاميع التالية في صيغة جداء عددين صحيحين طبيعيين مخالفين

للعدد 1 : $a + a + a + a$ $7 + 7 + 7$ $3 + 3 + 3 + 3$ حيث a عدد طبيعي.

ب) أكتب كل جداء من الجذاءات التالية على صورة مجموع أعداد صحيحة طبيعية متساوية ومختلفة

للعدد 1 : 2×11 5×7 3×9

2 - أحسب المجموع $(-7) + (-7) + (-7) + (-7)$

نعبر عن هذا المجموع بالكتابة التالية : $4 \times (-7)$

ج) أحسب باستعمال الآلة الحاسبة الجداء $4 \times (-7)$ وقارن النتيجة بـ

3 - أكتب في صيغة جداء ثم أحسب.

أ) $(-4,25) + (-4,25) + (-4,25) + (-4,25)$

ب) أكتب الجداء $5 \times (-8)$ في صيغة مجموع أعداد متساوية.

د) أكتب كل جداء من الجذاءات التالية في صيغة مجموع أعداد متساوية.

$$5 \times 3 ; -4 \times 6 ; -(-2,23) \times 4$$

نشاط 2

1 - أ) أحسب بالألة الحاسبة $1,5 \times (-1,25)$ ثم قارن النتيجة المتحصل عليها بالعدد $\frac{15}{8}$

أ) أعط كتابة كسرية مختزلة إلى أقصى حد لكل عدد من الأعداد $-2,6$ و $1,75$ و $-4,55$

ب) أحسب بالألة الحاسبة $(-2,6) \times 1,75$

$$\frac{7}{4} \times \left(-\frac{13}{5} \right) = -\frac{91}{20} = \frac{7 \times (-13)}{4 \times 5}$$



$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad \text{إذا كان } \frac{a}{b} \text{ و } \frac{c}{d} \text{ عددين كسريين فإن}$$

نشاط 3 1 - أحسب، باستعمال الآلة الحاسبة، الجذاءات التالية:

$$(-8,5) \times (-3,25) \quad ; \quad (-2,5) \times (-4) \quad ; \quad (ج) \quad 11,45 \times (-7,2) \quad ; \quad (د) \quad (-2,75) \times 3,25 \quad (أ)$$

$$(-\frac{7}{3}) \times (-\frac{8}{8}) \quad \text{ثم} \quad (-7) \times (-8) \quad (ب) \quad -\frac{15}{7} \times \frac{2}{3} \quad \text{ثم} \quad (-15) \times 2 \quad (أ) \quad \text{أحسب :}$$

$$15 \times (\frac{-23}{4}) \quad 15 \times (-23) \quad (د) \quad \frac{-9}{2} \times (-11) \quad \text{ثم} \quad (-9) \times (-11) \quad (ج) \quad \text{ثم}$$

3 - أنقل الجدول التالي وأكمل بـ \mathbb{Q}_+ أو بـ \mathbb{Q}_-

$a \times b \in \dots$	فإن	$b \in \mathbb{Q}_+$ و $a \in \mathbb{Q}_+$	إذا كان \mathbb{Q}_+ و \mathbb{Q}_+
$a \times b \in \dots$	فإن	$b \in \mathbb{Q}_+$ و $a \in \mathbb{Q}_-$	إذا كان \mathbb{Q}_- و \mathbb{Q}_+
$a \times b \in \dots$	فإن	$b \in \mathbb{Q}_-$ و $a \in \mathbb{Q}_+$	إذا كان \mathbb{Q}_+ و \mathbb{Q}_-
$a \times b \in \dots$	فإن	$b \in \mathbb{Q}_-$ و $a \in \mathbb{Q}_-$	إذا كان \mathbb{Q}_- و \mathbb{Q}_-

تطبيق 1

عددان كسريان موجبان و $\frac{m}{n}$ و $\frac{e}{f}$ عددان كسريان سالبان.

انقل واملاً الفراغات بـ \mathbb{Q}_+ أو \mathbb{Q}_-

$$\frac{c}{d} \times (-\frac{m}{n}) \in \dots ; \quad \frac{m}{n} \times \frac{e}{f} \in \dots ; \quad (-3) \times (-\frac{m}{n}) \in \dots ; \quad \frac{-2}{5} \times \frac{m}{n} \in \dots ; \quad \frac{a}{b} \times \frac{e}{f} \in \dots ; \quad (-\frac{7}{8}) \times \frac{e}{f} \in \dots ;$$

تطبيق 2

أحسب الجذاءات التالية :

$$(-\frac{17}{21}) \times (-5) \quad ; \quad (-3) \times \frac{5}{14} \quad \frac{1}{8} \times (-\frac{15}{13}) \quad ; \quad (-\frac{5}{9}) \times (-\frac{11}{3}) \quad ; \quad -\frac{8}{5} \times \frac{3}{7} \quad ; \quad \frac{2}{9} \times \frac{5}{4}$$

نشاط 4 1 - وحد مقامي العددين الكسريين النسبيين $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$

2 - برهن أن $a \times d = b \times c$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

الجذاء $a \times d$ يسمى جذاء الطرفين والجذاء $b \times c$ يسمى جذاء الوسطيين.

إذا كان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين فإن $a \times d = b \times c$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ (جذاء الطرفين يساوي جذاء الوسطين).

تطبيق 1

عدد كسري $\frac{a}{b}$ و عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر. بين أن $\frac{a}{b} = \frac{a \times n}{b \times n}$ يعني $a = 0$ وأن $\frac{a}{b} = 0$

تطبيق 2

عدد كسري موجب $\frac{a}{b}$ و عدد صحيح طبيعي يقسم a ويقسم b . بين أن $\frac{a}{b} = \frac{a:n}{b:n}$

تطبيق 3

عددان كسريان نسبيان حيث $c \neq 0$ و $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

تطبيق 4

نعتبر العددين $\frac{847754}{489451}$ و $\frac{4009275}{2314756}$

1- أ) حدد رقم آحاد جذاء الطرفين دون حساب هذا الجذاء.

ب) حدد رقم آحاد جذاء الوسطين دون حساب هذا الجذاء.

ج) هل العددان $\frac{847754}{489451}$ و $\frac{4009275}{2314756}$ متساويان؟

2- أحسب باستعمال الآلة الحاسبة.

أ) ب) $\frac{847754}{489451}$ ماذا تلاحظ؟ كيف تفسر ذلك؟

2- أ) أحسب باستعمال الآلة الحاسبة $\frac{48357083}{61000183}$ و $\frac{51044217}{64389876}$

ب) هل أن هذين العددين متساويان؟

a عدد صحيح نسبي و b عدد صحيح طبيعي مخالف للصفر. أحسب :

$$(-1) \times \frac{a}{b} ; 1 \times \frac{a}{b} ; 0 \times \frac{a}{b} ; (-1) \times b ; 1 \times a ; 0 \times a$$

إذا كان $\frac{a}{b}$ عددا كسريا نسبيا فإن :

$$(-1) \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times (-1) = -\frac{a}{b} ; 1 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times 1 = \frac{a}{b} ; 0 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times 0 = 0$$

خاصيات عملية الضرب في المجموعة Q

خاصيات عملية الضرب في المجموعة Q هي نفس خاصياتها في \mathbb{Q}_+ فهي :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \times \frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad * \text{ تبديلية }$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \times \frac{e}{f} = \frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} \times \frac{e}{f} \right) = \left(\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} \right) \times \frac{e}{f} \quad * \text{ تجميعية }$$

$$\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \times \frac{e}{f} \quad * \text{ توزيعية على الجمع}$$

$$\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} - \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} - \frac{a}{b} \times \frac{e}{f} \quad * \text{ توزيعية على الطرح}$$

حيث $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ و $\frac{e}{f}$ أعداد كسرية نسبية.

تطبيق 1

(1) اعط علامة كل جذاء من الجذاءات التالية دون حسابه.

$$(a) (-32,8) \times 5,4 \times (-6) \times 9,5 \times (-1) \times (-6,35) ; \quad (b) 14 \times (-5) \times (-1) \times (-7) ; \quad (c) (-2) \times (-5) \times 12$$

$$(d) \left(-\frac{5}{9} \right) \times 3,5 \times (-15) \times \left(-\frac{4}{7} \right) ; \quad (e) (-1,5) \times \frac{1}{4} \times \left(\frac{-2}{3} \right) \times \left(-\frac{11}{9} \right)$$

(2) ما هي علامة :

جذاء خمسة أعداد سالبة؟ جذاء عشرة أعداد سالبة؟ جذاء سبعة عشر عددا سالبا؟ جذاء مائة وعشرون عددا سالبا؟

(3) كيف يمكن تحديد علامة جذاء أعداد نسبية قبل حساب هذا الجذاء؟

لحساب جذاء أعداد

كسرية نسبية نحدد

أولاً علامة هذا الجذاء.

تطبيق 2

: a و b و c و d و e و f أعداد كسرية حيث

$$f \in \mathbb{Q}_+ ; \quad e \in \mathbb{Q}_- ; \quad d \in \mathbb{Q}_+ ; \quad c \in \mathbb{Q}_- ; b \in \mathbb{Q}_- ; \quad a \in \mathbb{Q}_+$$

حدد علامة كل جداء من الجذاءات التالية :

$$b \times c \times e \times f ; a \times b \times c \times f$$

$$(-a) \times b \times (-c) ; a \times b \times c \times d \times e \times f$$

تطبيقات 3

(1) أحسب :

$$(-4) \times (-2) \times 7 \times (-0,5) ; 2,5 \times (-8,5) \times (-3) ; (-5) \times (-2) \times (-7)$$

$$\left(\frac{7}{5} - \frac{3}{2} + \frac{4}{3}\right) \times \left(\frac{-2}{3}\right) ; \frac{-5}{9} \times \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{4}\right) ; \frac{2}{7} \times \left(\frac{5}{3} - \frac{3}{5}\right) ; \frac{5}{4} \times \frac{3}{7} \times \left(\frac{-1}{2}\right)$$

(2) أحسب بدلالة a و b العبارات التالية : حيث a و b عدادان صحيحان مخالفان للصفر

$$\frac{a}{b} \times \left(7 - \frac{5}{4} + \frac{3}{8}\right) ; \frac{2}{5} \times \left(\frac{a}{b} - \frac{1}{2}\right) ; \frac{4}{9} \times \left(\frac{a}{3} - \frac{a}{2}\right)$$

إذا كان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين فإن :

(جذاء الطرفين يساوي جذاء الوسطين) $a \times d = b \times c$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$

مقلوب عدد كسري مخالف للصفر

نشاط 1 أنقل وأتمم بما يناسب

$$9 \times \dots = 1 ; \dots \times 5 = 1 ; 4 \times \dots = 1 ; \dots \times 8 = -2 ; 6 \times \dots = 4 ; 5 \times \dots = 4 \quad (1)$$

$$-6 \times \dots = \frac{30}{7} ; \dots \times \frac{3}{-5} = \frac{-21}{10} ; \frac{-9}{7} \times \dots = \frac{18}{35} ; \frac{5}{2} \times \dots = \frac{15}{16} \quad (2)$$

نشاط 2 أحسب

$$\left(\frac{-6}{17}\right) \times \left(\frac{17}{-6}\right) ; \frac{27}{11} \times \frac{11}{27} ; -13 \times \left(\frac{1}{-13}\right) ; \frac{1}{9} \times 9$$

ليكن $\frac{a}{b}$ عدداً كسرياً نسبياً مخالف للصفر، لدينا $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$

* نقول أن العددين $\frac{a}{b}$ و $\frac{b}{a}$ عدادان مقلوبان

* العدد $\frac{b}{a}$ يسمى مقلوب العدد $\frac{a}{b}$ و نرمز له بـ $\frac{1}{(\frac{a}{b})}$ كما أن العدد $\frac{a}{b}$ يسمى مقلوب العدد $\frac{b}{a}$ و نرمز له بـ $\frac{1}{(\frac{b}{a})}$

$$\frac{1}{(\frac{b}{a})} = \frac{a}{b} \quad \text{و} \quad \frac{1}{(\frac{a}{b})} = \frac{b}{a}$$

* عدادان مقلوبان هما عدادان جذاءهما يساوي 1.

تطبيق 1

1) حدد مقلوب كل من الأعداد التالية واتبه على صورة عدد كسري مقامه موجب.

$$\frac{1}{-17} ; \frac{-6}{7} ; \frac{5}{8} ; -3 ; 5$$

2) أكتب كل عدد من الأعداد التالية على صورة عدد كسري مقامه موجب.

$$-\frac{1}{6} ; \frac{1}{-7} ; \frac{1}{-6} ; \frac{1}{17} ; \frac{1}{-2}$$

تطبيق 2

1) حُقِّ أن العددين 6,25 و 0,16 هما عدادان مقلوبان وكذلك -0,8 و -1,25.

ب) أحسب ذهنيا $(0,16) \times (-1,25) \times (-0,8) \times 6,25$

تطبيق 3

أنقل الجدول التالي ثم أتممه

العدد	-1,125	-0,5	-8	-2	0,05	100	0,01	0,25	10	20	0,1	4	Mقلوبه
Mقلوبه								4					

تطبيق 4

1) حدد العدد a في كل حالة من الحالات التالية :

$$\frac{1}{a} = -8 \quad \frac{3}{a} \times \frac{5}{11} = 1 \quad a \times \left(-\frac{7}{6}\right) = 1 \quad \frac{5}{9} a = 1$$

2) أحسب العدد x في كل حالة ثم حدد مقلوبه.

$$x = \left(\frac{9}{4} - \frac{2}{5}\right) \times \left(\frac{7}{3} + \frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) ; \quad x = \frac{6}{5} \times \left(3 - \frac{15}{4}\right) ; \quad x = \frac{1}{2} - \frac{2}{5}$$

قسمة عدد كسري على آخر مخالف للصفر

نشاط 1 ارسم مستطيلا ABCD بعدها بالصنتمتر 7 و 2

قسمه إلى سبعة مستطيلات متقابسة.

لون بالأحمر ثلاثة أسباع مساحة ABCD

قسم المستطيل ABCD إلى أربعة عشر مربعا متقابسا.

لون بالأحمر نصف المساحة الخضراء ثم عبر عنها بعدد كسري.

$$\text{قارن } 2 : \frac{7}{3} \times \frac{1}{2} \text{ و } \frac{3}{7}$$

لون بالأصفر خمسة أثمان المساحة غير الملونة وعبر عنها بعدد كسري.

$$\text{قارن خمسة أثمان الأربعة أسباع و } \frac{5}{8} \times \frac{4}{7}$$

إذا كان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين و $\frac{c}{d}$ مخالفًا للصفر فإن خارج قسمة العدد على العدد $\frac{c}{d}$ هو جذاء الأول ومقلوب الثاني ونرمز له بـ $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ أو $\left(\frac{a}{b}\right) \left(\frac{c}{d}\right)$

$$\frac{\left(\frac{a}{b}\right)}{\left(\frac{c}{d}\right)} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} *$$

تطبيق 1

	أحسب	
$\frac{1}{\frac{3}{7}}$	$; \frac{1}{\frac{3}{7}}$	$; \frac{-11}{-2}$
		$; \frac{5}{\frac{-2}{13}}$
		$; -\frac{6}{\frac{1}{3}}$
		$; \frac{7}{\frac{8}{-9}}$
		$; -\frac{2}{\frac{3}{4}}$
		$; \frac{5}{\frac{6}{9}}$

تطبيق 2

عبر بعدد كسري عن كل عبارة من العبارات التالية :

أ) ثلاثة أربع الثلثين ب) سبعي الخمسة أسداس ج) نصف الثلثين د) أربعة أخماس الثمنين

تطبيق 3

قال أحدهم

فنصف العمر تحققه الليالي
لغفاته يمينا مع شمال
وشغل بالمكاسب والعياں

إذا عاش الفتى ستين عاما
ونصف النصف يذهب ليس يدرى
وثلث النصف آمال وحرص
وبباقي العمر....

عبر بعدد كسري عن «باقي العمر» ثم حدد.

تطبيق 4

نعتبر الأعداد التالية حيث a عدد صحيح موجب و b عدد صحيح سالب.

$$\frac{\frac{4}{9} \times b}{5a} ; \quad \frac{b}{(-\frac{11}{17})} ; \quad \frac{-5}{2b} ; \quad \frac{a}{b} ; \quad \frac{(\frac{-a}{2})}{-3} ; \quad \frac{a}{(\frac{5}{7})}$$

حدد علامة كلّ عدد من هذه الأعداد وقيمتها المطلقة.

تطبيق 5

$$\frac{\frac{4}{9} \times (\frac{6}{7} - \frac{1}{2})}{\frac{1}{4} - \frac{2}{3} + 1} ; \quad \frac{3 + \frac{1}{4} - \frac{7}{12}}{-1 + \frac{1}{3} - \frac{7}{2}} ; \quad \frac{\frac{-5}{2} - \frac{3}{4}}{\frac{1}{5} - \frac{11}{2}} ; \quad \frac{1 + \frac{5}{3}}{3 - \frac{7}{4}}$$

أحسب

تطبيق 6

توفيَّ رجلٌ وتركَ 45500 ديناراً وامرأة حاملاً وأوصى بما يلي .

خمسان للأمِّ وثلاثةُ أخماسٍ للمولود إنْ كان ولداً.

أربعةُ أسِيعٍ للأمِّ وثلاثةُ أسِيعٍ للمولود إنْ كان بنتاً.

(1) ما هو نصيب الأمِّ ونصيب المولود

أ - لو كان المولود ولداً ؟

ب) لو كان المولود بنتاً ؟

(2) إلا أن امرأته أنجبت توأمًا ولداً وبنتاً.

كيف يمكن تقسيم هذا المبلغ مع احترام الوصيَّة ؟

ملاحظة: هذه الوضعية مقتبسة من كتاب "Les mathématiques par les problèmes" لـ محمد عكار

صفحة 29.

الخلاصة

إذا كان $\frac{a}{b}$ و $\frac{c}{d}$ عددين كسريين فإن $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$

خاصيات عملية الضرب في المجموعة \mathbb{Q}_+

خاصيات عملية الضرب في المجموعة \mathbb{Q} هي نفس خاصياته في \mathbb{Q}_+ . فهي :

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{c}{d} \times \frac{a}{b} = \frac{a \times c}{b \times d} \quad * \text{ تبديلية : يعني}$$

$$\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} + \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \times \frac{e}{f} \quad * \text{ تجميعية : يعني}$$

$$\frac{a}{b} \times \left(\frac{c}{d} - \frac{e}{f} \right) = \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} - \frac{a}{b} \times \frac{e}{f} \quad * \text{ توزيعية على الطرح : يعني}$$

حيث $\frac{e}{f}$ و $\frac{c}{d}$ و $\frac{a}{b}$ أعداد كسرية نسبية

* مهما كان العدد الكسري النسبي $\frac{a}{b}$ فإن :

$$(-1) \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times (-1) = -\frac{a}{b} \quad ; \quad 1 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times 1 = \frac{a}{b} \quad ; \quad 0 \times \frac{a}{b} = \frac{a}{b} \times 0 = 0$$

مقلوب عدد كسري مخالف للصفر

* ليكن $\frac{a}{b}$ عددا كسريا نسبيا مخالفًا للصفر. لدينا $\frac{a}{b} \times \frac{b}{a} = 1$

* نقول أن العددين $\frac{a}{b}$ و $\frac{b}{a}$ عددان مقلوبان أو أحدهما مقلوب للآخر.

* العدد $\frac{b}{a}$ يسمى مقلوب العدد $\frac{a}{b}$ ونرمز له $\frac{1}{(\frac{a}{b})}$ كما أن العدد $\frac{a}{b}$ يسمى مقلوب العدد $\frac{b}{a}$ ونرمز له $\frac{1}{(\frac{b}{a})}$

$$\frac{1}{(\frac{b}{a})} = \frac{a}{b} \quad \text{و} \quad \frac{1}{(\frac{a}{b})} = \frac{b}{a}$$

* عددان مقلوبان هما عددان جذاءهما يساوي 1.

قسمة عدد كسري على آخر مخالف للصفر

إذا كان $\frac{c}{d}$ و $\frac{a}{b}$ عددين كسريين و $\frac{c}{d}$ مخالفًا للصفر فإن خارج قسمة العدد $\frac{a}{b}$ على العدد $\frac{c}{d}$

هو جذاء الأول ومقلوب الثاني ونرمز له $\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}}$ أو $\frac{(\frac{a}{b})}{(\frac{c}{d})}$

$$\frac{(\frac{a}{b})}{(\frac{c}{d})} = \frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} *$$

نَمَارِيَه

أَحْسَب

1) في أي عدد كسري تضرب مساحة مستطيل إذا

$$\frac{(-\frac{7}{15})}{\frac{2}{17}} : \frac{(-\frac{5}{2})}{\frac{7}{4}} : \frac{-5}{4} : \frac{8}{9} : \frac{1}{(\frac{2}{3})} \quad (أ)$$

$$1 + \frac{2}{1 - \frac{3}{5 - \frac{2}{3}}} : \frac{\frac{5}{4} + \frac{2}{5}}{-\frac{3}{7} + \frac{2}{5}} \quad و$$

(ب)

$$\frac{(-1\frac{3}{16} - \frac{7}{12} + \frac{1}{4}) \times (\frac{5}{4} - \frac{3}{5})}{(3 - \frac{2}{3}) \times (\frac{4}{7} - 1)} : \frac{1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{4}}{1 + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{3}{5}}$$

أَحْسَبَ العَدْد

$$3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15}}$$

2) اعط قيمة تقريرية برقمين بعد الفاصل لهذا العدد، فيما تذكرك هذه النتيجة؟

و a و b و c أعداد كسرية نسبية حيث

$$\frac{a}{c} = \frac{-1}{4} \quad و \quad \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{b}{c} \quad و \quad \frac{c}{a} \quad و \quad \frac{a}{b}$$

نعتبر الأعداد a و b و c حيث

$$c = -\frac{5}{12} \quad b = -\frac{7}{18} \quad و \quad a = \frac{1}{3}$$

$$\frac{a}{b} + \frac{b}{c} : -\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{1}{c} : a \times (b + c) \quad أَحْسَب$$

$$\frac{a}{-\frac{5}{3}} + \frac{(-\frac{21}{18})}{b} - \frac{(\frac{5}{4})}{c}$$

1

ضرينا طوله في $\frac{2}{5}$ وعرضه في $\frac{3}{4}$

2) في أي عدد كسري يضرب حجم متوازي مستطيلات إذا ضربنا أبعاده في $\frac{5}{2}$ و $\frac{5}{7}$ و $\frac{1}{2}$

x عدد كسري موجب a و b و c و d أعداد كسرية نسبية مخالفة للصفر حيث $\frac{x}{b} = \frac{3}{10}$ و $\frac{x}{a} = \frac{7}{2}$

$$\frac{x}{d} = \frac{3}{2} \quad و \quad \frac{x}{c} = 2$$

رتب الأعداد a و b و c و d ترتيبا تصاعديا

أَحْسَب

$$(1 - \frac{2}{7}) \times (-\frac{4}{5} + \frac{7}{8}) : \frac{-4}{13} \times \frac{5}{11}$$

$$(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{4}) \times (-\frac{5}{7} + \frac{2}{5})$$

$$(-3 + \frac{6}{5} - \frac{1}{10}) \times (\frac{1}{5} + \frac{5}{7} - \frac{2}{3})$$

$$4) \quad أَحْسَب \quad \frac{5}{27} \times \frac{9}{5}$$

ب) عدد كسري مجموع ثلث ثلثه وثلث ثلثي ثلثه يساوي $\frac{1}{3}$. ما هو هذا العدد؟

أَحْسَب

$$(1 - \frac{1}{2}) \times (1 - \frac{1}{3}) \times (1 - \frac{1}{4}) \times \dots \times (1 - \frac{1}{99}) \times (1 - \frac{1}{100})$$

نعتبر العددين 13 و a و b عدادان كسرييان مخالفان للصفر

$$a \times b = \frac{1}{6} \quad \text{و} \quad a + b = -\frac{5}{6}$$

حيث

$$\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}}$$

أحسب

نعتبر العددين 10 و

$$A = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{5}{6} \times \frac{7}{8} \times \frac{9}{10} \times \frac{11}{12}$$

$$B = \frac{2}{3} \times \frac{4}{5} \times \frac{6}{7} \times \frac{8}{9} \times \frac{10}{11} \times \frac{12}{13}$$

أحسب $A \times B$

لرجل أربعة بنات : فاطمة وعائشة 14

ولدان توأمان أحمد و محمد

وزع عليهم بمناسبة أحد الأعياد مبلغاً

مالياً كما يلي
أعطى ثلث المبلغ لفاطمة وأعطى لعائشة
ثلاثة أخماس المبلغ المتبقى واقتسم التوأمان
أحمد و محمد الباقي بالتساوي.

1) ما هو العدد الكسري من بين الأعداد
التالية الذي يعبر عن مناب أحد التوأمرين.

$$B = \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} \right) \times 2 \quad ; \quad A = \frac{\left(1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \right)}{2}$$

$$; \quad C = \left(1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} \right) \times \frac{1}{2}$$

2) أحسب مناب كل واحد علماً أن المبلغ
الجملي الذي وقع توزيعه هو 90 ديناراً.

$\frac{-2}{3}$ كتابتان للعدد $\frac{c}{d}$ و $\frac{a}{b}$ 11

بين أن

$$\frac{a+c-2}{b+d+3} = -\frac{2}{3} \quad \text{و} \quad \frac{c-2}{d+3} = -\frac{2}{3} \quad \text{و} \quad \frac{a-2}{b+3} = -\frac{2}{3}$$

a و b و c و d أعداد صحيحة نسبية 12


مخالفة للصفر حيث $b-d$ و $b+d$

مخالfan للصفر و $a \times d = b \times c$

$$\frac{a}{b} = \frac{a+c}{b+d} \quad (ب) \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} \quad (أ) \quad \text{بين أن}$$

$$(ج) \quad \frac{a}{b} = \frac{a-c}{b-d}$$

القول في مجموعه الأعداد الكسرية النسبية Q



جابر ابن حيان مخترع القلوبيات في علم الكيمياء

هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن عبد الله الكوفي المعروف بالصوفي. ولد في طوس (خراسان) وسكن الكوفة، حيث كان يعمل ليات العلمية كالتقدير، التبخير، التكليسيد لأنها. فقد عرف جابر الكثير من العنس، الإذابة، التبلور، وغيرها. كما شمل عمله الناحية التطبيقية للكيمياء، من ذلك أنه أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض، وهذه طريقة لا زالت مستخدمة حتى الان، ولها شأن في تقدير عيارات الذهب في المشغولات والسبائك الذهبية.


اكتشافات كيميائية أخرى لجابر تذكر منها: 1 - عرف جابر بأن الشب يساعد على تثبيت الاصباغ في الأقمشة، والعلم الحديث ثبت ذلك. 2 - توصل جابر إلى تحضير بعض المواد التي تمنع البيل عن الثياب. 3 - توصل إلى استخدام كبريتيد الانتيمون، الذي له لون الذهب، ليغدو عن الأخير غالٍ الثمن. 4 - تمكّن من صنع ورق غير قابل للاحتراق، والعلم الحديث لا يعرف حتى الان نوع هذا الورق. 5 - أدخل طريقة فصل الذهب عن الفضة بالحل بواسطة الحامض (الماء الملكي) وهذه الطريقة لا زالت مستخدمة حتى الان.

المجلة العربية العلمية للفتيان

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

وصدق ما يعتاده من توهّم

المتنبئ



الكور في مجموعة الأعداد الدرسية النسبية Q

استحضر

- 1) مثلث متقايس الأضلاع يساوي طول ضلعيه 3 cm . اعط كتابة لمحيطه على صورة قوة .
 - 2) مربع يساوي طول ضلعيه يساوي 8 cm اعط كتابة لمحيطه وكتابة لمساحته على صورة قوة للعدد 2 .
 - 3) طول ضلع مكعب يساوي 16 cm اعط كتابة لمساحته الجانبية وكتابة لحجمه على صورة قوة للعدد 4 .
 - 4) ما هو الجواب الصحيح من بين المقترنات المقدمة أدفله.
- التخمين هو استنتاج منطقى لنتيجة أو قاعدة أو خاصية دون البرهنة عليها...**
- نصف 2^{20} هو : $2^{10} ; 1^{20} ; 1^{10} ; 2^{19}$
- (1) أحسب
- 5) $10^2 - 11^2 ; 4^2 - 5^2 ; 3^2 - 4^2 ; 2^2 - 3^2 ; 1^2 - 2^2 ; 0^2 - 1^2$
 - 6) ما تخمينك بالنسبة للعدد : $145^2 - 146^2$ تحقق من صحة تخمينك باستعمال الآلة الحاسبة.

نسمى مربعاً كاملاً لكل عدد يكتب في صيغة مربع لعدد كسري

- 1 - أ) فك إلى جذاء عوامل أولية العددين a و b : حيث $a = 648$ و $b = 675$
- 2) ب) استنتج تفكيكاً له : ق.م.أ (a, b) و م.م.أ (a, b)
- 3) (أ) العدد $\frac{a}{2}$ والعدد $b \times 3$ مربعان كاملان .
- 4) ب) $(a, b) = a \times b$ م.م.أ (a, b) \times ق.م.أ (a, b)
- 5) . $BC = 2^{11}$ مثلث ABC حيث $AB = AC = 2^5$ و $AB^2 + AC^2 = BC^2$ بين أن

استكشف وأطبق

نشاط

- أحسب $c = (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3})$ و $b = (-1,5) \times (-1,5) \times (-1,5)$ و $a = (-4) \times (-4) \times (-4)$ العدد a هو جذاء لثلاثة اعداد متساوية للعدد (-4)

ليكن x عدداً كسرياً نسبياً
 x^2 يقرأ « قوة إثنان » أو « x مربع »
 x^3 يقرأ « قوة ثلاثة » أو « x مكعب »

$$\begin{aligned} a &= (-4)^3 \\ b &= (-1,5)^2 = (-1,5) \times (-1,5) \\ c &= (-\frac{2}{3})^5 = (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \times (-\frac{2}{3}) \end{aligned}$$

إذا كان x عدداً كسريّاً و n عدداً صحيحاً طبيعياً أكبر من 1 فإن الكتابة x^n ترمز

لجزء n أعداد مساوية للعدد x

$$x^n = x \times x \times x \times \dots \times x \quad (جذاء n أعداد مساوية لـ x)$$

الكتابه x^n تسمى قوّة للعدد x

العدد n يسمى دليل هذه القوّة.

$$x^1 = x \quad *$$

* إذا كان x عدداً مخالف لصفر فإن $x^0 = 1$

* إذا كان n عدداً صحيحاً طبيعياً مخالف لصفر فإن $0^n = 0$

تطبيق 1

$(-\frac{5}{4})^4$;	$(\frac{3}{5})^5$;	$(-7,5)^2$;	أحسب $(-4)^3$
$(\frac{-2547}{78965})^0$;	$(-1)^{50}$;	$(-1)^{27}$;	1^{15}

تطبيق 2

$\frac{(-5)^4}{10^3}$;	$\frac{3^4}{5^2} \times (-\frac{1}{2})^3$;	أحسب $\frac{7^3}{(-2)^5}$
-----------------------	---	---	---	---------------------------

نشاط 2 (حساب قوى باستعمال الآلة الحاسبة)

أ) أحسب 2^7

ب) باستعمال الآلة الحاسبة اتبع المراحل الأربع التالية :


المرحلة الرابعة	المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
اضغط على الزر =	أدخل العدد 7	اضغط على الزر x^y أو y^x	أدخل العدد 2

ب) قارن العدد المسجل بشاشة الحاسبة ونتيجة السؤال أ.

2) أحسب باستعمال الآلة الحاسبة.

$$(-537)^2 ; 79^2 ; (149)^3 ; (-29)^6 ; 12^5$$

$$\frac{2^{21}}{(-5)^9} ; (4,15)^{19} ; \frac{5^6}{2^{17}} ; (-3,5)^{11}$$



ملاحظة :

في بعض الآلات الحاسبة نجد الزر EE أو x^2

تطبيق

1-أ) ما هو رقم آحاد كل عدد من الأعداد التالية :

$$6^5 ; 6^4 ; 6^3 ; 6^2 ; 6$$

ب) ما يكون رقم آحاد العدد 6^{2157} ؟

2-أ) ما هو رقم آحاد كل عدد من الأعداد التالية :

$$4^6 ; 4^5 ; 4^4 ; 4^3 ; 4^2 ; 4$$

ب) ما يكون رقم آحاد العدد 4^{75} ؟ ورقم آحاد العدد 4^{312} :

3-أ) حسب 759^2

ب) باستعمال الآلة الحاسبة اتبع المراحل الثلاثة التالية :

المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
إضغط على الزر $=$	إضغط على الزر x^2	أدخل العدد 759

نسمى مربعاً كاملاً كلّ عدد
تمكّن كتابته على صورة
مربع لعدد كسري

قارن العدد المسجل بشاشة الحاسبة ونتيجة السؤال.

نشاط 4 (المربعات الكاملة)

أكتب كلّ عدد من الأعداد التالية في صورة مربع لعدد كسري

$$; \frac{121}{64} ; \frac{49}{81} ; 100 ; 25$$

$$2500 ; 400 ; 0,25 ; 6,25$$

كلّ عدد من الأعداد السابقة يسمى مربعاً كاملاً.

تطبيق 1

1) ما هي المربعات الكاملة من بين الأعداد التالية :

$$\frac{4}{25} ; 49 ; 40 ; 16 ; 15 ; 9$$

2) إعط خمسة مربعات كاملة أقلّ من 1

3) أذكر كلّ الأعداد الصحيحة الطبيعية التي مربعها أقلّ من 100 .

تطبيق 2

حقق أن كل مجموع من المجاميع التالية هو مربع كامل.

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 \quad 1^3 + 2^3 + 3^3 \quad 1^3 + 2^3$$

تمرين هرفة بدل

1) أحسب كل مجموع من المجاميع التالية.

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 ; \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ; \quad 1 + 3 + 5 + 7 ; \quad 1 + 3 + 5 ; \quad 1 + 3 ;$$

2) ما هو تخمينك بالنسبة للمجموعتين التاليتين ؟

$$1 + 3 + 5 + \dots + 1997 + 1999 ; \quad 1 + 3 + 5 + \dots + 97 + 99 ;$$

الحل

$$1 + 3 = 4 = 2^2$$

$$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 6^2 \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2 \quad 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2$$

بتأمل المجاميع السابقة يمكن ملاحظة أنها مربعات كاملة.

2) يمكننا كتابة المجاميع السابقة كالتالي :

$$1 + 3 = 4 = 2^2 = \left(\frac{3+1}{2}\right)^2$$

$$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2 = \left(\frac{5+1}{2}\right)^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 4^2 = \left(\frac{7+1}{2}\right)^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 36 = 6^2 = \dots ; \quad 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 5^2 = \dots$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = \dots$$

منطقيا واعتمادا على مسابق يمكننا تخمين ما يلي :

$$1 + 3 + 5 + \dots + 97 + 99 = \left(\frac{99+1}{2}\right)^2 = 50^2 = 2500$$

ما هو تخمينك بالنسبة للمجموع

$$1 + 3 + 5 + \dots + 1997 + 1999$$

باستعمال الآلة الحاسبة اتبع المراحل الثلاثة التالية:

المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
إضغط على الزر =	إضغط على الزر $\sqrt{}$	أدخل العدد 1444

أحسب مربع العدد المتحصل عليه. ماذا تلاحظ؟

$$38^2 = 1444 \quad \text{نقول أن:}$$

العدد 38 هو الجذر التربيعي للعدد 1444 أو أنّ الجذر التربيعي للعدد 1444 هو 38.

ونرمز لذلك بالكتابة التالية: $\sqrt{1444} = 38$

(نقرأ: الجذر التربيعي له 25 يساوي 5)

$$13^2 = 169 \quad \text{يعني} \quad \sqrt{169} = 13$$

إذا كان عدد a مربعاً كاملاً فإن الجذر التربيعي له هو العدد الموجب الذي يكون مربعاً مساوياً للعدد a ونرمز له بـ \sqrt{a}

تطبيق 1

أ) ما هو الجذر التربيعي لكل عدد من الأعداد التالية:

$$10000 ; 400 ; 81 ; 64 ; 49 ; 36 ; 16 ; 9 ; 4 ; 1$$

$$\cdot \sqrt{\frac{169}{49}} ; \sqrt{\frac{400}{81}} ; \sqrt{\frac{9}{64}} ; \sqrt{\frac{81}{16}}$$

ب) احسب: ج) حدد باستعمال الآلة الحاسبة:

$$\sqrt{3200521} ; \sqrt{204304} ; \sqrt{9025} ; \sqrt{6241} ; \sqrt{1024}$$

$$\sqrt{109,2025} ; \sqrt{54,76} ; \sqrt{12,25}$$

تطبيق 2

أ) أحسب: $\sqrt{123454321} ; \sqrt{1234321} ; \sqrt{12321} ; \sqrt{121}$

ب) ما هو الجذر التربيعي لكل عدد من الأعداد التالية:

$$? 12345678987654321 ; 123456787654321$$

تمرين مدقق بحل

(1) أحسب في كل حالة من الحالات التالية العدد $A \times B + 1$ وتحقق أنه مربع كامل.

$$\begin{cases} A = 1111 \\ B = 10005 \end{cases} \quad \text{(ج)}$$

$$\begin{cases} A = 111 \\ B = 1005 \end{cases} \quad \text{(ب)}$$

$$\begin{cases} A = 11 \\ B = 105 \end{cases} \quad \text{(أ)}$$

(2) ما هو الجذر التربيعي للعدد 111111555556

الحل

$$A \times B + 1 = 11 \times 105 + 1 = 1156 \quad \text{(أ)}$$

باستعمال الحاسبة

المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
اضغط على الزر =	اضغط على الزر $\sqrt{}$	أدخل العدد 1156

نقرأ على الشاشة 34

$$\text{إذن } 1156 = 34^2$$

$$(ب) \quad A \times B + 1 = 111 \times 1005 + 1 = 111556 = (334)^2$$

$$(ج) \quad A \times B + 1 = 1111 \times 10005 + 1 = 11115556 = (3334)^2$$

(2) لا يمكن استعمال الحاسبة للبحث عن الجذر التربيعي للعدد 111111555556 وذلك لأن عدد أرقامه يفوق العشرة ولكن بالإستئناس بما سبق يمكن استنتاج الجذر التربيعي لهذا العدد وهو 33334 أي أن

$$(33334)^2 = 111111555556$$

نشاط 6 (القوى السالبة)

(أ) أعط الكتابة العشرية لمقلوب العدد 5².

(ب) باستعمال الآلة الحاسبة اتبع المراحل الأربع التالية :

المرحلة الرابعة	المرحلة الثالثة	المرحلة الثانية	المرحلة الأولى
اضغط على الزر =	اضغط على الزر -2	اضغط على الزر $(x^y \text{ أو } y^x)$	أدخل العدد 5

قارن العدد المسجل بالشاشة ونتيجة السؤال أ.

إذا كان a عدداً صحيحاً نسبياً مخالفًا للصفر و n عدد صحيح طبيعي فإن

الكتابية a^{-n} ترمز لمقلوب العدد a^n

$$a^{-1} = \frac{1}{a}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

تطبيقة

أحسب : أ) $(-2)^{-3}$; 10^{-3} ; 5^{-1} ; $(-4)^{-2}$

ب) $(-\frac{4}{3})^{-2}$; $(\frac{2}{5})^{-3}$; $(0,5)^{-2}$

خصائص القوى

خصائص القوى في الجموعة \mathbb{Q} هي امتداد لخصائص القوى في \mathbb{N}
إذا كان a و b عددين صحيحين نسبيين مخالفين لصفرو m و n عددين صحيحين نسبيين فإن

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad ; \quad (a^n)^m = a^{n \times m} \quad ; \quad a^n \times a^m = a^{n+m}$$

$$(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n} \quad ; \quad (a \times b)^n = a^n \times b^n$$

تطبيقة 1

أكتب في صيغة قوة لعدد كسري نسبي .

$$\frac{(-8)^{12}}{(-8)^5} \quad ; \quad \frac{(-3)^{11}}{(-3)^7} \quad ; \quad [(3,5)^7]^{-3} \quad ; \quad (-\frac{5}{2})^3 \times (-\frac{5}{2})^8$$

$$\frac{10^4 \times [10^{-3}]^5}{10^{-7} \times 10^2} \quad ; \quad [(10^{-5})]^4$$

تطبيقة 2

أنقل واكمل بما يناسب

$$\frac{12^8}{12^{-3}} = 12^5 \quad ; \quad (-7,25)^6 \times (-7,25)^{-9} = (-7,25)^{11}$$

$$\frac{(-9)^7}{(-9)^{-3}} = (-9)^{11} \quad ; \quad \left[(-\frac{5}{9})^{-7}\right]^{-3} = (-\frac{5}{9})^{-21}$$

نطاق 7 قوى العدد 10

انقل وأتم تعمير الجدول التالي :

10^{-9}			10^{-2}	10^{-1}	10^0	10^1		10^3	10^4		10^{12}	العدد على صورة قوة 10
	0,00001	0,001			1		100			10000000		الكتابة العشرية للعدد

تطبيق 1

أعط الكتابة العشرية لكل عدد من الأعداد التالية :

$$97,645 \times 10^2 ; 1,78 \times 10^{-5} ; 0,0362 \times 10^7 ; 789 \times 10^{-4} ; 2,35 \times 10^2$$

تطبيق 2

(أ) أحسب

$$\frac{10^{10}-1}{9} ; \frac{10^4-1}{9} ; \frac{10^3-1}{9} ; \frac{10^2-1}{9} ; \frac{10^1-1}{9}$$

تطبيق 3

اختزل الى أقصى حد

$$\frac{10^7-1}{8888888} ; \frac{10^5-1}{66666} ; \frac{10^4-1}{5555} ; \frac{10^3-1}{444} ; \frac{10^2-1}{33}$$

تطبيق 4

(1) نريد مقارنة العددين 948×10^2 و $2,35 \times 10^5$

$$948 \times 10^2 = 0,948 \times 10^5 \quad \text{وأن} \quad 2,35 \times 10^5 = 2350 \times 10^2$$

قارن إذن العددين 948×10^2 و $2,35 \times 10^5$

(2) أنقل وأتم بما يناسب : $2920 \times 10^{-7} = \dots \times 10^{-4}$: $2,83 \times 10^{-4} = 2830 \times 10^{-\dots}$

(ب) قارن العددين 2920×10^{-4} و $2,83 \times 10^{-7}$

تطبيق 5

رتب تصاعدياً الأعداد التالية :

$$3,25 \times 10^{-2} ; 31 \times 10^{-3} ; 5199 ; 3,685 \times 10^{-2} ; 5,2 \times 10^3$$

نطاق 8 الكتابة العلمية لعدد عشري

(1) حُقِّقْ أَنْ $0,00243 = 0,0243 \times 10^{-1} = 0,243 \times 10^{-2} = 2,43 \times 10^{-3}$

كل هذه الكتابات هي كتابات على صورة $a \times 10^n$ للعدد العشري $0,00243$

في أي كتابة منها يستجيب العدد a للشروط التاليين :

* له رقم واحد قبل الفاصل ؟

* وهذا الرقم لا يساوي 0 ؟

هذه الكتابة تسمى الكتابة العلمية للعدد العشري $0,00243$

(2) باستعمال الآلة الحاسبة أحسب

(أ) 9000000×40000 ماذا تلاحظ ؟
(ب) $68457932 : 0,000056$: ج) $0,000002 \times 0,00006$

الكتابية العلمية لعدد عشري هي كتابته على صورة $a \times 10^n$ حيث n عدد صحيح

و a عدد عشري ذو رقم واحد قبل الفاصل وهذا الرقم مخالف للرقم 0

تطبيق 1

أعط الكتابات العلمية للأعداد التالية :

(أ) $65487,456$; $165,42 \times 10^5$; سبعة عشر مليارا

(ب) مائة وخمسة وثلاثون مليونا.

تطبيق 2

نعتبر الأعداد التالية :

$$4,23 \times 10^{-7} ; 0,235 \times 10^{11} ; 9,03 \times 10^6 ; 0,75 \times 10^6 ; 1,75 \times 10^4 ; 7,49512 \times 10^{11}$$

(أ) أي هذه الأعداد مكتوب كتابة علمية ؟

(ب) أعط قيمة تقديرية لكل عدد من الأعداد السابقة.

تطبيق 3

احسب واتكتب النتيجة على صورة كتابة علمية .

$$10^{-2} + 10^{-1} + 10^0 + 10^2 ; 0,235 \times 10^4 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-2} ; 0,532 + 235 \times 10^{-3}$$

$$\frac{270 \times 10^2 \times 2,5 \times 10^{-5}}{7,5 \times 10^7 \times 10^5}$$

تطبيق 4

تنجز الكرة الأرضية دورة كاملة حول الشمس في 365 يوماً و 6 ساعات. اعط كتابة علمية لهذه المدة بالثواني.

تطبيق 5

تقدر كتلة الكبة الأرضية بـ 5980 مليار المليارطن. اعط كتابة علمية لكتلتها بالكيلوغرام ثم أعط قيمة تقديرية لهذه الكتلة.

نشاط 9 جبر عدد

انقل وأتم تعمير الجدول التالي

جبره بالعشرات	جبره بالمئات	جبره برقم بعد الفاصل	جبره برقمين بعد الفاصل	العدد
.....260.....300.....263,8.....263,82.....	263,8179
.....	2546,871
.....	754,3728
.....	164,191

أحومد

* إذا كان x عدداً كسرياً و n عدداً صحيحاً طبيعياً أكبر من 1 فإن الكتابة x^n ترمز لجذاء n أعداد متساوية للعدد x

$$x^n = x \times x \times x \times \dots \times x \quad (\text{جذاء } n \text{ أعداد متساوية لـ } x)$$

الكتابية x^n تسمى قوة للعدد x

العدد n يسمى دليل هذه القوة

$x^1 = x$
إذا كان x عدداً مخالفًا لصفر فإن $x^0 = 1$
إذا كان n عدداً مخالفًا لصفر فإن $0^n = 0$

* إذا كان عدد a مربعاً كاملاً فإن الجذر التربيعي له هو العدد الموجب الذي يكون مربعاً مساوياً للعدد a و نرمز له بـ \sqrt{a}

* إذا كان a عدداً صحيحاً نسبياً مخالفًا لصفر و n عدداً صحيحاً طبيعياً فإن الكتابة a^{-n} ترمز لمقلوب العدد a^n

* إذا كان a و b عددين صحيحين نسبيين مخالفين لصفر و m و n عددين صحيحين نسبيين فإن

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} ; \quad (a^n)^m = a^{n \times m} ; \quad a^n \times a^m = a^{n+m}$$

الكتابة العلمية لعدد عشري هي كتابته على صورة $a \times 10^n$ حيث n عدد صحيح نسبي و a عدد عشري ذو رقم واحد قبل الفاصل وهذا الرقم مخالف للرقم 0

نَمَارِيَه

- احسب بأيسير طريقة**
- 6** $; B = 2^4 \times 5^5 \times 20 ; A = 2^5 \times 13 \times 5^5$
 $D = (-2)^7 \times 2008^0 \times (-0,5)^7 ; C = 4^2 \times 12,25 \times 5^4$
- 7** اختصر إلى أقصى حد العبارات التالية حيث x و y عدان كسريان نسبيان.
- $\frac{[(-4x^3)^6] \times y^4}{[8y^2]^6 \times x^7} ; \frac{3x^4 \times (-5y^7)}{2x^3 \times 3y^2}$
- 8** احسب a و b عدان كسريان حيث $2 = ab^2$
- $B = \frac{2(5a^2)^3 b^{12}}{(5ab^2)^3} \quad \text{و} \quad A = \frac{3a^3 b^6}{ab^2}$
- 9** أثبت أن رقم آحاد عدد صحيح مربع كامل هو 0 أو 1 أو 4 أو 5 أو 6 أو 9
- 10** ما هو رقم آحاد 3^{1000} استنتج رقم آحاد
- 11** أحسب $; \sqrt{10^{12}} ; \sqrt{5^8} ; \sqrt{1369} ; \sqrt{361} ; \sqrt{144}$
- $\sqrt{870,25} ; \sqrt{132,25} ; \sqrt{\frac{625}{169}} ; \sqrt{\frac{25}{81}} ; \sqrt{55225}$
- 12** أحسب $; \sqrt{1111 + 56^2} ; \sqrt{11 + 6^2}$
- $; \sqrt{11111111 + 5556^2} ; \sqrt{111111 + 556^2}$
- 13** أحسب $3333^2 + 2222 ; 333^2 + 222 ; 33^2 + 22 ; 3^2 + 2$
 ما تخمينك بالنسبة لـ
- 14** يقدر عدد سكان الكورة الأرضية بـ 5.8 مليار نسمة. يستهلك كل ساكن لترین من الماء يومياً. عبر بكتابة علمية وبالمتير المكعب عن الاستهلاك اليومي لكافة السكان ثم اعط قيمة تقديرية لهذا الاستهلاك.
- 1** احسب $(-3,5)^2 \times (\frac{-3}{2})^4 ; (-3)^4 ; (2,1)^2 ; (-\frac{5}{4})^3$
- 2** أكتب على صورة a^n حيث a و n
- عدان صحيان نسيان
- $[(4)^7]^3 ; \frac{(-7)^6 \times (-7)^{-12}}{(-7)^{-10}} ; (-2)^7 \times (-2)^{-5} \times (-2)^{11}$
 $; \frac{16^5}{4^{-3}} ; \frac{25^{11}}{5^9} ; 10^{-14} \times (-5)^{-14} ; 3^8 \times (-2)^8$
- 3** أكتب كل جداء من الجذاءات التالية على صورة قوة لعدد صحيح
- $[(4)^7]^3 ; \frac{(-7)^6 \times (-7)^{-12}}{(-7)^{-10}} ; (-2)^7 \times (-2)^{-5} \times (-2)^{11}$
- 4** أكتب كل مجموع من المجاميع التالية على صورة قوة.
- $4 + 2^2 + 2^3 ; 4 + 2^2$
 $4 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + 2^5 ; 4 + 2^2 + 2^3 + 2^4$
 ما هو تخمينك بالنسبة لـ :
 $4 + 2^2 + 2^3 + \dots 2^n ; 4 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{75}$
- حيث n عدد صحيح طبيعي أكبر من 3
- 5** أكتب على صورة a^n حيث a عدد كسري نسبي ما تخمينك بالنسبة لـ $\sqrt{111111111111 + 555556^2}$ و n عدد صحيح نسبي.
- $(\frac{5}{4})^{-11} ; (-\frac{2}{3})^{14} \times (-\frac{2}{3})^{-7}$
 $(\frac{5}{4})^{23}$
- $(\frac{-6}{7})^5 ; \left[(-\frac{4}{5})^3 \right]^7 \times (-\frac{64}{125}) ; \frac{10^{17} \times 2^{17}}{3^{17}}$

15

اعط الكتابة العلمية وقيمة تقديرية لكل عدد من الأعداد التالية :

$$(0,048)^7 ; 2456^5 ; 0,000954 \times 10^{-15} ; 12,457 \times 10^{17} ; 9452,457$$

16

إذا كان 4,5 لتر من دم الإنسان تحتوي على $2,025 \times 10^{13}$ من الكويرات الحمر فما هو عدد الكويرات المحتواة في لتر واحد.

17

تبعد المجرة المسماة « مجرة M.87 » عن الأرض بـ 50 مليون سنة ضوئية.

- (1) السنة الضوئية هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة بسرعة $3 \times 10^5 \text{ km/s}$. اعط قيمة تقديرية بالكيلومتر للسنة الضوئية. (باعتبار السنة 365 يوم و 6 ساعات).
- (2) عبر بكتابه علمية وبحساب الكيلومتر عن بعد هذه المجرة عن الأرض.
- (3) تقدر كتلة « مجرة M.87 » بملياري مرّة كتلة الشمس. أحسب هذه الكتلة علما أن كتلة الشمس تقدر بـ $2 \times 10^{13} \text{ kg}$.

أنشطة حول الهبارات الحرفية



محمد القزويني

هو أبو عبد الله بن زكريا بن محمد القزويني. ولد بقزوين في حدود سنة 650 هجرية، وتوفي سنة 682 هجرية، اشتهر بالفلك، استغل بالقضاء مدة، ثم شغف بالفلك، والطبيعة، وعلوم الحياة، ولكن أعظم أعماله شأنًا هي نظرياته في علم الرصد الجوي. أشهر مؤلفات القزويني كتابه المعروف (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات). فيه يصف القزويني السماء وما تحوي من كواكب وأجرام وبروج. كما تكلم عن الأرض وجبالها وأوديتها وأنهارها، وتحدث عن كرة الهواء، وعن الرياح ودورتها، وكرة الماء وبحارها وأحيائها، ثم تحدث عن اليابسة وما فيها من جماد ونبات وحيوان. وقد رتب ذلك ترتيباً أبجدياً دقيقاً.

المجلة العربية العلمية للفتىان

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم
فليس سواء عالم وجهول
السموأ

أنشطة حول العبارات الحرفية

نشر واختصار عبارات حرفية

نشاط 1

1 - انقل ثم أتم الجدولين التاليين

الشكل	مربع ضلعه c	مستطيل ببعاده ℓ و L	قرص دائري شعاعه r
المحيط	$4c$		
المساحة			

الجسم	مكعب ضلعه c	متوازي مستويات أبعاده a و b و c	أسطوانة دائرية قائمة شعاعها r وارتفاعها h
المساحة الجملية S			
الحجم V	$V = abc$		

2 - أحسب باللتر حجم مكعب أبعاده 10 cm و $18,5 \text{ cm}$ و $25,1 \text{ cm}$

3 - متوازي مستويات أبعاده 23 cm و 56 cm و $75,2 \text{ cm}$ ما هي مساحته الجملية؟


4 - أعط قيمة تقريبية بالمتر المكعب لحجم أسطوانة دائرية قائمة شعاعها 50 cm وارتفاعها 123 cm

نشاط 2

1 - خذ عدداً أكبر من 5 ، اطرح منه 5 ، اضرب القيمة المتحصل عليها في 6 ، أضف إلى الحاصل 30 ثم اقسم النتيجة على 6 ما هو العدد المتحصل عليه؟
أعد نفس التمثيلى انتظاماً من عدد آخر . ماذما تلاحظ؟ فسر ذلك

2 - خذ عدداً واضربه في ثلاثة ، أضف 15 إلى ما تحصلت عليه . اقسم النتيجة على ثلاثة ثم اطرح العدد الذي اختerte في الأول .

قارن نتائجك بنتائج زملائك . ماذما تلاحظ؟ فسر ذلك.



نشاط 3

عبر بدلالة x عن قيس الزاوية $B\hat{A}C$

تمرين مرفق بحل


- عمر أب التلميذة شيماء خمسة أضعاف عمرها. وعمر أمّها يقلّ بعامين عن أربعة أضعاف عمرها.
- 1 - ليكن a عمر شيماء بالسنوات.
 - أ - عبر بدلالة a عن عمر الأب
 - ب - عبر بدلالة a عن عمر الأم
 - ج - ما هو مجموع أعمار شيماء وأمّها وأبيها؟
 - 2 - أ - كم يصبح عمر كل واحد منهم بعد 14 سنة؟
 - ب - كم كان عمر كل واحد منهم قبل ثلاث سنوات؟
ما هو الفرق بين
 - 3 - أ - عمر الأب وابنته؟
 - ب - عمر الأم وابنتها؟
 - ج - عمر الأب والأم؟
 - 4 - أحسب عمر كل واحد منهم إذا علمت أنّ عمر شيماء 8 سنوات

الحل

- 1 - أ - إذا كان عمر شيماء a عاماً فإن عمر أبيها هو $5a$
 - ب - عمر أمّها هو $2 - 4a$
 - ج - مجموع أعمار شيماء وأمّها وأبيها هو
$$a + 5a + 4a - 2 = 10a - 2$$
- 2 - أ - بعد 14 عاماً يصبح عمر الأب $4a + 14$ وعمر الأم $5a + 14$ وعمر شيماء $14 + 8 = 22$
 - ب - قبل ثلاث سنوات
كان عمر الأب $22 - 3 = 19$
كان عمر شيماء $22 - 8 = 14$
كان عمر الأم $22 - 14 = 8$
 - أ - الفرق بين عمر الأب و عمر ابنته هو
$$5a - a = 4a$$
 - ب - الفرق بين عمر الأم و عمر ابنتها هو
$$(4a - 2) - a = 4a - 2 - a = 3a - 2$$
 - ج - الفرق بين عمر الأب و عمر زوجته هو
$$5a - (4a - 2) = 5a - 4a + 2 = a + 2$$

إذا كان عمر شيماء 8 سنوات فإن
أ - عمر أبيها هو $5 \times 8 = 40$
ب - عمر أمّها $40 - 2 = 38$

نشاط 4




نعتبر المستطيل المقابل $MNPQ$

أحسب مساحته بدلالة x

أنشر وأختصر العبارة المتحصل عليها.

نشاط 5




أ- عبر بدلالة t عن قيس الزوايا $A\hat{B}I$ و $A\hat{C}I$ و $B\hat{A}I$

ب- بين أن $A\hat{B}I$ مثلث متقارن الضلعين

ج- أثبت أن $A\hat{C} = 2A\hat{B}I$

نشاط 6



نعتبر الشكل التالي حيث $b > 1$

أحسب البعدين AB و DE

أحسب قيس محيط هذا الشكل

تطبيقات

انشر واختصر العبارات التالية حيث x و y و t و a أعداد كسرية نسبية

$$أ- 2(x + 3) + 3x - 5$$



$$ب- 5(y-2)-3(y+1)$$

$$ج- -3(3t+2)+2(-t-1)+t+1$$

$$د- \frac{a+1}{2} + \frac{a-3}{2}$$

$$هـ- \frac{2x+3}{2} - \frac{x-1}{3}$$


نشاط 7



نعتبر متوازي المستطيلات التاليين:

1- احسب حجم كل منهما

2- قارن حجميهما



قارن حجمي الجسمين التاليين :

تطبيق

1 - انشر واحتصر العبارة التالية $(x - 3)(x + 3)$ حيث x عدد كسري نسبي

2 - احسب ذهنيا 97×103 و 93×97

تمرين مرفق بحل


نعتبر الشكل التالي

1 - اعط عبارة مختصرة لمساحة المستطيل ABCD

2 - اعط عبارة مختصرة لمساحة المستطيل EFGH

3 - ما هو قيس مساحة الجزء الملون بالأزرق ؟

الحل



1 - مساحة المستطيل ABCD هي

$$(5x + 3)(3x + 2) = 5x \times 3x + 5x \times 2 + 3 \times 3x + 3 \times 2 \\ = 15x^2 + 10x + 9x + 6 = 15x^2 + 19x + 6$$

2 - مساحة المستطيل EFGH هي

$$(3x + 1)(x + 1) = 3x^2 + 4x + 1$$

مساحة الجزء الملون هي الفرق بين مساحة المستطيل ABCD و مساحة المستطيل EFGH أي

$$(15x^2 + 19x + 6) - (3x^2 + 4x + 1) = 15x^2 + 19x + 6 - 3x^2 - 4x - 1 \\ = (15x^2 - 3x^2) + (19x - 4x) + 6 - 1 \\ = 12x^2 + 15x + 5$$

نّشاط 9

1) أنشر واختصر العبارات التالية حيث x و y و z أعداد كسرية نسبية :

$$A = x^2 - (x + 1)(x - 1)$$

$$C = z^2 - (z - 3)(z + 3) \quad B = y^2 - (y - 2)(y + 2)$$

2) أحسب ذهنياً :

(987988)² - (987987)(987989) (أ)

(123456785)² - (123456783)(123456787) (ب)

(253564)² - (253561)(253567) (ج)

3) أنسج أسئلة على منوال ما ورد في السؤال الثاني وأجب عنها.

تفكيك عبارات حرفية

نّشاط 10

نعتبر الجذاءات التالية $(2t + 1)(x + 2)$ ، $(2t + 1)(x - 1)$ ، $a(x + 2)$ ، $3(x + 2)$ ، $3b$ ، $3a$ حيث a و b و x و t أعداد كسرية نسبية

1 - أ - ما هو العامل المشترك بين $3(x + 2)$ ، $3b$ ، $3a$

ب - اكتب في صيغة جداء العبارات التالية $3 - 3a + 3(x + 2)$ ، $3b + 3$ ، $3a + 3b$

2 - أ - ما هو العامل المشترك بين $(2t + 1)(x + 2)$ ، $a(x + 2)$ ، $3(x + 2)$

ب - اكتب في صيغة جداء العبارات التالية $3(x + 2) - a(x + 2)$ ، $a(x + 2) + (2t + 1)(x + 2)$

3 - أكتب في صيغة جداء العبارات التالية $21t^2y - 15ty^2$: $5x^3 - x^2$: $7a^3 - 8a^5$

تفكيك عبارة حرفية يعني
كتابتها في صيغة جداء.

نّشاط 11

1 - لتكن العبارات $C = -14x - 21$ ، $B = 10x - 10$ و $A = (x - 1)(2x + 3)$ حيث x

كسرى نسبي :

أ - فك إلى جداء عوامل العبارة B و العبارة C

ب - استنتج تفكيكا للعبارة $D = A + B = (x - 1)(2x + 3) + 10x - 10$

ت - فك إلى جداء عوامل العبارة $E = (x - 1)(2x + 3) - 14x - 21$

تمرين مرفق بحل

فك إلى جداء العبارتين A و B التاليتين حيث a و b عداد كسرية نسبية

$$B = (a^2 + 3)(2a - 1) - (4a^2 - 2a) ; A = (x - 1)(2x + 3) + 2x - 2$$

الحل

تفكيك العبارة A

لا نلاحظ من أول وهلة عاملا مشتركا ولكن يمكن تفكيك $2 - 2x$ كالتالي
 $2x - 2 = 2(x - 1)$ فيصبح لدينا $(x - 1) + 2(x + 3)$

وفي هذه الكتابة للعبارة A نلاحظ $(x - 1)$ عاملا مشتركا إذن
 $A = (x - 1)[(2x + 3) + 2]$
 $A = (x - 1)(2x + 5)$

تفكيك العبارة B

نلاحظ أنه بإمكاننا كتابة العبارة $4a^2 - 2a = 2a(2a - 1)$ في صيغة جداء كما يلي
ويمكن إذا كتابة العبارة B كالتالي :

$$B = (a^2 + 3)(2a - 1) - 2a(2a - 1)$$

$$B = (2a - 1)[(a^2 + 3) - 2a]$$

$$B = (2a - 1)(a^2 - 2a + 3)$$

تطبيق

أنسج على منوال التمرين السابق وفك إلى جداء عوامل ما يلي حيث a و b و x و y و z
أعداد كسرية نسبية :

$$B = b(3a^2 - 1) + 9a^2 - 3$$

$$A = (2a + 2)(y - 5) - 25 + 10y$$

$$D = (x^2 - 1)(2z - 1) - (4z - 2)(x - 5) \quad C = 3x + 6 + 7(x + 2)^2$$

فك إلى جداء عوامل العبارات التالية حيث a و b و x و y أعداد كسرية نسبية

$$C = xy - 3x - 2y + 6$$

$$B = xy - x - y + 1$$


$$A = ax - ay + 3bx - 3by$$

1


2

تمارين

- 1 - أعط عبارة مختصرة بدلالة x لمحيط المضلع $ABCD$
 2 - احسب هذا المحيط في كل حالة من الحالات التالية : (أ) $x = \frac{7}{5}$ (ب) $x = \frac{5}{2}$ (ج) $x = 6$



- 1
 تأمل الشكل التالي و عبر بدلالة a عن
 . طول القطعة $[BC]$
 . طول القطعة $[BD]$
 . جد a بحيث تكون النقطة B منتصف $[DC]$



- 6
 اختصر العبارتين التاليتين حيث a و x عددين كسريين نسبيين

$$A = 3x - 1 + \frac{2x + 1}{6} \quad \text{أ}$$

$$B = \frac{2a + 1}{5} - \frac{a - 2}{3} + \frac{1 - 2a}{2} \quad \text{ب}$$

- 7
 أنشر واختصر العبارات التاليية حيث a و t و x
 أعداد كسرية نسبية

$$(x + 1)(x - 3) \quad \text{أ}$$

$$(3a + 1)(a - 5) \quad \text{ب}$$

$$(t - 1)(t^2 + t + 1) \quad \text{ج}$$

$$\left(\frac{3}{4}x - 2\right)\left(\frac{5}{3}x + 4\right) \quad \text{د}$$

$$\left(a + \frac{1}{2}\right)(2a + 4) \quad \text{ح}$$

فك إلى جذاء عوامل ما يلي :

$$D = 15a - 35b + 10 \quad \text{(أ)}$$


$$B = 15x^3 - 21x^2 \quad \text{(ب)}$$

$$C = 3x^2 - 6xy + 15x \quad \text{(ج)}$$

$$A = 3(x - 2) - 3(2x + 1) \quad \text{(د)}$$

- 2
 أ - احسب بدلالة x مساحة شبه المنحرف التالي
 ب - احسب قيس هذه المساحة في كل من الحالات التالية

$$(أ) x = \frac{16}{3}, \quad (ب)$$



- 3
 عمر أحمد a سنوات و عمر مروى b سنوات
 * كم يصبح عمر كل منهما بعد 5 سنوات ؟
 * ما هو مجموع أعمارهما بعد 10 سنوات ؟

- 4
 نعتبر x عددا كسرياً نسبياً
 احسب بدلالة x النتيجة المتحصل عليها في كل حالة من الحالات التالية

أ - نضرب العدد x في 3 ونضيف للحاصل 7

ب - نضيف 5 للعدد x ونضرب الحاصل في ثلاثة

ج - نطرح $\frac{3}{4}$ من العدد x ونضرب الحاصل في 10

9

فك إلى جذاء عوامل ما يلي حيث a و b و x و y أعداد كسرية نسبية

$$F = x^2 - a - (3a + 5)(2a - 2)$$

$$E = (2x + 3)(y - 4) - (2y - 7)(2x + 3)$$

$$H = xy + 22 - 11x - 2y$$


$$G = ab - 15 + 3a - 5b$$

10

نعتبر الشكل التالي :


1 - أعط عبارة مختصرة بدلالة d لقياس محيطه

2 - أعط عبارة مختصرة بدلالة d لقياس مساحته



12


أثبت أن المثلث المقابل قائم.



13

اعط عبارة مختصرة بدلالة x للمساحة الجملية لمتوازي المستطيلات قائم أبعاده $x+1$ و $x+2$ و x

المحاولات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد



ابن البيطار

هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي ولد في الأندلس حوالي سنة 1197 وتوفي في دمشق سنة 1248. يعتبر ابن البيطار أعظم عالم نباتي ظهر في القرون الوسطى ومن أكثر العلماء إنتاجاً، درس النباتات وخصائصها في بلاد واسعة، وكان لأبحاثه الأثر الكبير في السير بهذا العالم خطوات مهمة، ضمن كتابه "الجامع لمفردات الأدوية والأغذية" شرحاً مفصلاً لعدد كبير من الأدوية (1400 دواء بين نباتي وحيواني ومعدني، ومنها 300 دواء جديد من ابتكاره الخاص) معتمداً على مؤلفات (أكثر من مائة وخمسين كتاباً بينها عشرون كتاباً يونانياً)

المجلة العربية العلمية للفتیان

اقرئ بقولك فعلا ما به خلل

لا يصدق القول حتى يصدق العمل

إبراهيم الخارصي

المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

استحضر

احتفلت تونس سنة 2006 بمرور 600 سنة على وفاة العلامة عبد الرحمن بن خلدون.
في أي سنة ولد هذا العلامة إذا علمت أنه عاش 74 سنة؟

1

- أكمل في كل مرة النقاط بما يناسب

2

$$\frac{1}{5} + \dots = \frac{3}{5} ; \quad \frac{12}{\dots} = \frac{3}{5} ; \quad \frac{\dots}{5} = -2 ; \quad 7 \times \dots = 4$$

3

x و y عدادان كسريان نسبيان بحيث $y = 3x$
قارن العبارات التالية معللاً جوابك.

A - $3y - \frac{5}{9}$ و $2x - \frac{5}{9}$ ب-

C - $\frac{3}{5}y - \frac{1}{3}$ و $\frac{2}{5}x + \frac{1}{3}$ د-

3y - $\frac{1}{2}$ و $2x + \frac{1}{2}$

- $27y$ و $-18x$

استكشف وأطّبِق

نشاط 1

تمثل الصورة المقابلة كفتى ميزان متوازيتين

1 - عبر بدلالة x عن هذا التوازن

2 - أنقصنا من كل كفة $2x$ غراما، هل يختل التوازن؟
عبر عن ذلك بمساواة

3 - أنقصنا بعد ذلك من كل كفة 150 غراما، هل يختل التوازن؟ عبر عن ذلك بمساواة أخرى.

4 - ما هي قيمة x ؟



نريد التعرف إلى بعدي مستطيل نصف محطيه 61 متراً ويزيد طوله عن عرضه بـ 11 متراً
نرمز بـ ℓ لعرض هذا المستطيل

1 - عبر بدلالة ℓ عن نصف محيط المستطيل

2 - عبر بمساواة على المعطى التالي «نصف محيط المستطيل يساوي 61 متراً»

3 - هل يمكن أن يكون العرض 15 متراً ؟ 30 متراً ؟ 100 متراً ؟

4 - ما هما بعضاً المستطيل ؟

5 - تحقق من مطابقة هذين البعدين مع المعطيات.

نعتبر المثلث ABC حيث $AB = 2x + 1$ و $AC = 7x - 19$ و $BC = 4x + 12$ و x عدد كسري

حيث $6 < x < 25$

أ - بين أن $1 + 2x + 19 = 2x + 7 - 1$ يعني $20 = 5x$

ب - استنتج قيمة العدد x بحيث $7x - 19 = 2x + 1$

ج - هل يمكن أن يتقاضي الضلعان [AC] و [AB] ؟

2 - أ - ابحث عن العدد x ليكون المثلث ABC متقارن الضلعين قمته الرئيسية C.

ب - هل يمكن أن يتقاضي الضلعان [AB] و [BC] ؟

3 - ما هي أبعاد هذا المثلث إذا علمت أن محيطه يساوي 124 cm ؟

في الأنشطة السابقة تعرضنا لكتابات من نوع

$$2\ell = 50 \quad ; \quad 2\ell + 11 = 61 \quad ; \quad 7x - 19 = 4x + 2 \quad ; \quad 7x - 19 = 2x - 1 \quad ; \quad 13x = 130$$

وهي كتابات كلها من نوع $ax = b$ حيث a و b عدوان كسريان معلومان و a مخالف للصفر.
كل كتابة من هذه الكتابات تسمى معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد.

في المعادلة : $ax = b$

x يسمى المجهول

ax يسمى الطرف الأول للمعادلة

b يسمى الطرف الثاني للمعادلة

يتمثل حل هذه المعادلة في البحث عن العدد المجهول x الذي يحقق المساواة $ax = b$

1 - أ - حول الكتابة $1 - \frac{x+1}{2} = 4x$ إلى كتابة من نوع $ax=b$

ب - حل في \mathbb{Q} المعادلة $1 - \frac{x+1}{2} = 4x$


2 - نعتبر المعادلة $3t+1 + \frac{t-1}{4} = \frac{2t+3}{2}$

أ - حول كتابة هذه المعادلة إلى كتابة من نوع $at+b=0$

ب - حل في \mathbb{Q} هذه المعادلة

3 - نعتبر متوازي الأضلاع المقابل

ابحث عن أقيسة أضلاعه وزواياه




تمرين مرفق بحل 1

في الشكل التالي لدينا A, O, B على استقامة واحدة

$\widehat{BON} = 3\widehat{MON}$ و $\widehat{MON} = 2\widehat{AOM}$

ابحث عن \widehat{BON} و \widehat{MON} و \widehat{AOM}



الحل

نرمز بـ x لقياس الزاوية \widehat{AOM}

نترجم المعطيات كما يلي $\widehat{MON} = 2x$ يعني $\widehat{MON} = 2\widehat{AOM}$

$\widehat{BON} = 3(2x) = 6x$ يعني $\widehat{BON} = 3\widehat{MON}$

بما أن A و O و B على استقامة واحدة فإن $\widehat{AOM} + \widehat{MON} + \widehat{BON} = 180^\circ$

$$x + 2x + 6x = 180^\circ \text{ يعني}$$

$$9x = 180^\circ \text{ يعني}$$

$$x = \frac{180}{9} = 20^\circ \text{ يعني}$$

إذا فإن أقيسة الزوايا هي كالتالي $\widehat{BON} = 120^\circ$ ، $\widehat{MON} = 40^\circ$ ، $\widehat{AOM} = 20^\circ$

يمكننا التثبت من مطابقة ما توصلنا إليه مع المعطيات
 $\widehat{BON} = 120^\circ = 3\widehat{MON}$

تمرين مرفق بحل 2

حوض على شكل متوازي مستطيلات قاعدته مستطيل
بعدها بالصنتمر 30 و 48.

وضعنا فيه 18 لترا من الماء
ما هو ارتفاع الماء في هذا الحوض؟

الحل

نرمز إلى ارتفاع الماء بـ h
حجم الماء هو :

$$V = 48 \times 30 \times h$$

$$V = 1440h \text{ cm}^3$$

و بما أن حجم الماء هو 18 لترا أي 18000 cm^3
إذا لدينا $1440h = 18000$

$$h = \frac{18000}{1440} \text{ cm}$$

تمرين مرفق بحل 3

مبلغ مالي قدره 270 دينارا مكون من أوراق نقدية من فئة 5 دنانير و 10 دنانير و 20 دينارا.
عدد الأوراق من فئة 5 دنانير يفوق بـ 3 عدد الأوراق من فئة 20 دينارا.

و عدد الأوراق من فئة 10 دنانير هو ثلاثة أضعاف عدد الأوراق من فئة 5 دنانير
ما هو عدد الأوراق النقدية من كل فئة؟

الحل

نرمز بـ x لعدد الأوراق النقدية من فئة العشرين دينارا
عدد الأوراق من فئة 5 دنانير هو إذا $x + 3$ و عدد الأوراق من العشرة دنانير هو $(3(x + 3))$

$$\text{إذا لدينا } 270 = 20x + 5(x + 3) + 10 \times 3(x + 3)$$

بعد النشر والاختزال نتوصل إلى المعادلة التالية

$$55x + 105 = 270$$

$$\text{يعني } 55x = 270 - 105$$

$$\text{يعني } x = 3$$

وبالتالي لدينا 3 أوراق من فئة 20 دينارا و 18 ورقة من فئة 10 دنانير و 6 أوراق من فئة 5 دنانير.
علينا الآن التأكد من مطابقة ما توصلنا إليه مع المعطيات

3 أوراق من فئة 20 دينارا تُعطي مبلغاً يساوي 60 دينارا

18 ورقة كم فئة 10 دنانير تُعطي مبلغاً يساوي 180 دينارا

6 أوراق من فئة 5 دنانير تُعطي مبلغاً يساوي 30 دينارا

وبذلك فإن المبلغ الجملي هو $60 + 180 + 30 = 270$

لحل التمرين السابق توخيّنا عدّة مراحل وهي حل المعادلة - اختيار المجهول - التأكّد من مطابقة الحل مع المعطيات - كتابة الوضعية في صيغة معادلة. رتب هذه المراحل.

معادلات يُؤول حلّها إلى حلّ معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

حل في \mathbb{Q} المعادلات التالية :

أ. $(2x + 3)(x - 1) = 0$

ب. $t(3t + 5) = 0$

ج. $(3x + \frac{1}{2})(\frac{5}{4}x - \frac{1}{3})$

ك. $3x^2 + 5x = 0$

ت. $(2x - 5)(x - 1)(1 - 2x) = 0$

د. $x^2 - x = 0$

لتكن العبارة $A = (3x - 2)(2x - 5) + 6x - 4$ حيث x عدد كسري نسبي.

بين ان $A = (3x - 2)(2x - 3)$

حل في \mathbb{Q} المعادلة $A=0$

تطبيقات

أ- فكّ العبارات التالية إلى جذاء عوامل :

$$C = y^2 - 3y - (y - 2)(y - 3); B = t(t + 1) + 2t + 2; A = 8x - 2 + (x - 1)(4x - 1)$$

$$\text{ب- حل في } \mathbb{Q} \text{ المعادلات التالية } C = 0 \quad ; \quad B = 0 \quad ; \quad A = 0$$

ما هو العدد الذي إذا طرحناه من بسط و مقام العدد الكسري $\frac{4}{5}$ نتحصل على $\frac{5}{4}$ ؟

مسائل يُؤول حلّها إلى حلّ معادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد

مَسَالَة 1 (مَرْفَقَة بِحَلٍ)

دخل جمّع من التلاميذ إلى قاعة عرض مجهزة بأرائك لو أجلسنا 5 تلاميذ على كل أريكة يبقى بهذه القاعة 12 مكاناً شاغراً ولو أجلسنا 4 تلاميذ على كل أريكة، لا يجد 3 تلاميذ منهم مكاناً للجلوس.

ما هو عدد التلاميذ ؟

نرمز لعدد الأرائك بـ x

لو أجلسنا 5 تلاميذ على كل أريكة، يبقى بهذه القاعة 12 مكانا شاغرا، إذا فإن عدد التلاميذ هو $12 - 5x$
 لو أجلسنا 4 تلاميذ على كل أريكة يبقى 3 تلاميذ بدون مقاعد إذا فإن عدد التلاميذ هو $3 + 4x$
 وبما أن عدد التلاميذ هو نفسه في الحالتين إذا لدينا $3 + 4x = 12 - 5x$ يعني $x = 15$
 وبالتالي فبهذه القاعة 15 أريكة وعدد التلاميذ $12 - 5 \times 15 = 3 + 4 \times 15 = 63$ تلميذا

مُسَأَّلَةٌ 2

رجل عمره 62 سنة له ابن عمره 40 سنة وحفيد عمره 12 سنة
 قال الرجل لأبنه وحفيده : «قبل أن يبلغ سني 75 سنة سوف يصبح مجموع عمريكما مساوياً
 لعمرِي»

هل هو محق فيما قال ؟

مُسَأَّلَةٌ 3

مبلغ مالي قدره 100 دينارا متكون من 12 ورقة نقدية بعضها من فئة 5 دنانير والبقية من فئة 10 دنانير.
 ما هو عدد الأوراق من كل فئة ؟

مُسَأَّلَةٌ 4

للاشتراك في الإنترن特 تقدم شخص إلى شركتين عرضت عليه الأولى خدماتها كالتالي
 - معلوم الإشتراك الشهري 6 دنانير
 - 5 ساعات إبحار على الأنترنات مجانا ثم وبعد انقضاء الخمس ساعات، تفوتر الساعة بحسب دينارين لكل ساعة.

عرضت عليه الثانية خدماتها كالتالي :
 - معلوم الإشتراك الشهري 18 دينارا

- يمكن له الإبحار كما يشاء (دون تحديد سقف لساعات الإبحار)
 - ما هي الشركة الأنسب إذا كان معدل ساعات الإبحار شهريا هو 7 ساعات
 - ما هي الشركة الأنسب إذا كان معدل ساعات الإبحار شهريا هو 15 ساعة
 - ما هو عدد ساعات الإبحار على الإنترنط التي تكون فيها معاليم الإشتراك متساوية عند هاتين الشركتين.

مُسَأَّلَةٌ 5 (مِرْفَقَةٌ بِحَلِّهِ)

قطع دراج المسافة الفاصلة بين مدینتين ذهابا وإيابا بمعدل سرعة 30 km/h في الذهاب و 20 km/h في الإياب.
 ما هو معدل سرعة هذا الدراج "ذهابا وإيابا".

الحل

نرمز بـ d للمسافة الفاصلة بين المدينتين وبـ v ل معدل السرعة "ذهبًا وإيابًا" الذي نبحث عنه.

المسافة الجملية المقطوعة ذهابا وإيابا هي $2d$

الوقت الذي قضاه هذا الدراج في الذهب هو $\frac{d}{30}$

الوقت الذي قضاه هذا الدراج في الإياب هو $\frac{d}{20}$

إذا الوقت الذي قضاه "ذهبًا وإيابًا" هو من ناحية $\frac{2d}{v}$

هو من ناحية أخرى فهو مجموع الوقت المضي في الذهب والإياب أي $\frac{d}{20} + \frac{d}{30}$

إذا $\frac{5d}{60} = \frac{2d}{v}$ يعني $\frac{2d}{60} + \frac{3d}{60} = \frac{5d}{60}$

وبالتالي فلدينا $\frac{5d}{2d} = \frac{60}{v}$ يعني $\frac{5}{2} = \frac{60}{v}$

(جذاء الوسطين يساوي جذاء الطرفين) أي $5v = 120$

يعني $v = 24\text{km/h}$ إذا معدل سرعة هذا الدراج "ذهبًا وإيابًا" هو 24km/h
(و ليس 25km/h كما يتبارد لذهن البعض)

مسألة 6

لاحظ الجدول التالي ثم ضع في كل خانة العدد المناسب إذا علمت أنه بداية من الخانة الثالثة (من اليسار إلى اليمين) كل عدد هو مجموع العددين الموجودين بالخانتين السابقتين.

1	- 35
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

مسألة 7

كلف فريق من عمال البناء ببناء حائطين لهما نفس الارتفاع وطول أحدهما ضعف طول الآخر.

اشتغل هؤلاء العمال بنفس الطريقة وعلى نفس الوتيرة

في اليوم الأول اشتغل كل العمال فأنجزوا جزءاً من الحائط الكبير.

في اليوم الثاني نصف عدد العمال أتم بناء الحائط الكبير فأكمله والنصف الآخر من العمال أنجز

بناء جزء من الحائط الصغير.

في اليوم الثالث والأخير انشغل عاملان فقط فأتمما بناء الحائط الصغير.

ما هو العدد الجملى للعمال؟

مسألة 8

لرجل عدد من البيضات.

أكل في اليوم الأول نصف عددها ونصف بيضة.

أكل في اليوم الثاني نصف ما تبقى ونصف بيضة،

ثم أكل في اليوم الثالث نصف ما تبقى ونصف بيضة ولم يبق له بعد ذلك أية بيضة.

ما هو عدد البيضات؟

نَارِيَه

6 DIOPHANTE هو عالم رياضيات. استغرقت


طفولته $\frac{1}{6}$ من عمره. تزوج بعد طفولته بـ $\frac{1}{12}$ من عمره وعاش بعد زواجه خمس سنوات و $\frac{1}{7}$

من عمره دون أطفال.

ثم أنجب طفلًا شاء القدر أن يعيش نصف ما عاشه أبوه. توفي DIOPHANTE بعد وفاة ابنه بـ 4 سنوات. كم سنة عاش DIOPHANTE ؟

7 تأمل الصورة التالية واحسب :

حجم جزء الإسطوانة الصغرى المغمض في السائل وارتفاع هذا الجزء.



8 مجموع أعمار تلاميذ قسم بمدرسة ابتدائية يساوي 208 سنة .

كل تلاميذ هذا القسم لهم نفس العمر (بالسنوات) إلا ثلاثة. إثنان يزيد عمر كلّ منها سنة عن سن زملائهم والآخر يقل سنّه بسنة عن سن زملائه.

ما هو عدد تلاميذ هذا القسم ؟

ما هو سن كل واحد منهم ؟

9 معلوم الاشتراك السنوي في إحدى المجالات العلمية يقدر بـ 50 دينار و عدد المشتركين فيها . 700

بعد دراسة إحصائية لاحظ صاحب المجلة أنّ عدد المشتركين يزيد بـ 20 عند كل تخفيف بدينار في معلوم الاشتراك.

ما هو مقدار التخفيف الذي يضمن نفس الدخل؟ (مقدار التخفيف بالدينار هو عدد صحيح)

1 حل في Q المعادلات التالية :

$$\frac{1}{2}x + \frac{x-1}{3} = \frac{2}{7} \quad (أ) \quad 2x+1 - \frac{x}{5} = 3 \quad (ب)$$

$$ج) \quad \frac{t+1}{5} - 2 \frac{t-1}{3} = \frac{1}{5}$$

$$د) \quad \frac{2y-7}{3} - \frac{y-2}{2} = y-3 - \frac{y+1}{5}$$

2 ابحث عن كتابة كسرية للعدد $\frac{5}{7}$ يكون مجموع بسطها و مقامها 132

3 لتنظيم رحلة لتلاميذها اكترت مدرسة إعدادية حافلات بعضها كبير يتسع لـ 56 راكبا وبعضها لا يتسع إلا لـ 44 راكبا. عدد الحافلات الكبيرة يفوق بـ 4 عدد الحافلات الأخرى. ما هو عدد الحافلات من كل صنف إذا علمت أن عدد المشاركين في الرحلة 624 وأن كل المقاعد مشغولة ؟

4 اشتري شخص جهاز تلفزة و دفع ثمنه على ثلاثة أقساط.

قيمة القسط الأول : ثلث الثمن

قيمة القسط الثاني : خمسي المبلغ المتبقى

قيمة القسط الثالث والأخير : 132 دينارا

ما هو ثمن جهاز التلفزة

5 مخزن حبوب مقسم إلى جزئين.

جزء به 58 طنا و جزء به 76 طنا بقي 52 طنا من الحبوب يتحتم تخزينها. كيف يمكن توزيعها على الجزأين لكي تصبح كمية الحبوب فيها متساوية ؟

10

انطلق دراج على الساعة الثامنة صباحاً من مدينة A إلى مدينة B تبعد عنها 60 km بسرعة .24 km/h يقدر معدّلها بـ . قبل وصوله انفلقت احدى العجلات فأكمل المسافة المتبقية سيراً على الأقدام بسرعة يقدر معدّلها بـ 4 km/h فكان وصوله على الساعة 11h20mn ما هي المسافة التي قطعها سيراً على الأقدام ؟

11

ضع الرقم المناسب في كل خانة علماً أنه انطلاقاً من اليسار إلى اليمين مجموع الأرقام بكل ثلاثة خانات متتالية يساوي 20 .

....	7	9
------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	---	------

12

في قرية تقطن 1250 عائلة بعض هذه العائلات يملك دراجة واحدة وبعضها يملك دراجتين وبعض الآخر يملك ثلاثة دراجات . ما هو العدد الجمي لللدراجات بهذه القرية علماً أن عدد العائلات التي تملك ثلاثة دراجات يساوي عدد العائلات التي تملك دراجة واحدة ؟

13

انطلقت حافلة من مدينة A إلى مدينة B بمعدل سرعة يساوي 80 km/h وانطلقت أخرى في نفس الوقت من المدينة B إلى المدينة A بمعدل سرعة يساوي 64 km/h متى وفي أي نقطة تقابل الحافلتان علماً أن المسافة الفاصلة بين المدينتين هي 18 km

14

و هبّت له ثلاً من العمر كاماً
وقال قليل قلت عندي زيادة
فأهديته ثلاثين من سبع مامضا
وذاك قليل للفتى إن تمرضاً
وابقيت لي عشرين عاماً أعيشها
ما هو عدد السنوات التي وهبها وأهداها من عمره صاحب هذه الأبيات ؟

التناسب



الشريف الإدريسي : رائد علم الجغرافيا

اسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الصقلي ولد في مدينة سبتة شمال المغرب عام 493 هـ (1100 ميلادية) و مات عام 560 هـ (1166 م). أحد كبار الجغرافيين في التاريخ، كما أنه كتب في التاريخ، والأدب، والشعر، والنبات و درس الفلسفة، والطب، والنجوم، والجغرافيا، والشعر في قرطبة. استخدمت مصوراته وخرائطه في سائر كشوف عصر النهضة الأوربية. كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، ضمن كل ما عرفه الأقدمون من معلومات زاد عليها ما اكتسبه هو و ما رأه و رصده في أسفاره ورحلاته وفيه نيف و سبعين خريطة ، وهذا الكتاب ظل مرجعاً للعلماء الأوروبيون لمدة أربیت على ثلاثة سنتا.

المجلة العربية العلمية للفتيان


الحكمة هي إعمال العقل كما ينبغي متى ينبغي كيما ينبغي

بسکویہ

التناسب

استخدم

السعر بالدينار



$$1\text{m}^3 = 1000 \text{ l}$$

الوزن بالكيلوغرام

1

تسير سيارة بمعدل سرعة 70 km/h وتسير أخرى بمعدل سرعة 30 m/s. أيهما أسرع؟

1

يقدم الرسم المقابل تمثيلاً بيانيًّا للسعر نوع من الفواكه بالدينار حسب وزنه بالكيلوغرام. سعر الكيلوغرام الواحد : 1,250 د

2

أ- ما هو ثمن 0,5 kg ؟

ب- دفع مواطن 5,250 د ثم مَا شرَاه من هذه الفاكهة. كم اشتري هذا المواطن، بالكيلوغرام، من هذه الفاكهة؟

قطعة أرض مستطيلة الشكل بعدها 125 m و 100 m

أرسم تصميمًا لهذه القطعة بالسلم $\frac{1}{2500}$.

3

تستخرج مضخة مياه خمسة عشر لترًا في الثانية (15 l/s)

4

كم تستخرج من متر مكعب في الساعة؟

5

بإحدى المدارس الإعدادية :

500 تلميذ بالسنة السابعة أساسى نصفهم إناث.

300 تلميذ بالسنة الثامنة أساسى 40% منهم إناث.

200 تلميذ بالسنة التاسعة أساسى 60% منهم إناث.

نسبة الإناث بهذه الإعدادية هل هي 50 % أم 75 % أم 49 % عل إجابتك.

استكشف

نشاط

يمثل الجدولان التاليان الأثمان الأصلية والتخفيضات التي اعتمدتها تاجران بإحدى الفضاءات التجارية لأربعة أصناف من البضائع.

التاجر الثاني

الثمن الأصلي بالدينار	قيمة التخفيض بالدينار
20	15
3	1,5

التاجر الثاني

الثمن الأصلي بالدينار	قيمة التخفيض بالدينار	نسبة التخفيض في صيغة عدد كسري	النسبة المئوية للتخفيض
20	10		
3	2		
$\frac{3}{20}$			
15%			

1 - انقل وأتم تعمير الجدولين التاليين

التاجر الأول

الثمن الأصلي بالدينار	قيمة التخفيض بالدينار
16	10
1,920	1,200

الثمن الأصلي بالدينار	قيمة التخفيض بالدينار	نسبة التخفيض في صيغة عدد كسري	النسبة المئوية للتخفيض
16	6		
1,920	4		
		$\frac{3}{25}$	12%

أي التّاجرين اعتمد نسبة تخفيض ثابتة؟





$$\frac{0,480}{4} = \frac{0,420}{6} = \frac{1,200}{10} = \frac{1,920}{16} = \frac{3}{16} = \frac{12}{25} = \frac{100}{100}$$

نلاحظ أن $\frac{3}{16}$ نقول بالنسبة لهذا التاجر أن التخفيض متناسب مع الثمن وأن التخفيض $0,480$ و $0,720$ $1,200$ $1,920$ متناسبة مع الأثمان $4, 6, 10, 16$.

العدد $\frac{3}{25}$ يسمى عامل التناوب و 12% تسمى النسبة المأوية للتخفيض.

نّاط 2

خرجت سيارتان من مدينة في اتجاه مدينة أخرى تبعد عنها 60 km .

الوضعية الثانية					الوضعية الأولى																								
يمثل الجدول (II) أسفله المسافة التي قطعتها السيارة الثانية (بالكيلومتر) حسب مدة سيرها t بالدقيقة.					يمثل الرسم (I) أسفله المسافة d التي قطعتها السيارة الأولى (بالكيلومتر) حسب مدة سيرها t بالدقيقة.																								
مدة السير t بالدّقائق					مسافة المقطوعة d بالكيلومتر																								
40	30	20	10		60	50	30	20																					
(1) انقل الجدول التالي وأتممه					(1) انقل الجدول التالي وأتممه																								
مدة السير t بالدّقائق					مسافة المقطوعة d بالكيلومتر																								
40	30	20	10		60	50	30	20																					
$\frac{d}{t}$					$\frac{d}{t}$																								
(2) هل أن المتغيرين d و t متناسبان؟					(2) هل أن المتغيرين d و t متناسبان؟																								
(3) انقل المعين التالي وعين عليه الأربع نقاط التالية: $M(10,20)$; $N(20,30)$; $P(30,50)$; $Q(40,60)$					(3) هل هذه النّقط على استقامة واحدة؟																								
																													
																													
<table border="1"> <tr> <td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>10</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>مدة السير t بالدّقائق</td> </tr> </table>					40	30	20	10						مدة السير t بالدّقائق	<table border="1"> <tr> <td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>10</td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>مسافة المقطوعة d بالكيلومتر</td> </tr> </table>					40	30	20	10						مسافة المقطوعة d بالكيلومتر
40	30	20	10																										
				مدة السير t بالدّقائق																									
40	30	20	10																										
				مسافة المقطوعة d بالكيلومتر																									
15					$\frac{15}{10} = \frac{3}{2}$																								
$\frac{d}{t}$					$\frac{d}{t}$																								

بالنسبة للسيارة الأولى نلاحظ مايلي

* - المسافة المقطوعة تتغير بتغيير مدة السير بتغيير مدة السير ولكن النسبة $\frac{d}{t}$ بقيت ثابتة (ومتساوية لـ $\frac{3}{2}$)

* - الرسم البياني عدد I هو مستقيم يمر من النقطة O أصل المعيين. في هذه الحالة نقول أن

1- المتغيرين d و t متتناسيان وأن $\frac{3}{2}$ هو عامل التنااسب.

2- الأعداد 15 و 30 و 45 و 60 متتناسية طردا على التوالي مع الأعداد 10 و 20 و 30 و 40.

$$\frac{15}{10} = \frac{30}{20} = \frac{45}{30} = \frac{60}{40} = \frac{3}{2}$$

3- الجدول

40	30	20	10
60	45	30	15

هو جدول تنااسب طردي

بصفة عامة نعتبر الجدول التالي :

x	a'	b'	c'	d'
y	a	b	c	d

حيث $a, b, c, d, a', b', c', d'$ أعداد كسرية مخالفة للصفر.

إذا كان لدينا ...
 $\frac{y}{x} = \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \dots$
فإن ذلك يعني أن

1- الجدول جدول تنااسب طردي

2- الأعداد $a, b, c, d, a', b', c', d'$ متتناسية طردا مع الأعداد a', b', c', d'

3- المتغيرين x و y متتناسيان طرديا

4- الرسم البياني لـ y بدلالة x في معين (O, I, J) هو مستقيم يمر من النقطة O أصل المعيين

تطبيقات

من بين الجداول التالية ماهي جداول التنااسب وماهي عوامل التنااسب لهذه الأخيرة ؟

الجدول الثالث

3	4.5	7.5	12
7	10.5	17.5	15

الجدول الثاني

18	3	15	21
75	12.5	62.5	77.5

الجدول الأول


80	12	20	32
60	9	15	24

(1) أي الرسوم البيانية التالية تمثل وضعية تنااسب ؟

1

2

2) بالنسبة لكل حالة تناسب عدد عامل التناسب .



3

في المستوى المترن بمعين (O, I, J) نعتبر النقاط التالية

$$A(-1 ; -0,4) ; B(0,5 ; 0,2) ; C(3 ; 1,2) ; D(7; 2,8)$$

أثبت ان هذه النقاط تنتمي الى مستقيم يمر من النقطة O. ارسم هذا المستقيم .

4

نعتبر قرصا دائريا شعاعه R و نرمز بـ P لمحيطه و بـ S لمساحته.

-أ-أنقل وأتمم الجدول التالي :

10	7	3,5	2	1	الشعاع R بالمتر
	14π				المحيط P بالمتر
		12,25 π			المساحة S بالمتر المربع

ب- هل أن المتغيرين P و R متناسبان طردا ؟ إن كانا كذلك ما هو عامل التناسب ؟

ج- هل أن المتغيرين S و R متناسبان طردا ؟ إن كانا كذلك ما هو عامل التناسب ؟

ćمارین مرفقة بحل

1

1) ابحث عن العدد ليكون الجدول التالي جدول تناسب

3	2
$a + 3$	a

.أ) إبحث عن العدد b ليكون العددان $14b$ و $10 + b$ متناسبين طردا مع 7 و 3 .

-ب) ابحث عن العددين b و c اذا علمت أن الأعداد $c+2$; $b+10$; $14b$ متناسبة طردا مع الأعداد 7 ; 3 ; 4

1) الجدول السابق جدول تنااسب

يعني العددان a و $a+3$ متناسبان طردا مع العددان 2 و 3

$$\text{يعني } \frac{a}{2} = \frac{a+3}{3}$$

$$\text{يعني } 2a + 6 = 3a$$

$$\text{يعني } a = 6$$

وفي هذه الحالة يصبح الجدول

3	2
9	6

وعامل التنااسب هو 3

1- أ) العددان 14b و $\frac{10+b}{3}$ متناسبين طردا مع 7 و 3 يعني

$$\frac{14b}{7} = \frac{10+b}{3}$$

$$\text{يعني } 2b = \frac{b+10}{3}$$

$$\text{يعني } 6b = b + 10$$

$$\text{يعني } 5b = 10$$

$$\text{يعني } b = 2$$

2- ب) الأعداد 4 ; 3 ; 10 + b ; 14b متناسبة طردا مع الأعداد 7 ; 2 ; c+2

$$\text{يعني } \frac{14b}{7} = \frac{10+b}{3} = \frac{c+2}{2}$$

$$\text{يعني } \frac{10+b}{3} = \frac{c+2}{4} \text{ و } \frac{14b}{7} = \frac{10+b}{3}$$

$$\text{يعني } \frac{10+b}{3} = \frac{c+2}{4} \text{ و } b = 2$$

إذا عوضنا b بقيمتها في المساواة

يصبح لدينا

$$\frac{12}{3} = \frac{c+2}{4}$$

$$\text{يعني } 16 = c + 2$$

$$\text{يعني } c = 14$$

بالتالي تكون الأعداد 14b , 12 , 10 + b و 16 متناسبة طردا مع الأعداد 7 ، 3 و 4

إذا كان $b = 2$ و $c = 14$

وفي هذه الحالة فإن $c + 2 = 16$; $10 + b = 12$; $14b = 28$

والأعداد 28 ، 12 و 16 متناسبة طردا مع الأعداد 7 ، 3 و 4

نشاط (الرَّابع التَّناسُبِي)

انقل واتم تعمير جداول التناسب الطردي التالية

2	0,25
.....	7,5

.....	-21
6	14

2,5
3,2	5

2	5
6

في كل جدول من جداول التناسب الطردي السابقة معرفة 3 أعداد منه تمكن من معرفة العدد الرابع. يسمى هذا العدد الرَّابع التَّناسُبِي

تطبيقة

1. يبيّن الجدول التالي سعر بضاعة بالدينار حسب وزنها بالكيلوغرام. انقل هذا الجدول وأتممه.

		2	5,5	3,5	الوزن بالكيلوغرام
12,500	3,750			8,750	السعر بالدينار


2. تستهلك سيارة 8 لترات من البنزين لكل 100 km

1. ما هي المسافة التي تقطعها بـ 26 لترا من البنزين ؟

2. ما هي كمية البنزين اللازمة لقطع 420 km ؟

3. يتمطط نابض بشكل متناسب مع الكتلة المعلقة به.
تأمل الصور التالية وحدد طول النابض في الوضعية الثالثة.

الوضعية الأولى الوضعية الثانية الوضعية الثالثة



4. يتمدد عمود حديدي بشكل متناسب مع درجة الحرارة التي يتعرض لها
إذا كان طوله 76,40cm في درجة حرارة 20°C وطوله 76,55cm في درجة حرارة 100°C
فما هو طوله في درجة حرارة 200°C ؟

بعض خاصيّات التّناسب الْطّردي

نشاط 1

إذا كان ثمن $3,5 \text{ kg}$ من التفاح بالدينار هو $10,150$ فما هو ثمن $0,5 \text{ kg}$ ؟

نشاط 2

نعتبر جدول التّناسب التالي حيث a, b, c, d و k أعداد كسرية نسبية مخالفة للصفر

d	b
c	a

أثبت أن كل جدول من الجداول التالية هو أيضاً جدول تنساب

kb	d	b
ka	c	a

$b-d$	d	b
$a-c$	c	a

$b+d$	d	b
$a+c$	c	a

إذا كان العددان a و c متناسبين مع العدددين b و d فإن

* الأعداد a و c و b و d متناسبة مع الأعداد $b+d$ و d وأي $b+d$ و d يعنى $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$

* الأعداد a و c و $b-d$ و d متناسبة مع الأعداد b و d يعنى $\frac{a}{b-d} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$

* الأعداد a و c و k و a متناسبة مع الأعداد kb و d و b يعنى $\frac{a}{d} = \frac{c}{kb} = \frac{ka}{b}$

مهما كان العدد الكسري النسبي المخالف للصفر .

تطبيقات

1

انقل جدول التّناسب التالي واتّممه.

$a - \frac{1}{2}b + \frac{3}{4}c$		$2a-3b-5c$	$a+b+c$		c	b	a
	$\frac{2}{3}x-y$			$x-y+z$	z	y	x

2

يُنتج $1,50 \text{ kg}$ من إحدى البذور 27 قنطراء.

انقل الجدول التالي واتّممه

$9,50$	$13,50$		600		$1,50$	البذور بالكيلوغرام
		135		81	27	الإنتاج بالقنطار

3

جد كتابة كسرية للعدد $\frac{3}{7}$ يكون الفارق بين مقامها وبسطتها 68

4

5

أعمار أب وأبنائه الثلاثة متناسبة طرداً مع الأعداد 15 ، 7 ، 5 و 4 .
ما هو عمر كل واحد منهم إذا علمت أن مجموع أعمار الأولاد يفوق عمر الأب بثلاث سنوات

ابحث عن عددين x و y حيث $11x - 13y = 9$ و $\frac{x}{y} = \frac{7}{4}$

1

ćمارين مدفقة بحلٌ

جد كتابة كسرية للعدد $\frac{3}{11}$ يكون مجموع بسطها ومقامها 112

الحل : الطريقة الأولى

المطلوب هو إيجاد عددين a و b بحيث

$$a + b = 112 \quad \text{و} \quad \frac{a}{b} = \frac{3}{11}$$

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{11} \quad \text{يعني} \quad \frac{a}{b} = \frac{3}{11}$$

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{11} = \frac{a+b}{3+11} \quad \text{يعني} \quad \frac{a}{3} = \frac{b}{11}$$

وبما أن $a + b = 112$ فإن

$$\frac{a}{3} = \frac{b}{11} = \frac{a+b}{3+11} = \frac{112}{14} = 8$$

وبالتالي

$$b = 88 \quad \text{أي} \quad \frac{b}{11} = 8 \quad \text{و} \quad a = 24 \quad \text{أي} \quad \frac{a}{3} = 8$$

$\frac{24}{88}$ هي إذن كتابة أخرى للعدد $\frac{3}{11}$ مجموع بسطها ومقامها 112

الحل : الطريقة الثانية

المطلوب هو إيجاد عدد x بحيث

$$3x + 11x = 112 \quad \text{و} \quad \frac{3}{11} = \frac{3x}{11x}$$

$$\frac{3}{11} = \frac{3x}{11x} = \frac{24}{88} \quad \text{يعني} \quad 14x = 112 \quad \text{يعني} \quad x = 8 \quad \text{وبالتالي فإن}$$

لرجل 3 أبناء آعمارهم 5 سنوات و 11 سنة و 14 سنة . وزع عليهم يوم العيد مبلغاً قدره 84 ديناراً .

وكان نصيب كل ولد متناسباً طرداً مع عمره .

ما هو مناب كل واحد ؟

2

نرمز بـ a و b و c لمنابات الأطفال الثلاثة

بما أن المنابات متناسبة مع الأعمار فذلك يعني

$$\frac{a}{5} = \frac{b}{11} = \frac{c}{14}$$

$$\text{إذا } \frac{a}{5} = \frac{b}{11} = \frac{c}{14} = \frac{a+b+c}{5+11+14} = \frac{84}{30} = \frac{14}{5}$$

$$\text{إذ يصبح لدينا } a = \frac{14}{5} \text{ يعني } a = 14$$

$$b = \frac{154}{5} \text{ يعني } b = \frac{14}{11} \times 11 = 14$$

$$5c = 196 \text{ يعني } c = \frac{14}{5} \times 14 = 28$$

$$c = \frac{196}{5} = \frac{39,200}{14} \text{ يعني } c = 39,200$$

يمكننا التتحقق من صحة الإجابة كما يلي :

$$a + b + c = 14 + 30,800 + 39,200 = 84$$

ب) المبالغ $14, 11, 5$ متناسبة طرداً مع الأعمار $39,200, 30,800, 14$

$$\text{أي } \frac{14}{5} = \frac{30,800}{11} = \frac{39,200}{14}$$

الأشكال المتشابهة

نشاط 1

ارسم مثلثاً ABC

ارسم على نصف المستقيم (AB) النقطة M حيث

ارسم على نصف المستقيم(AC)نقطة N حيث

$$(1) \text{ تتحقق أن } \frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC} = 3$$

2) نرمز بـ P لمحيط المثلث AMN و بـ P' لمحيط المثلث ABC

$$\text{أثبت أن } \frac{P}{P'} = 3$$

نستنتج أن أضلاع المثلث AMN و محيطه متناسبة مع أضلاع المثلث ABC ومحيطه وعامل التشابه يساوي 3

كما أن أضلاع المثلث ABC متناسبة مع أضلاع المثلث AMN وعامل التشابه يساوي $\frac{1}{3}$
نقول في هذه الحالة أن

1 - * المثلث AMN مشابه للمثلث ABC وعامل التشابه هو 3

(أو المثلث AMN هو تكبير للمثلث ABC وعامل التكبير هو 3)

2 - * المثلث ABC مشابه للمثلث AMN وعامل التشابه هو $\frac{1}{3}$

أو (المثلث ABC هو تصغير للمثلث AMN وعامل التصغير هو $\frac{1}{3}$)

3 - * المثلثان AMN و ABC متشابهان



- أرسم مثلثاً ABC قائماً في A
ابن النقطة M مناظرة النقطة B بالنسبة للنقطة A
ابن النقطة N مناظرة النقطة B بالنسبة للنقطة C
- 1) حُقِّق أن $\frac{MN}{AC} = \frac{MP}{AB}$ استناداً إلى المثلث MBN مشابه للمثلث ABC ما هو عامل التشابه؟
- 2) نرمز بـ P و S على الترتيب لمحيط و مساحة المثلث ABC و نرمز بـ P' و S' على الترتيب لمحيط و مساحة المثلث MBN .
أحسب P بدلالة P' وأحسب S بدلالة S' .


بصفة عامة

نقول عن مُضلعين أنهما متشابهان إذا كانت أضلاع الواحد متناسبة على الترتيب مع أضلاع الآخر

- * المثلث MNP مشابه للمثلث ABC يعني $\frac{MN}{AB} = \frac{NP}{AC} = \frac{MP}{BC}$
- * إذا كان الرباعي ABCD مشابه للرباعي IJKL فإن $\frac{AB}{IJ} = \frac{BC}{JK} = \frac{CD}{KL} = \frac{DA}{LJ}$
- * إذا كان عامل التشابه أكبر من واحد نقول أن الشكل الأول هو تكبير للشكل الثاني.

تطبيقات

- نعتبر مثلثين متقابلين ABC و MNP
أثبت أنهما متشابهان . ما هو عامل التشابه
تأمل الرسوم التالية وحدد الأشكال المتشابهة وعوامل تشابهها



1

2

- (1) ابن مثلاً ABC أبعاده بالصنتمر 4 و 5 و 6 .
- (2) أ- ابن مثلاً A'B'C' مشابهاً له وقيس أصغر أضلاعه 6 .
ب- أحسب محطيهما.
- (3) تقدر مساحة المثلث ABC بـ 10cm^2 ما هي مساحة المثلث A'B'C' ؟
- (4) ليكن MNP تصغيراً للمثلث ABC عامله $\frac{3}{4}$
أ- أحسب محيط المثلث MNP .
ب- ما هي مساحته ؟
ج- ما هي أبعاده ؟

التناسب العكسي

نشاط 1

يمثل الجدول التالي أبعاد خمس مستويات.

36	45	60	90	100	L	الطول
25	20	15	10	9	l	العرض
						المساحة $S = L \times l$

أنقل هذا الجدول و أتممه.

نلاحظ أن الأبعاد L و l تغيرت ولكن الجزء $L \times l$ بقي ثابتاً ومساوياً لـ 900 .
نقول في هذه الحالة ان المتغيرين L و l متناسبان عكسيان وأن الأعداد 100 و 90 و 60 و 45 و 36 متناسبة عكسيان مع سلسلة الأعداد 9 و 15 و 20 و 25 .
كما نقول أن الجدول السابق هو جدول تناسب عكسي .
يسمى العدد 900 عامل التناسب

بصفة عامة نقول أن الأعداد a و b و c و d ... متناسبة
عكسيان مع الأعداد a' و b' و c' و d' ... إذا كان
 $a \times a' = b \times b' = c \times c' = d \times d' = \dots$

تطبيق

انقل وأتمم تعديل جدول التناسب العكسي التالي

	40	60		8
24			30	15

يستغرق بناء سياج 160 ساعة من العمل
إذا كان العامل يشتغل 8 ساعات في اليوم

(1) فما هو عدد العمال اللازم لبناء هذا السياج في :

أـ) 10 أيام بـ) 4 أيام

(2) أوكلت مهمة بناء هذا السياج لأربعة عمال ففي كم من يوم ينجزون هذا العمل؟

تمرين هرفة بدل

لأب أربعة أطفال أعمارهم 4 سنوات و 6 سنوات و 8 سنوات و 12 سنة وزع عليهم 15 قطعة شكولاتة.
ما هو نصيب كل واحد منهم إذا علمت أنه متناسب عكسيا مع سنها ؟

الحل

نرمز بـ a ، b ، c و d لمنابات الأطفال

$$a + b + c + d = 15$$

$$4a = 6b = 8c = 12d$$

إذا قسمنا كل طرف في الكتابة $8 \times 6 \times 4 \times 12 = 4a = 6b = 8c = 12d$ على الجزء

$$\frac{4a}{4 \times 6 \times 8 \times 12} = \frac{6b}{4 \times 6 \times 8 \times 12} = \frac{8c}{4 \times 6 \times 8 \times 12} = \frac{12d}{4 \times 6 \times 8 \times 12}$$

$$\frac{a}{6 \times 8 \times 12} = \frac{b}{4 \times 8 \times 12} = \frac{c}{4 \times 6 \times 12} = \frac{d}{4 \times 6 \times 8} \quad \text{يعني}$$

$$\frac{a}{576} = \frac{b}{384} = \frac{c}{288} = \frac{d}{192} \quad \text{يعني}$$

واعتمادا على إحدى خصائص التناسب الطردي يمكننا كتابة

$$\frac{a}{576} = \frac{b}{384} = \frac{c}{288} = \frac{d}{192} = \frac{a+b+c+d}{576+384+288+192} = \frac{15}{1440} = \frac{1}{96}$$

$$\frac{a}{576} = \frac{1}{96} \quad \text{إذن فإن}$$

$$a = \frac{576}{96} = 6 \quad \text{يعني}$$

وبنفس الطريقة نتوصل إلى مايلي

$$b = \frac{384}{96} = 4 ; c = \frac{288}{96} = 3 ; d = \frac{192}{96} = 2$$

النتائج المتحصل عليها مطابقة للمعطيات لأن $a + b + c + d = 6 + 4 + 3 + 2 = 15$
 $2 \times 12 = 8 \times 3 = 6 \times 4 = 4 \times 6$

ملاحظة : إذا وردت كلمة "تناول" دون ذكر "طردي" أو "عكسى" فذلك يقصد به "تناول طردي"

أحوصل

نعتبر الجدول التالي :

x	a'	b'	c'	d'
y	a	b	c	d

حيث $y, d', c', b', a', x, \dots, d, c, b, a$ أعداد كسرية مخالفة للصفر.

إذا كان لدينا

$$\frac{y}{x} = \frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'} = \frac{d}{d'} = \dots$$

فإن ذلك يعني أن

1- الجدول جدول تناسب طردي

2- الأعداد $\dots, d', c', b', a', \dots, d, c, b, a$ متناسبة طردا مع الأعداد

3- المتغيرين x و y متناسبان طردا

4- الرسم البياني لـ y بدلالة x في معين (I, J) هو مستقيم يمر من النقطة O أصل المعين.

إذا كان العددان a و c متناسبين مع العدددين b و d فإن
 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ الأعداد a و c متناسبة مع الأعداد b و d
 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{a-c}{b-d}$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ الأعداد a و c متناسبة مع الأعداد b و d
 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{ka}{kb}$ يعني $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ الأعداد a و c متناسبة مع الأعداد b و d مهما كان العدد الكسري النسبي k . المخالف للصفر.

نقول عن مضلعين انهم متشابهان إذا كانت أضلاع الواحد متناسبة على الترتيب مع أضلاع الآخر

*المثلث MNP مشابه للمثلث ABC يعني $\frac{MN}{AB} = \frac{MP}{AC} = \frac{NP}{BC}$

*الرباعي $ABCD$ مشابه للرباعي $IJKL$ يعني $\frac{AB}{IJ} = \frac{BC}{JK} = \frac{CD}{KL} = \frac{DA}{LI}$

*إذا كان عامل التشابه أكبر من واحد نقول أن الشكل الأول هو تكبير للشكل الثاني

*إذا كان عامل التشابه أصغر من واحد نقول أن الشكل الأول هو تصغير للشكل الثاني

نقول إن الأعداد a و b و c و d متناسبة عكسياً مع الأعداد a' و b' و c' و d' ... إذا كان $a \times a' = b \times b' = c \times c' = d \times d' = \dots$

نَارِيَّة

أ - في طريق عاديّة ب - في طريق سيارة
ج - داخل المدن.

2 - انطلقت هذه السيارة على الساعة الثامنة والربع صباحاً من تونس باتجاه إحدى مدن الجنوب فقطعت ثلث المسافة في الطريق السيارة و 60% منها في طريق عاديّة وقطعت الجزء المتبقى من المسافة والمقدر بـ 30 km داخل المدن.

أ - ماهي المسافة بين المدينتين ؟
ب - ماهي كمية البنزين المستهلكة في هذه السفرة ؟

ج - ما هو معدل سرعة هذه السيارة إذا علمت أنها وصلت المدينة المقصودة على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال ؟

7 اشتري رجل قميصاً منه الأصلي 36 د وتمتع بتخفيض نسبته 4% واشترى معطفاً ثمنه الأصلي 180 د وتمتع بتخفيض نسبته 9%

1 - ما هو المبلغ الجولي لهذه المشتريات ؟
2 - ماهي نسبة التخفيض التي تتمتع بها بشراءه للقميص والمعطف معاً ؟

8 بمناسبة أحد المعارض قرر ثلاثة تجار التخفيض في أسعار بضاعتهم فكتب الأول "تخفيض بـ 20%" و الثاني " تخفيض بربع الثمن الأصلي" وأما الثالث فبضاعته كلها من نفس النوع ومكتوب عليها "الثمن القديم 45 د و الثمن الجديد 35 د".

من هو التاجر الذي يوفر أكبر نسبة تخفيض ؟

9 نعلم أن الأرض تدور حول الشمس بسرعة

$$107.10^3 \text{ Km/h}$$

1 - عبر بكتابه علمية عن سرعة دورانها بالметр في الثانية.

1 حُول ما يلي إلى دقائق

أ - $\frac{3}{4} \text{ h}$ (ثلاثة أرباع الساعة)

ب - $\frac{1}{2} \text{ h}$ (نصف ساعة)

ج - 12,5h

د - 3,7h

2 إذا كانت 9 cm هي المسافة الفاصلة بين المدن.

مدينتين حسب السلم $\frac{1}{500.000}$ فما هي بالكميلومتر

أ - ماهي المسافة الفعلية بينهما ؟

3 إذا كان معدل سرعة دراجة نارية هي 36 km/h

فما هو معدل سرعتها بالمتر في الثانية (m/s) ؟

4 قطع علي مسافة 1.6 km في 20 دقيقة و

قطع محمد مسافة 250 m في 3 دقائق أما

أحمد فقد قطع مسافة 450 m في 5 دقائق.

أيهما أسرع

5 توفر محطة توزيع مياه صالحة للشرب 2 متر

مكعب في الثانية وتستهلك العائلة الواحدة معدل 400 لتر كل 24 ساعة.

كم من عائلة يمكن ان تستفيد من هذه المحطة ؟


6 يبين الجدول التالي معدل استهلاك سيارة

من البنزين (باللتر) في 100 km حسب سيرها في طريق عاديّة او في الطريق السيارة او داخل المدن .

طريق عاديّة	طريق سيارة داخل المدن	معدل الاستهلاك باللتر في 100 km
12	10	8

1 - ما هي المسافة التي يمكن قطعها بـ 16 لترا من البنزين ؟

تملأ الأوعية الثلاثة التالية بنفس الطريقة وبحساب لتر واحد في الثانية وتمثل الرسم البياني ارتفاع الماء بهذه الأوعية حسب المدة.





- حدد التمثيل البياني الموافق لكل وعاء.

ساهم ثلاثة اشخاص بالمبالغ التالية 50.000 د و 110.000 د و 140.000 د لتأسيس شركة وبعد سنة كانت مرباحي هذه الشركة 48.000 د اقتسمها الشركاء بشكل مناسب مع مبالغ مساهماتهم في راس المال.
ما هو مناب كل شريك ؟

$$9a + 7b = 5 \quad \text{و} \quad b = \frac{3}{4}a \quad \text{حيث}$$

من بين الرسم التالية ما هي التي تمثل وضعية تناسب طردية وما هي عوامل التناسب ؟



2- إذا كانت الأرض تتم دورة كاملة حول الشمس في 365 يوما و 6 ساعات فما هي المسافة التي يقطعها في هذه الدورة ؟
أعط قيمة تقديرية بالآلاف لهذه المسافة.

10 تبلغ سرعة الضوء 300.000 Km/s

1 - عبر بكتابة علمية عن سرعته بالكميلومتر في الساعة

2 - السنة الضئوية هي وحدة قيس تساوي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة (365 يوما و 6 ساعات).

ما هي قيمة السنة الضئوية بالكميلومتر؟ اعط قيمة تقديرية بالمليين لذلك.

3- تقدر المسافة بين الأرض والشمس بـ $1.5 \cdot 10^8$ Km ما هو الوقت الذي يقضيه ضوء بين الشمس والأرض ؟

11 من بين الجداول التالية ماهي جداول التناسب الطردي وما هي عوامل التناسب لهذه الأخيرة ؟

الجدول الأول				الجدول الثاني			
75	12,5	62,5	77,5	-7,5	15	-3	4,5
18	3	15	21	2,5	-5	1	1,5

الجدول الثالث			
- 7	10,5	-17,5	-15
3	-4,5	7,5	12

12 انقل واتمم جداول التناسب الطردي التالية

الجدول الثاني				الجدول الأول			
6,25		10	5	-28	56	2,25	
	-3	4		8			-5,8

الجدول الثالث			
	1		0,5
-2,75	4	36	

17

تحتوي عمارة على 12 شقة .

شقتان بالطابق السفلي 3 شقق بالطابق الاول 4 شقق بالطابق الثاني و 3 شقق بالطابق الثالث. تكفل المتساكنون بتجهيز هذه العمارة بمصعد قدرت تكاليفه بـ 350,000.

ما هو المبلغ الذي ساهم به كل واحد منهم اذا علمت أنه متناسب طردا مع رقم الطابق الذي توجد به شقته ؟

- 21 انقل واتم تعمير جدول التنااسب العكسي التالي :

-6		-8		-4
	2,5		30	15

18

960 m²; 650 m²; 840 m²; 750 m² و

هي مساحات أربع قطع أرض صالحة للبناء تكلفت تهيئة هذه الأرضي 24.000 د ما هي تكلفة تهيئة كل وحدة منها علما أنها بيضة بيض عشر دجاجات في عشرة أيام متناسبة مع مساحتها ؟

19


- 23 تحمل باخرة 800 جنديا ولها ما يكفيها من المؤونة لمدة 90 يوما. بعد 40 يوما من الإبحار انضم إليها 200 جندي . بعد كم يوم تنفذ المؤونة ؟

يشغل عاملان بنفس الحضيرة ويتقاضيان معاً أجرا يوميا قدره 20 د . في أحد الأشهر كان الأول قد اشتغل لمدة 27 يوما والثاني لمدة 23 يوما فنالا مقابل ذلك مبلغا جمليا قدره 492 د .

ما هو الأجر اليومي لكل واحد منها ؟

20

- 1) أرسم مثلثا MNP مشابه للمثلث ABC أصله ويعيس أطول أضلاعه 10 cm



- 24 يبني ثلاثة عمال حائطا طوله 6 أمتار وارتفاعه متر واحد في ساعة .
1) في كم من ساعة يبني خمسة عمال يشتغلون بنفس الطريقة وبنفس الوتيرة حائطا طوله 12 مترا وارتفاعه متر واحد ؟
2) ما هو طول حائط ارتفاعه متر واحد تم بناءه من طرف أربعة عمال في ساعة ونصف ؟

أنشطة في الإحصاء

- أمثلة لظواهر عشوائية



أبو الوفا البوزجاني

أبو الوفا محمد بن محمد بن يحيى بن إسماعيل البوزجاني (940 – 998) رياضياتي وفلكي فارسي عاش في بغداد.

تعلم الرياضيات، ثم تخصص في حساب المثلثات. وقد سحرت بحوثه بعض العلماء الغرب ومن بينهم "ريجيوس مانتانوس" الذي ادعى بعض نظرياته وموضوعاته الرياضية وهو مكتشف الخل الثالث في حركة القمر، اطلق اسمه على فوهة بركانية بالقمر، فوهة أبو الوفا. طور جهازاً لحساب درجة ميل الأجرام الفلكية. وهو أول من اخترع دالة الظل (المماس، "ظا"، tangent) وحسن طرق حساب جداول حساب المثلثات. وقد طور وسائل جديدة لحل مسائل المثلثات الكروية.

المجلة العربية العلمية للفتيان

من كالمعلم في الأنعام حياته

شمع يظلّ لغيره موقداً

(عامر بحيري)

أنشطة في الإحصاء والاحتمالات

استخدم

1

إذا كانت نتائج دراسة إحصائية
في صورة أعداد نقول أن السلسلة
المتحصلة عليها ذات ميزة كمية

في ما يلي درجات الحرارة المسجلة بإحدى المدن
خلال شهر جويلية :
37, 35, 38, 37, 35, 34, 33, 37, 38, 32
35, 34, 35, 35, 37, 39, 38, 35, 37, 35, 34
.32, 35, 36, 38, 37, 32, 37, 39, 37

درجات الحرارة المسجلة تسمى
قيم هذه السلسلة الإحصائية وعدد
أيام شهر جويلية (31) يسمى
تكرارها الجملي.

1 - حوصل هذه السلسلة الإحصائية في جدول وفقا
للمنوال التالي :

القيمة الموافقة لأكبر تكرار في
سلسلة إحصائية يسمى منوالها
والفارق بين أصغر قيمة وأكبرها
يسمى مداها.

درجات الحرارة	عدد الأيام
39	
38	
37	
36	
35	
34	
33	
32	

2 - مثل السلسلة الإحصائية بمخطط العصبيات ورسم مطلع التكرارات.


أ) ما هو معدل درجة الحرارة بهذه المدينة في شهر جويلية ؟

ب) حدد مدى ومنوال هذه السلسلة.

أ.3) ما هو عدد الأيام التي سجلت بها درجة حرارة تفوق 36 درجة ؟

ب) ما هو عدد الأيام التي سجلت بها درجة حرارة أقل من 36 درجة ؟

يمثل مخطط العصيات التالي نتائج دراسة إحصائية شملت 150 أسرة للتعرف إلى عدد الأطفال بكل منها.



أنشطة في الاحصاء

1 - انقل مخطط العصيات وارسم مصلع التكرارات.

2 - انقل الجدول التالي ثم أكمله باعتماد هذا المخطط.

التواء (%)	النسبة المئوية	عدد الأسر	عدد الأطفال
23		7	

3. رسم مصلع التواتر.


4. ما هو مدى و منوال هذه السلسلة الإحصائية ؟

5. ما هو معدل عدد الأطفال بكل أسرة ؟

6. أ) ما هي نسبة الأسر التي لها أقل من 3 أطفال ؟

ب) ما هي نسبة الأسر التي لها أكثر من طفلين ؟

يمثل المخطط الدائري التالي توزُّع 650 تلميذاً بإحدى المدارس الإعدادية حسب نوع الرياضة التي يمارسونها.



أ) انقل الجدول التالي و أكمله باعتماد المخطط السابق.

ألعاب القوى	كرة السلة	كرة القدم	كرة اليد	نوع الرياضة
عدد التلاميذ				

ب) ما هي الرياضة التي يمارسها أكبر عدد من التلاميذ ؟

يمثل الجدول التالي مدخلات شهر جوilya لمغازة مختصة في بيع الهدايا التذكارية حسب الصنف.

الصنف	بطاقات بريدية	ملابس	تحف	ساعات يدوية	بضاعة متنوعة
المبيعات بالدينار	240	360	440	160	360
النسبة المئوية					

أ) أنقل الجدول ثم أكمله

ب) ما هو الصنف الذي سجّل أكبر مدخل مالي؟

ج) ما هي الأصناف التي سجلت مدخولاً يفوق 300 دينار؟ أقلّ من 200 دينار؟

د) مثل الجدول السابق بمخطط القطاع الدائري.

تمثل سلسلة الأعداد التالية أقيسة طول القامة لـ 100 تلميذ من مدرسة إعدادية بالصنتمر.

145 - 145 - 146 - 147 - 147 - 147 - 148 - 148 - 148 - 148 - 149 - 149 - 150 - 150
 - 156 - 156 - 156 - 157 - 157 - 157 - 140 - 140 - 141 - 142 - 143 - 142 - 144 - 145 -
 151 - 151 - 152 - 152 - 152 - 153 - 153 - 154 - 154 - 154 - 155 - 155 - 155 - 156
 - 160 - 160 - 160 - 160 - 162 - 162 - 162 - 163 - 163 - 163 - 150 - 151 - 151 -
 170 - 171 - 157 - 157 - 158 - 158 - 158 - 158 - 159 - 159 - 159 - 159 - 160 - 160
 165 - 165 - 165 - 165 - 166 - 166 - 166 - 167 - 167 - 167 - 167 - 168 - 168 - 168 - 170 -
 173 - 173 - 175 - 175 - 177 - 177 - 179 - 179 - 163 - 164 - 164 - 164 - 165 -
 - 171 - 172 -

1 - انقل الجدول التالي ثم أكمله.

طول القامة بالصنتمر	عدد التلاميذ

2 - انقل الجدول التالي ثم أكمله.

من 175	من 170	من 165	من 160	من 155	من 150	من 145	من 140	من 135	عدد التلاميذ
180	175	170	165	160	155	150	145		
								13	7


نلاحظ أنه تم توزيع قيم هذه الميزة إلى ثمان مجموعات بحيث يكون الفرق بين الأطوال في كل منها لا يفوق 5 (مثلا)

تسمى كل مجموعة فئة.

ميزة قيمها مجتمعة في فئات تسمى ميزة مسترسلة.

اذكر من خلال الجدول السابق ثلاث فئات و التكرار الموافق لكل منها.

3 - لتمثيل الجدول السابق بمخطط ، رسم الأستاذ معينا وقام بتمثيل الفئة الأولى "من 140 إلى مادون 145" الموافقة للتكرار "7 تلاميذ" كما هو مبين في الرسم التالي :



4 - انقل المخطط السابق على كراسك ثم ارسم المستويات الموافقة لبقية الفئات.
يسمى المخطط المتحصل عليه : **مخطط المستويات**.

**تمثّل سلسلة إحصائية مسترسلة بمخطط
يسمي مخطط المستويات**

2

نشاط

قامت بلدية مدينة بدراسة إحصائية حول عدد السيارات القادمة إلى هذه المدينة والخارجة منها كل أربع ساعات خلال الأربع وعشرين ساعة لأحد أيام السوق الأسبوعية فكانت النتائج كما هو مبين بالجدول التالي :

الفترة (بالساعة)	عدد السيارات	من منتصف الليل إلى ما قبل الساعة 4	من الساعة 4 إلى ما قبل الساعة 8	من الساعة 8 إلى ما قبل الساعة 12	من الساعة 12 إلى ما قبل الساعة 20	من الساعة 20 إلى ما قبل الساعة 24
	120	100	360	200	50	170


- اذكر ثلاث فئات لهذه الميزة والتكرارات الموافقة لها.
- ارسم مخطط المستويات الممثل لهذه السلسلة الإحصائية.
- نريد رسم مخلع التكرارات لهذه السلسلة.

أ) انقل الجدول التالي ثم أكمل بما يناسب :

الفئة	عدد السيارات	100	360	200	50	170	$\frac{20+24}{2} = 22$	ما قبل الساعة 24 من الساعة 20 إلى
مركز الفئة							$\frac{0+4}{2} = 2$	
الفناء								

مركز الفئة هو
المعدل الحسابي لطريقه

- ب) نعتبر المعين التالي حيث عيناً كلاً من النقطة A التي تمثل المركز (2) للفئة الأولى و التكرار (100) الموافق له و النقطة F التي تمثل المركز (22) للفئة الأخير و التكرار (120) الموافق له.



انقله على كراسك ثم عين النقاط B و C و D و E التي تربط مراكز بقية الفئات بتكراراتها.

- ج) ارسم قطع المستقيمات [AB] و [BC] و [CD] و [DE] و [EF] المتصل عليه يسمى: مضلع التكرارات.

قام مدير مدرسة إعدادية بسبر للآراء لمعرفة المدة التي يقضيها كلّ تلميذ لقطع المسافة الفاصلة بين منزله والمدرسة فتحصل على النتائج المقدمة بالجدول التالي :

النهاية العلويّة للمدة بالدقيقة	من 0 إلى أقلّ من 15	من 15 إلى أقلّ من 30	من 30 إلى أقلّ من 45	من 45 إلى أقلّ من 60	المدة بالدقيقة
7,5	100	50	170	120	مركز الفئة
عدد التلاميذ					

انقل الجدول على كراسك ثم أكمله.

احسب باعتبار مراكز الفئات معدل المدة الزمنية (بالدقيقة) التي يقضيها التلاميذ بين المنزل والمدرسة.


تطبيقات

1. قامت إحدى الجمعيات بدراسة إحصائية تخصّ مجموعة من الطلبة حول المبلغ المالي الذي ينفقه يومياً كلّ واحد منهم فجمعت المعلومات ونظمتها في الجدول التالي :

النهاية العلويّة للمبلغ بالدينار	من 0 إلى أقلّ من 1	من 1 إلى أقلّ من 2	من 2 إلى أقلّ من 3	من 3 إلى أقلّ من 4	من 4 إلى أقلّ من 5	المبلغ بالدينار
مركز الفئة						
عدد الطلبة	32	55	24	15	7	
التوترات						

2. مثل هذه السلسلة بمخطط المستطيلات،
 3. ما هو المبلغ الذي تنفقه أكبر نسبة من الطلبة ؟
 4. ما هو معدل الإنفاق بالنسبة إلى هؤلاء الطلبة ؟

يمثل مخطط المستطيلات التالي توزُّع نتائج 32 تلميذاً في مسابقة رمي الكرة الحديدية.



1. ما هي النتيجة التي تحصل عليها أكبر عدد من التلاميذ؟ أصغر عدد من التلاميذ؟
2. أنقل الجدول التالي ثم أكمله.

من 11 إلى 13 أقل من	من 9 إلى 11 أقل من	من 7 إلى 9 أقل من	من 5 إلى 7 أقل من	المسافة بالمتر
				عدد التلاميذ
				مركز الفئة
				التوتر

3. ما هو معدَّل النتائج التي تحصل عليها التلاميذ؟
4. مثل هذه السلسلة بمخلع التواترات.

نشاط 4

يمثل الجدول التالي عدد الهواتف الخلوية لدى 15 عائلة تم استجوابها

5	4	3	2	1	0	عدد الهاتف
1	2	1	2	6	3	عدد العائلات



1. أعط منوال و مدى هذه السلسلة.

2. أحسب معدّل عدد الهواتف الخلوية بالعائلة الواحدة.

يمكن إعادة تنظيم هذه النتائج بالطريقة التالية:

نكتب النتائج مرتبة تصاعدياً (أو تنازلياً) وبصورة فردية أي بالنسبة إلى كل عائلة، نتحصل على ما يلي :

5	4	4	3	2	2	1	(1)	1	1	1	0	0	0
7 عائلات							7 عائلات						

يمثل العدد 1 المؤطر قيمة الميزة التي تقسّم السلسلة إلى جزئين لهما نفس التكرار (7).

تسمى هذه القيمة موسّط الميزة و نرمز لها بـ M_e

موسّط سلسلة إحصائية هو
قيمة للميزة تجزء السلسلة
إلى جزئين لهما نفس التكرار

نشاط 5

يمثل الجدول التالي الأعداد التي تحصل عليها 14 تلميذاً في فرض الرياضيات.

العدد	15	14	13	12	11	10	9	8	7
عدد التلاميذ	2	1	2	2	1	1	2	1	2

1. ما هو منوال و مدى هذه السلسلة ؟


2. احسب معدّل هذه المجموعة من التلاميذ.

3. نريد إيجاد موسّط هذه الميزة.

قم بتنظيم هذه السلسلة كما في النشاط السابق. هل يمكن تحديد الموسّط M_e ؟

في هذه الحالة يُصطلح أن يؤخذ المعدّل الحسابي لـ 11 و 12 وبالتالي $M_e = \frac{11+12}{2} = 11,5$

يمثل مخطط العصيات التالي توزُّع مشاركي نادي سباحة حسب أعمارهم



1. ما هو عدد المشاركين بهذا النادي ؟
2. انقل الجدول التالي ثم أتممه.

						العمر بالسنة
						التكرار
						التواءات بالنسبة المئوية

3. ما هو عدد المشاركين بهذا النادي ؟
4. اعط منوال وموسٌط هذه السلسلة الإحصائية .
5. ارسم مخلل التواءات .

أمثلة لظواهر عشوائية

1 نشاط

1. يحتوي كيس 3 قريصات حمراء و 3 قريصات زرقاء. قام محمد بسحب قريص من الكيس بطريقة عشوائية، سجل لونه وأرجعه داخل الكيس ثم كرر التجربة 24 مرة فتحصل على النتائج التالية :

نقول عن تجربة أنها عشوائية عندما لا يمكن أن نجزم بصفة قطعية نتيجة التجربة قبل ظهورها.

أزرق - أزرق - أحمر - أزرق - أحمر - أزرق -
أحمر - أزرق - أحمر - أزرق - أحمر - أزرق -
أزرق - أحمر - أحمر - أزرق - أحمر - أزرق -
أحمر.

حصل النتائج التي تحصل عليها محمد في الجدول التالي :

سحب القرص الأزرق	سحب القرص الأحمر	
		عدد المرات
		التوافر بالنسبة المئوية

انقله على كراسك ثم أكمله.

2. هل يمكن أن نقول أن 50% من السحب أظهر القرص الأحمر؟

3. ما هو تواتر ظهور القرص الأزرق؟

4. كرر محمد التجربة 40 مرة فتحصل على النتائج التالية :

أزرق - أحمر - أزرق - أحمر - أحمر - أزرق - أحمر - أحمر - أحمر - أزرق -
أزرق - أحمر - أحمر - أزرق - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر -
أزرق - أحمر - أحمر - أزرق - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر - أحمر.

أ) انقل الجدول التالي على كراسك ثم أكمله

سحب القرص الأزرق	سحب القرص الأحمر	
		عدد المرات
		التوافر بالنسبة المئوية

سُحب أعداد عشوائية بواسطة الآلة الحاسبة.

توفر الآلة الحاسبة العلمية أعداداً عشوائية بواسطة الزر «RANDOM» أو «ALEA» أو «rand ...»

عندما نضغط على الزر «RANDOM» مرة واحدة نحصل على عدد عشري محصور بين 0 و 1 و جزءه العشري يشكل قائمة ذات 3 أرقام عشوائية أو أكثر حسب نوع الآلة. نعتبر آلة حاسبة تعرض أعداداً عشوائية بثلاثة أرقام بعد الفاصل. كرر تلميذ التجربة 30 مرة فتحصل على النتائج التالية :

-154 -932 -202 -353 -147 -925 -957 -989 -513 -410 -696 -847 -760 -046
-024 -802 -699 -104 -509 -660 -319 -724 -621 -772 -296 -193 -971 -630
214 -619

أ) انقل الجدول التالي على كراسك ثم أكمله.

الرقم	عدد المرات	التواءت بالنسبة المئوية
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0		

ب) ارسم مطلع التواترات.

2. أ) كرر التجربة باستعمال الآلة الحاسبة 60 مرة ثم حوصل النتائج في الجدول التالي :

نسمى عينة مقاسها 7
سلسة إحصائية مشكلة من
النتائج المتحصل عليها
عند تكرار هذه التجربة 7
مرة وفي نفس الظروف

الرقم	عدد المرات	التواءت بالنسبة المئوية
9		
8		
7		
6		
5		
4		
3		
2		
1		
0		

ب) ارسم مطلع التواترات.

3. ماذا تلاحظ كلما كبرت العينة ؟ قارن التواترات بالعدد 0,1

نشاط 3

أ) ارم نردا أوجهه مرقّمة من 1 إلى 6 خمسة و عشرين مرّة و سجّل رقم الوجه العلوي بعد كل رمية ثم حوصل النتائج في الجدول التالي :

النتائج	التكرار	التواتر بالنسبة المائوية			
6	5	4	3	2	1

ب) ارسم مضلّع التواترات.

ج) جمّع النتائج التي تحصلت عليها مع نتائج ثلاثة من زملائك في جدول مثل الجدول السابق.

د) ارسم مضلّع التواترات.

ه) ماذا تلاحظ كلّما كبرت العيّنة؟ قارن التواترات بالعدد 0,16 .

نشاط 4

شاركت مجموعة من التلاميذ في مسابقة من خلال برنامج تلفزي تتمثل المسابقة في الإجابة عن السؤال الذي يسجّبه المشارك من علبة بطريقة عشوائية.

نعلم أنّ عدد الأسئلة في الثقافة العامة هو 5 وعددتها في التاريخ هو 4 وعددها في الرياضة هو 1.

أ) ما هو السؤال الأكثر احتمالاً للسحب؟ الأقل احتمالاً للسحب؟

ب) ما هو احتمال سحب سؤال التاريخ؟ اعط النتيجة في صيغة نسبة مئوية.

ج) ما هو احتمال سحب سؤال في الثقافة العامة أو الرياضة؟

نشاط 5

نسى أيمن وعزيز وأحمد أقلامهم بالقاعة عند خروجهم من حصّة الرياضيات، احتفظ بها أستاذهم ثم وزعها عليهم بطريقة عشوائية في بداية الحصة المowالية.

يمثل الجدول التالي إمكانيات توزيع الأقلام على التلاميذ. انقله على كراسك ثم أكمله.

إمكانيات التوزيع	يتسلّم أيمن	يتسلّم عزيز	يتسلّم أحمد
إمكانية أولى	قلمه	قلمه	قلمه
إمكانية ثانية	قلم عزيز	قلم أحمد	قلمه
إمكانية ثالثة	قلم أيمن	قلم أحمد	قلم عزيز

تطبيقات

أ) ما هو عدد إمكانيات التوزيع؟

ب) ما هو احتمال أن يتسلّم أيمن قلمه؟

ج) ما هو احتمال أن يتسلّم كلّ تلميذ قلمه؟

1

باستعمال الأرقام التالية 0 ، 2 ، 3 .

أ) بكم من طريقة يمكنك تكوين عدد ذي رقمين مختلفين.

ب) بكم من طريقة يمكنك تكوين عدد ذي رقمين مختلفين أو متساوين؟

2

مأوى سيارات خاصٌ شكله مستطيل به 4 أماكن خالية و متجاورة يتسع كلّ منها لسيارة واحدة.



دخلت سيارتان المأوى.

أ) بكم من طريقة يمكن توجيه السيارتين نحو مكانين خاليين من المأوى؟

ب) ما هو احتمال أن تقف السيارات في مكانين متجاورتين؟

3

لطارق ثلاثة أقلام ملونة : الأزرق والأصفر والبني. يريد تلوين الأشكال الهندسية التالية :



ما هي الاختيارات الممكنة للألوان إذا ما اعتبرنا أنه يستطيع استعمال لون واحد على الأقل؟

ما هي الاختيارات الممكنة للألوان إذا ما اعتبرنا أنه يستعمل ثلاثة ألوان؟

نَهَارِيَه


استجوب أستاذ تربية بدنية تلاميذ ثلاثة فصول من الثامنة أساسى حول النشاط الرياضي الذي يحبذون ممارسته في إطار الجمعية الرياضية المدرسية.
حاول الأستاذ تنظيم هذه المعطيات في الوثائق الثلاث التالية والتي لم يتم إكمالها.

(1) الوثيقة


المجموع	ألعاب القوى	كرة السلة	كرة اليد	كرة القدم	
9		0	2		١٦٨
		3	0	5	٢١٨
	1	2		2	٣١٨
			10		المجموع

ممارسة كرة القدم

(2) الوثيقة



(3) الوثيقة



١. ماذا تمثل كل وثيقة من الوثائق السابقة ؟
٢. ما هو عدد التلاميذ من ٢١٨ الذين يحبّون ممارسة كرة القدم ؟ ما هي الوثيقة التي تدل على ذلك ؟
٣. ما هو عدد التلاميذ الذين يحبّون ممارسة ألعاب القوى ؟ ما هي الوثيقة التي تدل على ذلك ؟
٤. ماذا يمثل العدد ١٠ بالوثيقة (١) في وادي كرة اليد ؟ أكمل المعطى الناقص بهذا الوادي.
٥. ما هو عدد التلاميذ من ١٨ الذين يحبّون ممارسة نشاط رياضي في إطار الجمعية الرياضية ؟
ما هو العدد الجملي للتلاميذ الذين اختاروا ممارسة نشاط رياضي ؟
٦. انقل الجدول بالوثيقة (١) ثم أكمله.
٧. مثل بمخطط القطاع الدائري توزُّع التلاميذ الذين اختاروا ممارسة كرة اليد حسب الفصول.

يتوزُّع تلاميذ مدرسة إعدادية على النحو التالي :

2

السن	١٧ سنة	١٦ سنة	١٥ سنة	١٤ سنة	١٣ سنة	١٢ سنة	العمر المستوى
٧ أساسى	0	0	4	48	76	22	
٨ أساسى	0	40	50	50	10	0	
٩ أساسى	20	36	70	6	0	0	

العمر بالسنة	التكرار	التكرار بالنسبة المئوية
12	22	
13		
14		
15	124	
16		
17	20	
المجموع		

١. ما هي المجموعة الإحصائية المدروسة ؟
٢. ما هي الميزة المدروسة ؟ ما هي طبيعتها ؟
٣. انقل الجدول المقابل ثم أكمله.
٤. ما هو التكرار الجملي ؟
٥. اعط منوال و مدى و معدل العمر بالنسبة إلى هذه السلسلة.
٦. مثل الجدول السابق بمخطط العصيات
٧. ما هو متوسط هذه السلسلة.

3

يمثل الجدول التالي توزع عدد الحرفاء المرتادين لمغارة كبرى طوال أسبوع.

الأحد	السبت	الجمعة	الخميس	الإربعاء	الثلاثاء	الإثنان
3900	2730	2300	1230	590	1230	1920

1. ما هو المعدل اليومي لعدد الحرفاء ؟

2. ما هي النسبة المئوية للحرفاء يوم الأحد ؟

3. مثل هذه السلسلة بمخطط العصيات.

4

أرقام الهاتف القار تبدأ بأحد رموز المناطق: 71 ، 72 ، 73 ، 74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 78

قامت مؤسسة بـ 1200 مكالمة هاتفية كما هو مبين بالجدول التالي :

رمز المنطقة	78	77	76	75	74	73	72	71
عدد المكالمات	100	150	160	30	130	360	120	140

1. ما هو عدد المكالمات الهاتفية التي أجريت نحو الرمز 73 ؟

2. ما هي النسبة المئوية للمكالمات الهاتفية الموجهة نحو الرمز 78 ؟

3. مثل هذه السلسلة بمخطط القطاع الدائري.

5

فيما يلي نتائج التحقيق الذي قام به أستاذ اللغة العربية في فصل يتكون من 10 أولاد و 17 بنتا لجمع معلومات حول عدد الكتب التي طالعواها التلاميذ في ظرف شهر.

بالنسبة إلى البنات (الجدول 1)

الجدول 1	أكثر من 2	2	1	0	عدد كتب المطالعة
	9		2	0	عدد التلاميذ
					التوافر بالنسبة المئوية

بالنسبة إلى الأولاد (الجدول 2)


الجدول 2	أكثر من 2	2	1	0	عدد كتب المطالعة
	4	5	0	1	عدد التلاميذ
					التوافر بالنسبة المئوية

1. انقل الجدولين السابقين ثم أكملهما.
2. جمّع المعطيات السابقة في جدول واحد.
3. أ) احسب النسبة المئوية a للبنات اللاتي طالعن أقل من 3 كتب.
- ب) احسب النسبة المئوية b للذكور الذين طالعوا أقل من 3 كتب.
- ج) احسب النسبة المئوية c للتلاميذ الذين طالعوا أقل من 3 كتب.
- د) هل أن c تمثل المعدل الحسابي لـ a و b ؟ لماذا ؟

قصد القيام بدراسة ، قامت إدارة مدرسة يجمع معلومات حول الزمن الذي يقضيه يوميا كل تلميذ أمام الحاسوب يقدم الجدول التالي النتائج التي أفرزتها هذه الإستماراة :

من 90 إلى أقل من 120	من 60 إلى أقل من 90	من 30 إلى أقل من 60	من 0 إلى أقل من 30	الزمن بالدقيقة
20	50	100	130	عدد التلاميذ
				التواءر بالنسبة المئوية

يمثّل مخطط المستطيلات التالي توزّع عدد المكالمات الهاتفية بموزّع الخطوط الهاتفية.



1. ما هي المدة الزمنية لأكبر عدد من المكالمات الهاتفية ؟
2. انقل الجدول التالي ثم أكمله.

الزَّمْنُ بِالدِّقِيقَةِ	من 0 إلى 2	أقل من 4	من 4 إلى 6	من 6 إلى 8	من 8 إلى 10
عدد المكالمات					
التوارثات					

٣. مثل هذه السلسلة بمخلع التواترات.

٤. ما هو معدل مدد المكالمات الهاتفية..

قامت منظمة الدفاع عن المستهلك بتسجيل سعر البيع لنفس الجهاز الكهرو منزلي في 80 مغازة.

السعر بالدينار	من 300 إلى 310 أقل من	من 310 إلى 320 أقل من	من 320 إلى 330 أقل من	من 330 إلى 340 أقل من	من 340 إلى 350 أقل من
عدد المغازات	10	15	25	20	10


١. مثل هذه المعطيات يمْخُّطُ المستطيلات.

٢. ما هو عدد المغازات التي بها السعر مرتفعاً؟ متذمّراً؟

٣. ما هو معدل الأسعار.

٤. اعط منوال ومدى هذه السلسلة الاحصائية.

يمثل مخطط المستويات التالي توزُّع عمال شركة حسِّن أعمارهم.



1. أكمل الجدول التالي :

العمر بالسنّة	من 20 إلى أقل من 25	من 25 إلى أقل من 30	من 30 إلى أقل من 35	من 35 إلى أقل من 40	من 40 إلى أقل من 45	من 45 إلى أقل من 50	من 50 إلى أقل من 55	من 55 إلى أقل من 60
عدد العمال								

2. ما هو التكرار الجملي لهذه السلسلة؟

3. ما هو معدل الأعمار بالنسبة لعمال الشركة؟

4. انقل المخطط ثم ارسم عليه مطلع التكرارات.

10

قامت اللجنة المنظمة لمسابقة صيد الأسماك بوزن كمية السمك التي اصطادها كل مشارك ثم قدمت النتائج في الجدول التالي :

الوزن بالكيلوغرام	من 0 إلى أقل من 0,5	من 0,5 إلى أقل من 1	من 1 إلى أقل من 1,5	من 1,5 إلى أقل من 2	من 2 إلى أقل من 2,5
عدد الصيادين	20	10	6	1	3

1. ما هو التكرار الجملي لهذه السلسلة؟

2. ما هو معدل وزن السمك الموافق للمشارك الواحد؟

3. ما هو منوال و مدى هذه السلسلة؟

4. مثلها بمخطط المستطيلات.

5. ما هو عدد المشاركين الذين اصطادوا أكثر من 1500 غرام؟

6. ما هو عدد المشاركين الذين اصطادوا أقل من 1000 غرام؟

11

- يراد تكوين لجنة من شخصين ضمن مجموعة مكونة من ثلاثة رجال و امرأتين.
- كم طريقة تمكّن من تشكيل هذه اللجنة ؟
 - ما هو احتمال أن تكون اللجنة مركبة من رجلين ؟
 - ما هو احتمال أن تكون اللجنة مركبة من امرأتين ؟
 - استنتج احتمال أن تكون اللجنة مكونة من رجل و امرأة.

12

تعرض مؤسسة تربوية على تلاميذها اختيار المشاركة في النوادي الثقافية من بين الأربع نوادي التالية

ن 1 : الموسيقى ن 2 : الرقص ن 3 : المسرح ن 4: الشعر

ما هو عدد الاختيارات الممكنة بالنسبة إلى التلميذ الواحد إذا ما سُمح له بالمشاركة في ناديين فقط ؟ في 3 نواد على أقصى تقدير؟

13

يعرض مطعم على حرفائه ثلاثة أصناف من التحلية .

- ما هي الاختيارات الممكنة إذا ما اعتبرنا أنَّ الحريف عليه أن يختار صنفا واحدا فقط ؟
- ما هي الاختيارات الممكنة إذا ما اعتبرنا أنه يمكن أن يختار أكثر من صنف ؟

التناظر المركزي



ابن بطوطة

هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الطنجي المعروف بابن بطوطة. ولد في مدينة طنجة يوم 17 رجب سنة 703 هجرية، ودرس بطنجة . رحل ابن بطوطة ثلاثة رحلات : أولاهن وهي أطولهن بدأها في يوم الخميس 12 رجب سنة 725هـ (1325م) وانتهى منها يوم الجمعة أواخر شعبان عام سنة 750 هـ. ثم عاد، فبدأ رحلته الثانية في مملكة غرناطة بالأندلس. عاد ابن بطوطة ليبدأ رحلته الثالثة إلى بلاد السودان، ثم مالي ثم تمبكتو، ومنها إلى تكرا، ووصل في تنقلاته بين هذه المدن إلى نهر النيجر. توفي ابن بطوطة سنة 777 هـ.

المجلة العربية العلمية للفتىان

لكل داء دواء يستطع له

إلا الحماقة أعيت من يداويها

أحمد شوقي



التناظر المركزي

استحضر

1




أنقل الرسم على كراسك ثم أنجز البناء المطلوب في كل حالة من الحالات التالية :

(أ) ابن النقطة 'A' مناظرة النقطة A بالنسبة إلى المستقيم Δ .



(ب) A و B نقطتان متناظرتان بالنسبة إلى مستقيم Δ . ابن Δ .


(ج) ابن المثلث 'ABC' مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى المستقيم Δ .



(أ) ما هو الشكل الذي له محور تناظر أو أكثر؟

2

(ب) في أي شكل من الأشكال التالية تكون النقطتان U و V متناظرتين بالنسبة إلى المستقيم (d)؟



(ه)


(د)

(ج)

(ب)

(إ)


A و B نقطتان متناظرتان بالنسبة لمستقيم (d).
أنقل الجدول التالي على كراسك ثم أجب بـ "صحيح" أو "خطأ" في الخانة المقابلة.



- | | |
|--|----|
| B هي مناظرة النقطة A بالتناظر المحوري محوره (d). | .1 |
| المستقيم (d) يوازي (AB) | .2 |
| المستقيم (d) عمودي على (AB) | .3 |
| المستقيم (d) يقطع [AB] في منتصفها | .4 |
| و B من نفس الجهة بالنسبة إلى (d) | .5 |

ليكن Δ مستقيماً ونقطة M من المستوى لا تنتمي إلى المستقيم Δ .
تكون النقطة M' مناظرة للنقطة M بالنسبة إلى المستقيم Δ إذا كان المستقيم Δ هو الموسط
العمودي للقطعة $[MM']$
إذا كانت M تنتمي إلى المستقيم Δ فهي مناظرة نفسها.


أ) قارن AB و $AM + MB$ في كل حالة من الحالات التالية :



ب) في أي وضعية من الوضعيات السابقة تتحقق النقطة M المساواة $AM + MB = AB$ ؟

استكشاف وأطّبِق

نشاط 1



(1) أُنْقل الرسَم (F) عَلَى ورَق شَفَاف وَعَلَى كِرَاسِك.

- ضِع الورَق الشَّفَاف عَلَى كِرَاسِك بِحِيثَ يَنْطَبِقُ الرَّسَمَان.

- ثَبِّت شُوكَة البرَّكار عَلَى النَّقْطة O .

- قَم بِتَدْوِيرِ الورَق الشَّفَاف نَصْف دُورَة (لتَحْقِيق سُوف تَلَاحِظُ أَنَّ الخطَّيْن المُتَقْطَعِيْن مُحْمَولَاًن عَلَى نَفْسِ الْمُسْتَقِيمِ).

- قَم بِرَسَمِ الشَّكْل عَلَى كِرَاسِك فِي وَضْعِيْتِهِ الْجَدِيدَة. سُمِّيَّه (F') .

نَقُولُ أَنَّ الشَّكْل (F') مَنَاظِرُ الشَّكْل (F) بِالنَّسْبَةِ إِلَى النَّقْطة O .

أَوْ

أَنَّ الشَّكْل (F') هُو مَنَاظِرُ الشَّكْل (F) بِالْمُنْتَاظِرِ الْمُرْكَزِيِّ الَّذِي مَرْكَزُهُ O .


(2) أ) حَدِّد النَّقَاط A' و B' و C' و D' الْمُوَافِقة عَلَى التَّوَالِي لِلنَّقَاط A و B و C و D .

ب) مَاذَا تمثِّل النَّقْطة O بِالنَّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مِنْ قَطْعَيِ الْمُسْتَقِيمَات $[AA']$ و $[BB']$ و $[CC']$ و $[DD']$ ؟

نَقُولُ أَنَّ النَّقْطة A' مَنَاظِرَةُ النَّقْطة A بِالنَّسْبَةِ لِلنَّقْطة O إِذَا كَانَت O مَنْتَصِفَ قَطْعَةِ الْمُسْتَقِيم $[AA']$.


نشاط 2

أ) أُنْقلِي الأَشْكَال التَّالِيَّة عَلَى كِرَاسِك



ب) أَرْسِم فِي كُلِّ حَالَةٍ مِنَ الْحَالَاتِ التَّالِيَّة مَنَاظِرَ الشَّكْلِ الْمَرْسُومِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى النَّقْطة O

تعرف



لتَكُن O نَقْطة مِنَ الْمُسْتَوِي

• M نَقْطة مُخَالِفةٌ لِلنَّقْطة O .

تَكُونُ النَّقْطة M' مَنَاظِرَةُ النَّقْطة M بِالنَّسْبَةِ لِـ O

إِذَا كَانَت O مَنْتَصِفَ قَطْعَةِ الْمُسْتَقِيم $[MM']$.


• مَنَاظِرَةُ النَّقْطة O بِالنَّسْبَةِ لِلنَّقْطة O هِي نَفْسُهَا.

مصطلحات ونهاية

- التناظر بالنسبة للنقطة O يسمى تناظر مركزى
- نسمى النقطة O مركز التناظر.
- عندما تكون النقطتان M و M' متناظرتين بالنسبة لـ O نقول أن كلاً منهما مناظرة للأخرى بالتناظر المركزى.


تطبيقات

لاحظ الرسم التالى حيث $ABCD$ مستطيلاً وحدّد مناظرات النقاط A و B و C و D بالنسبة إلى O .




- 1) أرسم نقطتين O و A . أرسم الدائرة $\odot O$ التي مرکزها O وشعاعها OA نصف المستقيم $[AO]$ و \odot يتقاطعان في نقطة ثانية A'
ب) بين أن A و A' متناظرتان بالنسبة إلى O .

2) أنقل على كراسك المستقيم المدرج التالي :



- أ) عِين النقاط A و B و C و D و E التي فاصلاتها على التوالي $2, 3, 4, 5$
ب) حدد مناظرة النقطة B بالنسبة إلى O و مناظرة النقطة E بالنسبة إلى B
ج) أنقل ثم أتم بما يناسب : - مناظرة النقطة E بالنسبة إلى I هي ...
- النقاطان O و E متناظرتان بالنسبة إلى ...



3) أنقل الرسم التالي :


- أ) ما هي إحداثيات كل من النقاط A و B و C ؟
ب) عِين النقاط A' و B' و C' مناظرات النقاط A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O .
ج) ما هي إحداثيات النقاط A' و B' و C' ؟

4)

مناظر مستقيم - مناظر نصف مستقيم - المحافظة على الاستقامة :

نشاط 1

- (1) أرسم مستقيما (D) ونقطة O لا تنتمي إليه.
 - عين نقطتين A و B من (D) .
 - أرسم مناظريهما A' و B' على التوالي بالنسبة إلى O والمستقيم $(A'B')$.
 - خذ ورقة شفافة وثبتها بواسطة شوكة البركار في النقطة O ثم أنقل عليها المستقيم (AB) .
 - أدر الورقة الشفافة حتى تنطبق النقطة A على النقطة A' ولاحظ أن (AB) قد انطبق على $(A'B')$ أي أن مناظر المستقيم (AB) بالنسبة إلى O هو المستقيم $(A'B')$.
 - حقق أن المناظرين (AB) و $(A'B')$ متوازيان.
- (2) ما هو مناظر نصف المستقيم $[AB]$ بالنسبة إلى O ؟




لتكن O نقطة من المستوى.
 مناظر مستقيم بالنسبة إلى O هو مستقيم مواز له.

- إذا كانت A و B نقطتين مختلفتين و A' و B' مناظريهما على التوالي بالنسبة إلى O فإن المناظر $(A'B')$ مناظر المستقيم (AB) بالنسبة إلى O ولدينا $(A'B') \parallel (AB)$.
- نصف المستقيم $(A'B')$ مناظر نصف المستقيم $[AB]$ بالنسبة إلى O .

تطبيقات


- (أ) أرسم مستقيما Δ و نقطتين مختلفتين A و B لا تنتميان إلى Δ
- (ب) ابن المستقيم A' مناظر Δ بالنسبة إلى A و A'' مناظر بالنسبة إلى B
- (ج) أثبت أن Δ' و Δ'' متوازيان.



أنقل الرسم المقابل على كرا سك
 ابن مناظر المستقيم Δ بالنسبة إلى I

3


ابن متوازي الأضلاع EFGH ولتكن النقطة O مركزه.
أنقل وأتمم على كراسك بما يناسب:
مناظر المستقيم (EH) بالنسبة إلى O هو المستقيم
مناظر المستقيم بالنسبة إلى O هو المستقيم (EH)



لاحظ الشكل التالي حيث (xx') و (yy') مستقيمان متوازيان ما هو مناظر كل من $[EF]$ و $[Ex']$ و $[Fy']$ بالنسبة إلى النقطة O

4

- أ) أرسم ثلات نقاط A و B و C على استقامة واحدة ونقطة O.
ب) ابن النقاط A' و B' و C' مناظرات A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O.
ج) أثبت أن A' و B' و C' على استقامة واحدة.



مناظرات ثلات نقاط على استقامة واحدة بتناظر مركزي هي ثلات نقاط على استقامة واحدة أيضا. نقول أن التناظر المركزي يحافظ على الاستقامة.

تطبيقات

1

- أرسم ثلات نقاط A و B و C على استقامة واحدة وعين النقطة O منتصف [AB].
نعتبر النقطة D مناظرة النقطة C بالنسبة للنقطة O.
بين أن النقطة D تنتمي إلى المستقيم (AB).

2

- أرسم مثلثا ABC وعين النقطة O منتصف [BC]
ابن النقطة D مناظرة النقطة A بالنسبة إلى النقطة O
عين M نقطة من [AB]. المستقيم (OM) يقطع (CD) في النقطة N
بين أن النقطة N هي مناظرة النقطة M بالنسبة إلى النقطة O.

المحافظة على البعد - مناظرة قطعة مستقيم - المحافظة على المنتصف.

نّشاط 1

لتكن O نقطة من المستوى

1) عِين نقطتين A و B حيث O و A و B ليس على استقامة واحدة

(أ) ابن النقطتين A' و B' مناظري A و B على التوالي بالنسبة إلى O

(ب) ما هو مناظر كل من (AB) و $(A'B')$ بالنسبة إلى O ؟

(ج) أثبت أن الرباعي $ABA'B'$ متوازي الأضلاع.

(د) استنتج أن $A'B' = AB$

2) عِين نقطة C من المستقيم (OA) مخالفة لـ O و ابن مناظرها C' بالنسبة لـ O .

قارن AC و $A'C'$

لتكن O نقطة من المستوى و A و B نقطتان

إذا كانت النقطتان A' و B' مناظري النقطتين A و B على التوالي بالنسبة إلى O

فإن $A'B' = AB$. نقول أنَّ التناظر المركزي يحافظ على البعد.

نّشاط 2

أ) أرسم قطعة مستقيم $[AB]$ ونقطة O .

ب) ابن النقطتين A' و B' مناظري A و B على التوالي بالنسبة إلى النقطة O .


ج) أرسم القطعة $[A'B']$.

د) لتكن M نقطة من $[AB]$ و M' مناظرها بالنسبة إلى O . قارن $MB + AM$ و AB ثم قارن

$A'M' + M'B'$ و $A'B'$. أستنتج أن M' تنتمي إلى $[A'B']$.

ه) لتكن N نقطة من $[A'B']$ و N' مناظرها بالنسبة إلى O . بين أن N تنتمي إلى $[AB]$.


و) استنتاج مناظر قطعة المستقيم $[AB]$ بالنسبة إلى O .



لتكن O نقطة من المستوى.

مناظر قطعة مستقيم بالنسبة إلى O هي قطعة مستقيم مقايسة لها
إذا كانت نقطتان A' و B' مناظري نقطتين A و B على التوالي
بالنسبة إلى O فإنَّ قطعة المستقيم $[A'B']$ هي مناظرة القطعة
 $[AB]$ بالنسبة إلى O .

تطبيقات



ما هو مناظر كل من $[CD]$ و $[HC]$ و $[GH]$ و $[CG]$ بالنسبة إلى E ؟

1

أرسم قطعة مستقيم $[FG]$

(أ) ابن النقطة F مناظرة إلى G و النقطة G مناظرة G بالنسبة إلى F

(ب) بين أن $FG' = GF'$

2


ليكن ABC مثلثاً و A' و B' و C' منتصفات القطع $[BC]$ و $[AC]$ و $[AB]$ على التوالي

(أ) ابن النقطتين A' و C' بحيث A' مناظرة إلى A و C' مناظرة إلى B بالنسبة إلى C'

(ب) ما هي طبيعة الرباعي $AB'B'C'$ ؟

(ج) أثبت أن النقطة B منتصف قطعة المستقيم $[A''C'']$

3




(أ) أنقل الرسم المقابل على كراسك حيث $ABCD$ مستطيل

بعده $AD = 3 \text{ cm}$ و $AB = 5 \text{ cm}$ و نقطة I من المستوى

(ب) ابن الرباعي $EFGH$ مناظر المستطيل $ABCD$ بالنسبة إلى I . ما هي طبيعته؟ حدد محيطه ومساحته.

4



(أ) انقل الرسم المقابل على كراسك حيث I منتصف القطعة $[MN]$ و O نقطة من المستوى.


(ب) ابن النقط M' و N' و I' مناظرات M و N و I على التوالي بالنسبة إلى O .

(ج) بين أن I' منتصف القطعة $[M'N']$

نشاط

التناظر المركزي يحافظ على المنتصف

تطبيقات



1 - رسمنا قطعة المستقيم $[AB]$ وجزءاً من مناظرتها $[A'B']$

بالنسبة إلى النقطة I كما هو مبين بالشكل المقابل.

أنقل الشكل وابن بالمسطرة والبركار منتصف القطعة $[A'B']$

1

1. أ) أرسم متوازي الأضلاع $ABCD$ و عين مركزه O .

ب) ابن النقطة B' مناظرة B بالنسبة إلى C .

2. المستقيم (OB) يقطع (AD) في النقطة D'

أ) بين أن B' و D' متناظرتان بالنسبة إلى O

ب) استنتج أن النقطة A منتصف القطعة $[DD']$

مناظرة زاوية

نشاط

أ) أرسم زاوية \widehat{BAC} ونقطة O

ب) ابن النقاط A' و B' و C' مناظرات النقاط A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O

ج) أرسم نصفي المستقيم $(A'C')$ و $(A'B')$

د) تحقق بواسطة الورقة الشفافة من أن مناظرة الزاوية \widehat{BAC} بالنسبة إلى O هي الزاوية $\widehat{B'A'C'}$

تحقق أن $\widehat{B'A'C'} = \widehat{BAC}$

- مناظرة زاوية بالنسبة إلى نقطة من المستوى هي زاوية مقايسة لها. نقول أن التناظر المركزي يحافظ على أقيسة الزوايا.
- لتكن O نقطة من المستوى إذا كانت A و B و C ثلاث نقاط مختلفة من المستوى O و A' و B' و C' مناظراتها على التوالي بالنسبة إلى O فإن مناظرة الزاوية \widehat{BAC} هو الزاوية $\widehat{B'A'C'}$ و $\widehat{B'A'C'} = \widehat{BAC}$

تطبيقات

أ) ابن المثلث ABC حيث $\widehat{ABC} = 60^\circ$ و $\widehat{ACB} = 40^\circ$ و $BC = 4\text{ cm}$

ب) لتكن النقطة I منتصف $[AC]$ ابن النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى I .
أحسب \widehat{BAC} .

ج) ما هي مناظرة كل من الزوايا التالية : \widehat{BAC} و \widehat{ABC} و \widehat{BAD} بالنسبة إلى

د) عين نقطة M تنتمي إلى (BC) ولا تنتمي إلى (AC) ثم أحسب \widehat{DCM}


نعتبر الزاويتين المتقابلتين بالرأس $\widehat{X'OY}$ و $\widehat{X'YO}$

أ- ما هو مناظر كل من (OX) و (OY) بالنسبة إلى O ؟

ب- ما هو مناظر الزاوية \widehat{XOY} بالنسبة إلى O

ماذا تستنتج ؟

ج- إذا كان $90^\circ = \widehat{XOY} + \widehat{X'YO}$ أحسب $\widehat{X'YO}$




3

انقل الشكل المقابل على كراسك.

ابن النقاط P و Q و R و S مناظرات

النقاط A و C و D و E بالنسبة إلى النقطة B .

أحسب قيمي الزوايتين \widehat{RSA} و \widehat{QPB} .



مناظرة دائرة

نشاط

في الشكل المقابل \mathcal{C} و \mathcal{M} دائرتان لهما نفس الشعاع والنقطة O منتصف $[II]$.

1. انقل الشكل على كراسك

2. لتكن M نقطة من \mathcal{C}

أ) ابن النقطة M مناظرة M بالنسبة إلى O .


ب) أثبت أن M' تنتمي إلى \mathcal{M}

لتكن N' نقطة من \mathcal{M}

أ) ابن النقطة N بحيث تكون النقطة N'

مناظرة N بالنسبة إلى O

ب) أثبت أن N' تنتمي إلى \mathcal{C}



• نقول أن الدائريتين \mathcal{C} و \mathcal{M} متناظرتان بالنسبة إلى O

• مناظرة دائرة بالنسبة إلى نقطة من المستوى هي دائرة مقايسة لها.

مناظرة دائرة \mathcal{C} مركزها I بالنسبة إلى نقطة O هي دائرة \mathcal{M} لها نفس الشعاع ومركزها I' حيث I' مناظرة النقطة I .

تطبيقات


1

أرسم دائرة \mathcal{C} مركزها I

أرسم الدائرة \mathcal{M} مناظرة \mathcal{C} بالنسبة إلى نقطة O في كل حالة.


الحالة الثالثة

$$O \in (\mathcal{C})$$




الحالة الثانية

$$I = O$$




الحالة الأولى


$$O \notin (\mathcal{C}), I \neq O$$



2



- أ) أرسم ثلاثة دوائر لها نفس المركز O
ب) ارسم مثلثاً MNP بحيث يكون كلّ رأس على دائرة
ج) ابن وياستعمال المسطرة فقط المثلث M'N'P' المناظر
للمثلث MNP بالنسبة للنقطة O.



لاحظ الرسم المقابل حيث الدائريتين (C) و (C')

متقاييسان ومتماستان في النقطة O

أنقل ما يلي و عوّض النقاط بما يناسب :

مناظرة النقطة I إلى O هي


مناظرة الدائرة (C) إلى D هي

مناظرة الدائرة (C') إلى D' هي

مناظرة الدائرة (C') إلى O هي

المحافظة على المساحات

نشاط



انقل الرسم المقابل على كراسك ثم ابن (C) و (C')

مناظري (C) و (C') على التوالي بالنسبة إلى O

قارن بين مساحتى (C) و (C')

ثم قارن مساحتى C و C' .

شكلان هندسيان (C) و (C') متناظران بالنسبة إلى نقطة O هما متطابقان إذن لهما نفس المساحة.
التناظر المركزي يحافظ على المساحات.

تطبيقات


1

- أرسم مثلثاً ABC قائماً الزاوية في A حيث $AC = 5 \text{ cm}$ و $AB = 3 \text{ cm}$.
ابن النقطتين D و E مناظري النقطتين B و C على التوالي بالنسبة إلى A .
قارن أضلاع المثلثات ABE و ADE و ADC و ABC .
ما هي مساحة المثلث ABC ؟
استنتج مساحة الرباعي BCDE .

2


أ) أنقل الرسم التالي على كراسك و أتممه بحيث يكون الشكلان (F) و (F') متناظرين بالنسبة إلى النقطة I.

ب) أحسب مساحة كل من الشكلين (F) و (F').



مركز تناظر أشكال هندسية

نشاط



تمثل نقطة O مركز تناظر شكل هندسي
إذا انطبق هذا الشكل مع مناظره بالنسبة إلى النقطة O

أ) أنقل الشكل F على كراسك.

لاحظ أن مناظرة النقطة B بالنسبة إلى O هي النقطة

التي تنتمي إلى

ب) هل أن نفس الملاحظة تنطبق على النقاط الأخرى
ومناظراتها بالنسبة إلى O؟

ج) عين نقاط أخرى على F وابن مناظراتها بالنسبة إلى O


د) ماذا تستنتج؟

تطبيق


من بين الأشكال التالية : ما هي التي لها مركز تناظر؟ حده.



(4)




(3)



(2)



(1)



(8)



(7)




6



(5)

تمرين هرقل بحل عدد 1



لاحظ الشكل المقابل حيث M' و N' مناظرتين

النقطتين M و N بالنسبة إلى D

و P و P' مناظرتين M و M' بالنسبة إلى O

1. ما هو مناظر المستقيم (MM') بالنسبة إلى O ؟

2. بين أن (MM') موازي لـ (NN') .

3. استنتج أن النقاط N و N' و P على استقامة واحدة.

الحل

1. بما أن N و P مناظرتا M و M' بالنسبة إلى O فإن مناظر المستقيم (MM') هو المستقيم (NP) .

2. لدينا M' مناظرة النقطة M بالنسبة إلى D إذن (MM') عمودي على D و N' مناظرة النقطة N بالنسبة إلى D إذن (NN') عمودي على D وبالتالي (MM') موازي لـ (NN') .

3. لدينا مناظر المستقيم (MM') بالنسبة إلى O هو المستقيم (NP) إذن (MM') موازي لـ (NP) وبالتالي (MM') يوازي كل من المستقيمين (NN') و (NP) موازي لـ (NP) وبالتالي النقاط N و N' و P على استقامة واحدة.

تمرين هرقل بحل عدد 2

نعتبر مثلثا AOB قائم الزاوية في A والدائرة \odot التي مركزها O والمارة من A

1. بين أن المستقيم (AB) مماس للدائرة \odot في A

2. ابن النقطة A' مناظرة B بالنسبة إلى A والنقاط A' و B' و D مناظرات A و B و D على التوالي بالنسبة إلى O .


3. بين أن A' منتصف $[B'D']$.

4. ماهي الوضعية النسبية للمستقيمين $(A'B')$ والدائرة؟ علل جوابك.

الحل

1. لدينا المثلث OAB قائم الزاوية في A إذن (AB) عمودي على (OA) وبالتالي بعد النقطة O عن المستقيم (AB) هو OA أي شعاع الدائرة \odot والنقطة A تنتهي إلى A إذن (AB) هو المماس للدائرة \odot في النقطة A

2. بناء النقاط D و A' و B' و D' (انظر إلى الرسم)




3. لدينا النقطة D مناظرة ب بالنسبة إلى A يعني A منتصف القطعة [BD] .
بما أنّ A' مناظرة لـ A بالنسبة إلى O و نعلم أنّ التناظر المركزي يحافظ على المنتصف فإنّ A' منتصف [B'D'] .

4. نلاحظ أنّ المستقيم (A'B') مماس للدائرة C في النقطة A'. لنعمل ذلك .
لدينا $\widehat{BAO} = 90^\circ$ و مناظرها بالنسبة إلى O هو $\widehat{B'A'O} = 90^\circ$ إذن أي أن (A'B') عمودي على (OA') .
ال نقطتان A و A' مناظرتان بالنسبة إلى O إذن OA = OA' (شعاع الدائرة) وبالتالي فإنّ A' تنتهي إلى الدائرة C
إذن المستقيم (A'B') مماس للدائرة C في النقطة A' .

التناول والتَّعْيِين

نشاط

لاحظ الرسم التالي حيث (O,I,J) معين في المستوى و لتكن النقاط A و B و C كما يوضح الشكل المصاحب



1. حدد إحداثيات كل من النقاط الموجودة في الرسم وفق المعين (O,I,J)
2. أ) ابن مناظرات النقاط A و B و C بالنسبة إلى (OI) وحدد إحداثياتها
ب) ماذا تلاحظ بالنسبة إلى فاصلة كل نقطة من النقاط A و B و C وفاصلة مناظرتها بالنسبة إلى (OI) وكذلك ترتيبية كل نقطة من النقاط المذكورة سابقا وترتيبية مناظرتها بالنسبة إلى (OI)
ج) عين النقاطين $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ و $S(3, -\frac{1}{2})$ ماذا تلاحظ بالنسبة إلى إحداثياتهما ؟ تحقق أنّهما مناظرتان بالنسبة إلى (OI) .
3. أ) حدد مناظرات النقاط I و A و B بالنسبة إلى (OJ).
ب) ماذا تلاحظ بالنسبة إلى فاصلة كل نقطة من النقاط J و A و B وفاصلة مناظرتها بالنسبة إلى (OJ) وكذلك ترتيبية كل نقطة من النقاط المذكورة سابقا وترتيبية مناظرتها بالنسبة إلى (OJ) .

عين النقاطين $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$ و $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$. مازا تلاحظ بالنسبة إلى إحداثياتهما؟ تحقق أنّهما متوازرتان بالنسبة إلى (OJ)

(4) أ) حدد مناظرات النقاط B و A و C بالنسبة إلى O

- ب) مازا تلاحظ بالنسبة إلى فاصلة كل نقطة من النقاط B و A و C و فاصلة مناظرتها بالنسبة إلى O و كذلك ترتيبية كل نقطة من النقاط المذكورة سابقا و ترتيبية مناظرتها بالنسبة إلى O
- ج) عين النقاطين $(\frac{5}{2}, -2)$ و $(2, -\frac{5}{2})$. مازا تلاحظ بالنسبة إلى إحداثياتهما؟ تتحقق أنّهما متوازرتان بالنسبة إلى O.

	<p>إذا كان (O, I, J) معيناً في المستوى .</p> <p>وإذا كان الزوج الكسري (x,y) يمثل إحداثيات النقطة M فإن :</p> <ul style="list-style-type: none"> - مناظرتها بالنسبة إلى (OI) هي النقطة 'M ، إحداثياتها $(x,-y)$ - مناظرتها بالنسبة إلى (OJ) هي النقطة "M ، إحداثياتها $(-x,y)$ - مناظرتها بالنسبة إلى النقطة O هي النقطة'''M ، إحداثياتها $(-x,-y)$

تطبيقات

1

ليكن (O, I, J) معيناً في المستوى حيث $OI=OJ$ حيث

$A(1,3)$ و $B(-3,2)$ و $C(2,4)$

أ) ابحث عن إحداثيات كل من النقاط 'A و 'B و 'C مناظرات النقاط A و B و C بالنسبة للمحور (OI)

ب) ابحث عن إحداثيات كل من النقاط "A و "B و "C مناظرات النقاط 'A و 'B و 'C بالنسبة للمحور (OJ)

ج) ابحث عن إحداثيات مناظرات النقاط A و B و C بالنسبة إلى O.

د) مازا تستنتج ؟

ليكن (J, I, O) معيناً في المستوى حيث $OI = OJ$ والنقطة $A(\frac{7}{3}, -2)$. ماذا تستنتج بالنسبة إلى النقطتين A و B في كل حالة من الحالات التالية:

- أ) $B(-2, \frac{7}{3})$, $B(\frac{7}{3}, 2)$, $B(-\frac{7}{3}, -2)$, $B(\frac{7}{3}, -2)$

تمرين مدقق بحل عدد 3

ليكن (O, I, J) معيناً في المستوى.

- أ) عين النقطتين $A(2, 3)$ و $B(-3, -2)$. بين أن المثلث AOB متقارن الأضلاع.
- ب) نعتبر النقطة C مناظرة النقطة A بالنسبة للنقطة O . حدد إحداثياتها.
- ج) بين أن المثلث ABC قائم.
- د) حدد إحداثيات النقطة D بحيث الرباعي $ABCD$ يكون مستطيلا.

الحل


أ) النقطتان A و B لهما نفس الفاصلة وترتيبيهما متقابلتان إذن هما مناظرتان بالنسبة إلى محور الفاصلات (OI) أي أن (OI) هو الموسط العمودي للقطعة $[AB]$ وبالتالي $OA = OB$ يعني أن المثلث AOB متقارن الأضلاع.

ب) النقطة $C(-3, -2)$.

نلاحظ أن $B(2, -3)$ و $C(-2, -3)$ إذن هما مناظرتان بالنسبة إلى محور الترتيبات وبالتالي (OJ) عمودي على (BC) .

لدينا (OJ) موازي لـ (AB) و (OJ) عمودي على (BC) وبالتالي المثلث ABC قائم في A و بما أن:

$\left. \begin{array}{l} (OJ) \text{ عمودي على } (AB) \\ (OJ) \text{ عمودي على } (BC) \end{array} \right\}$



ج) لتكن النقطة D مناظرة النقطة B بالنسبة إلى O إذن $D(-2, 3)$.

لدينا (DC) مناظر (BA) بالنسبة إلى O و (DA) مناظر (BC) بالنسبة إلى O إذن $\widehat{ABC} = \widehat{CDA} = 90^\circ$.

وبنفس الطريقة نبين أن $\widehat{DAB} = \widehat{BCA} = 90^\circ$ وبالتالي الرباعي $ABCD$ مستطيل.


أحوصل



لتكن O نقطة من المستوى.

- نقطة مختلفة عن O تكون نقطة M' مناظرة للنقطة M بالنسبة إلى O إذا كانت O منتصف $[MM']$.

- مناظرة النقطة O بالنسبة إلى O هي النقطة O نفسها.



مناظر مستقيم بمناظر مركزي هو مستقيم موازي له.
إذا كان (AB) مستقيم و O نقطة من المستوى فإن مناظر (AB) بالنسبة إلى O هو المستقيم $(A'B')$ حيث A' و B' مناظري A و B على التوالي بالنسبة إلى O .




مناظر نصف مستقيم بمناظر مركزي هو نصف مستقيم
إذا كان $[AB]$ نصف مستقيم و O نقطة من المستوى
المركزي حيث A' و B' مناظري A و B
على التوالي بالنسبة إلى O فإن مناظر $[AB]$ بالنسبة إلى O هو نصف المستقيم $[A'B']$.

مناظر قطعة مستقيم بمناظر مركزي هي قطعة مستقيم مقابضة لها


نقطة من المستوى و A و B نقطتان مختلفتان و A' و B' مناظرتا A و B على التوالي بالنسبة إلى النقطة O فإذا فإن مناظرة $[AB]$ بالنسبة إلى O هي القطعة $[A'B']$ ولدينا $.A'B' = AB$

المناظر المركزي يحافظ على البعد
إذا كانت نقطتان A' و B' مناظرتين على التوالي
لل نقطتين A و B بالنسبة إلى نقطة O من المستوى
فإن $.A'B' = AB$

المناظر المركزي يحافظ على الاستقامة
مناظرات ثلاثة نقاط على استقامة واحدة
بالتسبة إلى النقطة O هي ثلاثة نقاط على
استقامة واحدة.



أحومد



الناظر المركزي يحافظ على المنتصف

مناظر منتصف قطعة مستقيم بالنسبة

إلى نقطة O هو منتصف مناظر تلك القطعة

مناظرة زاوية بالنسبة إلى نقطة من المستوى هي زاوية مقايسة لها

الناظر المركزي يحافظ على الزوايا

لتكن O نقطة من المستوى.

C و B' و A' ثلث نقاط مختلفة و A و B و C مناظراتها على التوالي بالنسبة إلى نقطة O.

فإن مناظرة الزاوية $\widehat{B'AC}$ هي الزاوية \widehat{BAC}

$$\widehat{BAC} = \widehat{B'AC'}$$

مناظرة دائرة بالنسبة إلى نقطة من المستوى هي دائرة مقايسة لها.

مناظرة دائرة M مرکزها I بالنسبة إلى نقطة O

هي دائرة M' مرکزها I' مناظرة النقطة I.

ولها نفس شعاع الدائرة M .

الناظر المركزي يحافظ على المساحات




شكلاً هندسيان (M) و (M') مناظران بالنسبة إلى نقطة O هما متطابقان ولهم نفس المساحة.

الناظر المركزي يحافظ على المساحات.

نقطة O هي مركز تناظر شكل M من المستوى

يعني أن مناظر M هو الشكل M نفسه بالنسبة

إلى O



إذا كان (J, I, O) معيناً في المستوى حيث (OI) و (OJ) متعددان

وإذا كان الزوج الكسري (x, y) إحداثيات النقطة M فإن:

- مناظرتها بالنسبة إلى (OI) هي النقطة M'


إحداثياتها (y, -x)

- مناظرتها بالنسبة إلى (OJ) هي النقطة M''

إحداثياتها (-x, y)


- مناظرتها بالنسبة إلى النقطة O هي النقطة M'''

إحداثياتها (-x, -y)



نَمَارِيَه

2. ما هو قيس كل من الزوايا $\widehat{B'C'A'}$ و $\widehat{B'A'C'}$ و $\widehat{A'B'C}$ علّ جوابك.
 3. ما هو البعد $B'C'$? علّ جوابك.



5. ارسم مثلثا ABC حيث $BC = 6\text{cm}$ و $AB = 3\text{cm}$ و $\widehat{CBA} = 80^\circ$ ثم عين النقطة عين $[AC]$ منتصف.

6. ا) ارسم مربعا $EFGH$ حيث $EF = 3\text{cm}$
 ب) عين النقطة O من نصف المستقيم $[EF]$
 ج) اكمل بناء مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى O .
 د) احسب قيس الزاوية $\widehat{CB'A}$ ومحيط الرباعي $BAB'C$



7. ا) ارسم مربعا $EFGH$ حيث $EF = 3\text{cm}$
 ب) عين النقطة O من نصف المستقيم $[EF]$
 ج) اكمل بناء مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى O
 د) بين أن الرباعي $EFG'H'$ مربع. ما هو محطيه؟

8. ا) ارسم قطعة المستقيم $[AB]$ وابن المستقيم Δ الموسّط العمودي L لـ $[AB]$
 ب) عين نقطة K من Δ لا تنتهي L لـ $[AB]$
 ج) اiben النقطتين K' و B' مناظرتى K و B على التوالي بالنسبة إلى A
 د) استنتج أن المثلث $AK'B'$ متقايس الضلعين.

9. ا) ارسم مثلثا ABC ثم اiben النقطتين C' و B' مناظرتى C و B بالنسبة إلى A
 ب) اiben النقطة C'' مناظرة النقطة C بالنسبة إلى (AB)
 ج) بين أن $B'C'' = BC$

1. أرسم قطعة مستقيم $[AB]$ حيث $AB = 8\text{cm}$
 ب) ابن النقاط I و K و J منصفات قطع المستقيمات $[AB]$ و $[AI]$ و $[IB]$ على التوالي
 ج) انقل الجمل التالية على كراسك ثم أتم الفراغات بما يناسب.
 النقطةمناظرة النقطةبالنسبة إلى I
 النقطتان J و K متناظرتان بالنسبة إلى
 النقطة B مناظرة النقطة I بالنسبة إلى
 النقطتان و متناظرتان بالنسبة إلى J

2. أ) انقل الشكل التالي على كراسك حيث ABC مثلث $[AC]$ منتصف
 ب) اiben النقطة B' مناظرة النقطة B بالنسبة إلى A و A'
 ج) أكمل بناء مناظر المثلث ABC بالنسبة إلى O .
 د) ارسم مناظره بالنسبة إلى النقطة I ثم بالنسبة إلى $EO = 5\text{cm}$ حيث EO هي نصف المستقيم $[EF]$
 ه) انقل كل من الشكلين التاليين على كراسك ثم ارسم مناظره بالنسبة إلى النقطة I ثم ارسم مناظره بالنسبة إلى النقطة O ثم ارسن مناظره بالنسبة إلى E و F و G و H مناظرات E و F و G و H على التوالي بالنسبة إلى O
 د) بين أن الرباعي $EFG'H'$ مربع. ما هو محطيه؟



4. يمثل الشكل التالي مثلثا ABC قائم الزاوية في A حيث $BC = 4\text{cm}$ و $\widehat{BCA} = 60^\circ$ و O نقطة من المستوى.
 1. أرسم الشكل على كراسك ثم اiben النقاط A' و B' و C' مناظرات A و B و C على التوالي بالنسبة إلى O .

(أ) ابن مثلاً ABC حيث $AB = 4,5 \text{ cm}$ و

$BC = 7 \text{ cm}$ و $AC = 8 \text{ cm}$


ب) ابن النقطة O حيث تكون B مناظرة لـ C بالنسبة إلى O.

ج) ابن النقطة M مناظرة A بالنسبة إلى O

د) ابن المثلث RBC مناظر المثلث ABC

بالنسبة إلى المستقيم (BC). ما هو محيطه؟

هـ) بين دون حساب أن المثلثين MBC و RBC لهما نفس المحيط ونفس المساحة.




13

- (أ) أرسم دائرة مرکزها I و M نقطة منها.
 ب) ابن الدائرة مناظرة بالنسبة إلى النقطة M ليكن I' مركزها.
 ج) أرسم الدائرة Γ التي قطرها [I'I]. هل أنّ الشكل المتحصل عليه له مركز تناظر؟ هل له محور تناظر؟


هل للشكل التالي مركز تناظر؟

14



15

- (أ) أنقل الشكل أسفله على كراسك ثم ارسم مناظره بالنسبة إلى I
 ب) أحسب المساحة الجملية للشكل النهائي (بقيمة تقريبية لجزء من المائة).



10

(أ) أرسم معيناً متعدماً (O, I, J)

ب) لتكن النقط (3, -2) A و (0, -4) B و (-3, -2) G و (5, 0) F و (0, 4) D و (3, 2) E

اذكر من بين هذه النقاط

- النقطتين المتناظرتين بالنسبة إلى (OI)

- النقطتين المتناظرتين بالنسبة إلى (OJ)

- النقطتين المتناظرتين بالنسبة إلى O


11

(أ) أنقل على ورقة مليمترية المعين (O, I, J)

C و النقاطين A و

ب) حدد إحداثيات كل من C و A

ج) أرسم المربع ABCD مركزه O وحدد إحداثيات نقطتين B و D.



12

(أ) تأمل الرسم التالي حيث (O, I, J) معيناً


ب) ما هي إحداثيات النقاط E و F و G و

ج) حدد إحداثيات مناظرات النقاط E و F و G بالنسبة إلى (OI) ثم بالنسبة إلى (OJ) ثم بالنسبة إلى O.

د) أنقل الرسم على كراسك وقم بتعيين تلك النقاط.

15

- هل يوجد تناظر محوري أو مركزي يسمح بتحويل:
 الشكل F_1 إلى الشكل F_2 ؟ الشكل F_1 إلى F_3 ؟
 الشكل F_2 إلى F_1 ؟ الشكل F_4 إلى F_1 ؟




16

1. ارسم مستقيمين متوازيين Δ و δ .
 2. أ) عين نقطة A من Δ و نقطة B من δ ثم ابن النقطة I منتصف القطعة [AB].
 ب) بين أن Δ مناظر δ بالنسبة إلى I.
 3. أ) عين نقطة C من Δ مخالفة لـ A و نقطة D من δ مخالفة لـ B و J منتصف القطعة [CD].
 ب) بين أن Δ مناظر δ بالنسبة إلى J.
 4. كم من تناظر مركزي يمكن من تحويل المستقيم Δ إلى δ ؟

17

- تأمل الشكل التالي حيث المستقيمين Δ و δ متوازيان ثم حدد مركز تناظره معللاً جوابك.




18

- أ) ارسم دائرة \odot مركزها O وشعاعها 3cm و [AB] قطر لها ثم عين نقطة I منها.
 ب) ابن النقطتين A' و B' مناظري النقطتان A و B على التوالي بالنسبة إلى I
 ج) ابن الدائرة \odot' المحيطة بالمثلث A'B'I ليكن O' مركزها.
 د) ما هي النقطة المناظرة لـ O بالنسبة إلى I ؟
 علل جوابك
 هـ) ما هو شعاع الدائرة \odot' ؟ علل جوابك.


- 19 أ) ارسم متوازي الأضلاع ABCD مركزه O و مستقيما Δ يمر من O . Δ يقطع المستقيمات (BC) و (CD) و (DA) و (AB) في النقاط M و N و P و Q على التوالي.

- ب) ما هما منتصف القطعتين [MP] و [NQ] ؟ علل جوابك.

- 20 يمثل الشكل التالي طاولة بيار و الخط الأحمر مسار الكرة والنقط A و B و C هي مواقع ارتدادها أحد أحدياتياتها.
 ب) أنقل المعين (O,I,J) والنقاط A و B و C على كراسك.
 ج) لنفترض أن الكرة لا تتوقف عن الارتداد. ما هي إحداثيات النقاط التالية :
 - D موقع الارتداد السابع
 - E موقع الارتداد عدد 15
 - Fموقع الارتداد عدد 38
 - Gموقع الارتداد عدد 158




- ابحث عن الأخطاء الأربع في الشكل التالي علماً وأنّ النقطة A تنازليه.



148

أوْلَى تَقْنِيَاتِ الْمُعْلَومَاتِ وَالاتِّصالِ :

أَنْشَطَةٌ حَولَ التَّنَاظِرِ الْمُرْكَبِيِّ بِوَاسْطَةِ البرْمَجِيَّةِ geoGebra الَّتِي يُمْكِنُ تَحْمِيلُهَا مِنَ الْمَوْعِدِ <http://www.geogebra.at>.



1. ارِسِّ الربَاعِي $A'B'C'D'$

2. عِينَ نَقْطَةً مِنَ الْمَسْتَوِيِّ وَسَمِّيَّهَا O

3. أَنْشَأَ مَنَاظِرَ النَّقَاطِ A وَ B وَ C وَ D بِالنَّسْبَةِ إِلَى O وَسَمِّيَّهُمْ عَلَى التَّوَالِيِّ A' وَ B' وَ C' وَ D'

4. أَنْشَأَ الربَاعِي $A'B'C'D'$

قَمْ بِتَحْرِيكِ النَّقْطَةِ A بِوَاسْطَةِ الْفَأْرَةِ. مَاذَا تَلَاحَظَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى النَّقْطَةِ O ؟

أَظَهَرْ طَوْلَ الْقَطْعَةِ $[AA']$ عَلَى الشَّاشَةِ وَقَمْ بِتَحْرِيكِ النَّقْطَةِ A . مَاذَا تَلَاحَظَ؟

مَاذَا تَمَثِّلُ النَّقْطَةُ O بِالنَّسْبَةِ إِلَى $[AA']$ ؟

أَكْمَلْ : إِذَا كَانَتِ النَّقْطَةُ A' مَنَاظِرَ النَّقْطَةِ A بِالنَّسْبَةِ إِلَى O يَعْنِي

أَظَهَرْ طَوْلَ الْقَطْعَةِ $[AB]$ عَلَى الشَّاشَةِ وَقَمْ بِتَحْرِيكِ النَّقْطَتَيِنِ A وَ B مَاذَا تَلَاحَظَ بِالنَّسْبَةِ إِلَى $[A'B']$ ؟

أَظَهَرْ عَلَى الشَّاشَةِ قِيسَ الزَّاوِيَتَيْنِ \widehat{ABC} وَ $\widehat{A'B'C'}$ وَقَمْ بِتَحْرِيكِ النَّقَاطِ A وَ B وَ C مَاذَا تَلَاحَظَ؟

أَكْمَلْ : التَّنَاظِرُ الْمُرْكَبِيُّ يَحْفَظُ عَلَى

أَرِسِّ الْمُسْتَقِيمِ (AB) . أَرِسِّ الْمُسْتَقِيمِ الْمَارِ مِنْ A' وَالْمُوازِيِّ لـ (AB) مَاذَا تَلَاحَظَ؟


أَكْمَلْ : مَنَاظِرُ مُسْتَقِيمٍ بِتَنَاظِرٍ مُرْكَبِيٍّ هُو

5. عِينَ النَّقْطَةِ O خَارِجَ الربَاعِيِّ $ABCD$ هَلْ تَوَجُّدُ نَقَاطٌ مِنَ الْمَسْتَوِيِّ مَنَاظِرَهُ لِنَفْسِهَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى O ؟

6. عِينَ النَّقْطَةِ O دَاخِلِ الربَاعِيِّ $ABCD$. هَلْ تَوَجُّدُ نَقَاطٌ مِنَ الْمَسْتَوِيِّ مَنَاظِرَهُ لِنَفْسِهَا بِالنَّسْبَةِ إِلَى O ؟

الزوايا الحائلة عن تقاطع

مستقيمين متوازيين مع مستقيم



عمر الخيام

هو عمر بن إبراهيم الخيام ولد بنيسابور، كان عالماً بكل ما في كلمة العالم من معنى عصري. فقد سبق في علمه ما وصل إليه العلماء من قبله إلى درجة الارتياز والاكتشاف. فهو أول من حل المعادلة التكعيبية، وهو الذي عهد إليه السلطان ملشاه السلجوقى بإنشاء الرصد لاستطلاع حركات أجرام السماء. تعمق في علوم الدين واللغة من فقه وحديث وكلام ومنطق وقراءات وسير ونحو وصرف ومحفوظ كثير من منظوم ومنتشر، وتضطلع من علوم الطبيعة على اختلاف فروعها المعروفة يومئذ. وكان طبيباً نطاسياً، كان عالماً في الفلسفة عارفاً بقديمها وحديثها، إسلاميها وغير إسلاميها، وعالماً في كل فن كان معروفاً في زمانه. من تصانيفه بالعربية: شرح ما يشكل من مصادرات إقلidis في الجبر والمقابلات، ميزان الحكم، رباعية، رسالة في الموسيقى، ومسائل نجومية. توفي عام 1123م.


المجلة العربية العلمية للفتى

هو أول وهي المثلث الثاني
بلغت من العلياء كل مكان
المتنبّي

رأى قبل شجاعة الشجعان
إذا هما اجتمعوا لنفس حرّة

الزوايا الحاصلة عن تقاطع مستقيمين متوازيين مع مستقيم

استخدم




- لاحظ الشكل المقابل حيث $\widehat{xAu} = \widehat{yAv} = 90^\circ$
اذكر زاويتين متكاملتين.
اذكر زاويتين متنامتين.

1

في أيِّ شكل من الأشكال التالية الزاویتان \widehat{xAy} و \widehat{zAt} متقابلتان بالرأس؟


2



الزوايا الحاصلة عن تقاطع مستقيمين متوازيين مع مستقيم

لاحظ الشكل المقابل حيث I منتصف [AB] و $(Ax) \parallel (tt')$ ثم أجب بـ صحيح أو خطأ أمام كل مقترح.




3



- مناظرة الزاوية \widehat{xAy} بالنسبة إلى I هي $\widehat{tBy'}$
- مناظرة الزاوية \widehat{xAy} بالنسبة إلى I هي $\widehat{t'By'}$
- مناظرة الزاوية \widehat{xAy} بالنسبة إلى I هي $\widehat{t'By}$
- $\widehat{xAy} = \widehat{t'By'}$


استكشاف وأطباق

زواياً مترادفتان داخلية - زواياً متماثلتان - زواياً مترادفات من نفس الجهة في كل حالة من الحالات الثلاث التالية (xy) و (zt) مستقيمان (uv) ومستقيم قاطع لهما على التوالي في النقطتين A و B .



تطبيقات

لاحظ الشكل المقابل حيث ABC مثلث و (xy) مستقيم يقطع [AC] و [AB]



على التوالي في النقطتين I و J


(أ) أذكر زواياً مترادفتين داخلية بالنسبة إلى المستقيم (XY)

(ب) أذكر زواياً مترادفات من نفس الجهة إلى المستقيم (AC)

(ج) أذكر زواياً مترادفات داخليتين من نفس الجهة إلى المستقيم (BC)

الزوايا المتبادلة داخلية - مجموع أقيسة زوايا مثلث

نشاط 1



1) أنقل الرسم المقابل على كراسك حيث (xy) و (zt) مستقيمان متوازيان و (uv) مستقيم قاطع لهما على التوالي في النقطتين A و B.

2) عين النقطة I منتصف $[AB]$.

3) لتكن C نقطة من $[Ax]$ والنقطة D مناظرها بالنسبة إلى I

(أ) أذكر زاويتين متبادلتين داخلية

ب) ما هي مناظرة الزاوية $x\hat{A}B$ بالنسبة إلى I ؟

ج) أستنتج أن $\widehat{xAB} = \widehat{ABt}$

د) بين أن $\widehat{zBA} = \widehat{yAB}$

إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين داخليا متقايسستان

$\widehat{xAB} = \widehat{tBA}$ متبادلتان داخلية ولدينا $\widehat{zBA} = \widehat{yAB}$ متبادلتان داخلية ولدينا

نشاط 2

أ) أرسم مثلث ABC

ب) ابن المستقيم (xy) المار من A و المواري لـ (BC)

ج) ما هي الزاوية المتبادلة داخليا مع \widehat{ABC} ؟

د) ما هي الزاوية المتبادلة داخليا مع \widehat{ACB} ؟


ه) أنقل على كراسك ثم أكمل مايلي :


$$\widehat{ABC} + \widehat{BAC} + \widehat{ACB} = + \widehat{BAC} + =$$

مجموع أقيسة زوايا مثلث يساوي 180°


تطبيقات

أ) ABCD شبه منحرف أحسب الزاويتين \hat{A} و \hat{B} .






ب) لاحظ الشكل المقابل حيث الرباعي ROSE شبه منحرف
والمستقيمان (JS) و (ER) متوازيان.
أحسب أقيسة زوايا المثلث IRE



تأمل الشكل المقابل ثم أحسب a 2

نعتبر المثلث COQ حيث $\hat{Q} = 3 \times \hat{C}$ و $\hat{O} = 2 \times \hat{C}$
أكتب بدلالة \hat{C} مجموع أقيسة زوايا هذا المثلث.

أحسب \hat{C} و \hat{O} و \hat{Q} .
أرسم هذا المثلث علماً وأن $CO = 5\text{cm}$



في الشكل المقابل ABCD. رباعي محدب
أنقل على كراسك ما يلي ثم أكمل بما يناسب

$$\begin{aligned}\widehat{ADC} &= \widehat{ADB} + \dots \\ \widehat{ABC} &= \widehat{ABD} + \dots \\ \widehat{BAD} + \widehat{ADC} + \widehat{DCB} + \widehat{CBA} &= \widehat{BAD} + \widehat{ADB} + \dots = 360\end{aligned}$$

مجموع أقيسة زوايا رباعي محدب يساوي 360°

نشاط 3

(1) أ) أرسم زاوية \widehat{xAy} قيسها 40° وعِين نقطة C من [Ax]

ب) أرسم نصف المستقيم $[Cz]$ بحيث $\widehat{ACz} = 40^\circ$ و $[Ay]$ ليسا من نفس الجهة بالنسبة إلى (Ax)


ج) تحقق أن المستقيمين (Ay) و (Cz) متوازيان

(2) أعد نفس المراحل أ و ب و ج باعتبار $\widehat{xAy} = 100^\circ$ ماذا تلاحظ؟

ليكن D و D' مستقيمين و Δ قاطعا لهما
إذا تقاييس زاويتان متبادلتان داخليا فإن D و D' متوازيان

تطبيقات

- 1 أ) أرسم مثلثا ABC حيث $BC = 5\text{cm}$ و $\widehat{ABC} = 70^\circ$ و $\widehat{ACB} = 50^\circ$
 ب) ابني خارج المثلث ABC المثلث ACD حيث $\widehat{ACD} = 60^\circ$ و $\widehat{ACB} = 50^\circ$
 ج) بين أن المستقيمين (AD) و (BC) متوازيان.



لاحظ الشكل المقابل حيث (zz') و (tt') متوازيان و (Ax) و (By) منصفي الزاويتين \widehat{zAB} و $\widehat{t'AB}$ وبين أن (By) و (Ax) متوازيان.

1


2

الزوايا المتماثلة


الزوايا الحاصلة عن تبادل مستقيمي متوازيين مع مستقيم

نشاط

- أ) أرسم مستقيمين (xy) و (zt) متوازيين و مستقيم (uv) قاطعا لهما على التوالي في النقاطين A و B
 ب) حدد زاويتين متماثلتين ثم بين أنهما متقايسitan
 ج) حدد زاويتين داخليتين من نفس الجهة ثم بين أنهما متكاملتان.




إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متماثلتين متقايسitan.
 (xy) و (zt) مستقيمان متوازيان و المستقيم (uv) قاطع لهما على التوالي في النقاطين B و A إذن الزاويتان \widehat{vAy} و \widehat{tBA} متماثلتان ولدينا $\widehat{vAy} = \widehat{tBA}$



إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين داخليتين من نفس الجهة متكاملتين.
 (xy) و (zt) مستقيمان متوازيان و المستقيم (uv) قاطع لهما على التوالي في النقاطين B و A إذن الزاويتان \widehat{uAy} و \widehat{tBA} داخليتان من نفس الجهة ولدينا $\widehat{uAy} + \widehat{tBA} = 180^\circ$


تطبيقات



تأمل الشكل المقابل حيث المستقيمان D و D' متوازيان.
بين أن المثلث ABC متقايس الضلعين.


1

- (أ) ابن شبه منحرف $EFGH$ قاعدته $[EH]$ و $[FG]$ بحيث $\widehat{EFG} = 30^\circ$ و $\widehat{EHG} = 150^\circ$
 (ب) أحسب \widehat{FGH} و \widehat{FEH}
 (ج) ما هي طبيعته؟



تأمل الشكل التالي حيث Δ و Δ' مستقيمان متوازيان
ثم حدد أقيسة الزوايا التي بها نقاط استفهام دون استعمال المنقلة.

3




يمثل الشكل المقابل مستقيمين (xx') و (yy')
و المستقيم (zz')

قاطعا لهما حيث $\widehat{zBy'} = \widehat{zAx'} = 40^\circ$

أنقل الشكل على كراسك بواسطة الورق الشفاف
تحقق أن المستقيمين (xx') و (yy') متوازيان؟

2 نشاط



في الشكل المقابل لدينا (xx') و (yy') مستقيمان


قاطعا لهما حيث $\widehat{zAx} = \widehat{zBy}$

(1) بين أن $\widehat{zBy} = \widehat{x'Az}$


(2) استنتج أن المستقيمين (xx') و (yy') متوازيان

ليكن D و D' مستقيمين و Δ قاطعا لهما
إذا تقايس زاويتان متماثلتان بالنسبة إلى Δ فإن D و D' متوازيان


تطبيقات




تأمل الشكل المقابل حيث $\triangle ABC$ و $\triangle IJK$ مثلاً
بين أن المستقيمين (AC) و (IK) متوازيان.




لاحظ الشكل المقابل.
ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (xy) و (zt) ؟



تأمل الشكل المقابل حيث $\triangle ABC$ و $\triangle CDE$ مثلاً
متقاييس الأضلاع
ما هي الوضعية النسبية لكل من المستقيمين (AB)
و (DE) والمستقيمين (AC) و (CD) ؟



تأمل الشكل المقابل. ما هي الوضعية النسبية
للمستقيمين (AC) و (ED) ؟
كذلك بالنسبة إلى المستقيمين (AF) و (BD) .




لاحظ الشكل المقابل حيث (xx') و (yy') متوازيان
و P نقطة من المستوى

1) في حالة P تنتهي إلى الشريط المحدود
بالمستقيمين (xx') و (yy')
بين أن $\widehat{x'AP} + \widehat{y'BP} = \widehat{APB}$

2) هل تتحصل على نفس النتيجة عندما تكون P
خارج نفس الشريط؟

الحل :

الطريقة الأولى



1 - ليكن (zz') المستقيم المار من P و الموازي لـ (xx')
لدينا المستقيمان (xx') و (zz') متوازيان و (AP) قاطع لهما.

إذن الزاويتان \widehat{zPA} و $\widehat{x'AP}$ متبادلتان داخلية وبالتالي

$$(1) \widehat{x'AP} = \widehat{zPA}$$

كذلك لدينا المستقيمان (yy') و (zz') متوازيان و (BP) قاطع لهما إذن الزاويتان $\widehat{y'PB}$ و \widehat{zPB} متبادلتان داخلية وبالتالي

$$(2) \widehat{zPB} = \widehat{y'PB}$$

الزاويتان \widehat{zPA} و \widehat{zPB} متجاوستان إذن

$$\widehat{APB} = \widehat{x'AP} + \widehat{y'PB}$$

ومن (1) و (2) نستنتج أن

الطريقة الثانية


$$\widehat{x'AP} + \widehat{y'PB} = 180^\circ - \widehat{BPA'}$$

$$= 180^\circ - \widehat{APB'}$$

$$= \widehat{APB}$$

2 - أدرس الوضعية عندما تكون P خارجة عن الشريط المحدود بالمستقيمين (xx') و (yy')

تمرين هدف بـ حل عدد 2



أرسم مثلثا ABC حيث $\widehat{C} = 80^\circ$ ، $\widehat{B} = 30^\circ$ ، $AB = 5\text{cm}$

(1) قم برسم تقريري وضع عليه المعطيات السابقة.

(2) هل يمكنك رسم الضلع $[AB]$ والزاويتين \widehat{B} و \widehat{C} مباشرة؟

(3) اقترح طريقة لبناء هذا المثلث.

الحل :

(1) الرسم التقريري


(2) لا يمكن بناء هذا المثلث مباشرة وفق المعطيات المقدمة لأنّه يمكن رسم قطعة المستقيم $[AB]$

والزاوية \widehat{B} لكن ليس لدينا بعد BC حتى يمكن رسم الزاوية \widehat{C}


نعلم أنّ مجموع أقيسة زوايا مثلث يساوي 180° ومنه نستنتج أنّ $\widehat{A} = 70^\circ$

(3) إذن لدينا $AB = 5\text{cm}$ و $\widehat{A} = 70^\circ$ و $\widehat{B} = 30^\circ$ وفي هذه الحالة يمكن رسم المثلث ABC


أحوصل




- الزاويتان \widehat{xAv} و \widehat{uBt} هما زاويتان متبادلتان داخلية بالنسبة إلى المستقيم (uv)




- الزاويتين \widehat{uAy} و \widehat{uBt} هما زاويتان مماثلتان بالنسبة إلى المستقيم (uv)



- الزاويتان \widehat{uBt} و \widehat{xAv} هما زاويتان داخليتان من نفس الجهة بالنسبة إلى المستقيم (uv)




- إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين داخلية متقايسitan
- مستقيمان و قاطع لهما يكونان زاويتين متبادلتين داخلية متقايسستان هما مستقيمان متوازيان




- إذا قطع مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متماثلتين متقايسستان
- مستقيمان و قاطع لهما يكونان زاويتين متماثلتين متقايسستان هما مستقيمان متوازيان

الزوايا الحاصلة عن تقاطع مستقيمي متوازيين متوازيين مع مستقيم

أحومد




- إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين داخليتين من نفس الجهة بالنسبة إلى القاطع متكاملتان




- مجموع أقيسة زوايا مثلث يساوي 180°
- مجموع أقيسة زوايا رباعي محدب يساوي 360°


تمارين




- 1 لاحظ الشكل التالي حيث $(xy) \parallel (BC)$ حيث $(AH) \perp (BC)$
- أذكر زاويتين متتامتين
 - أذكر زاويتين متكاملتين و غير متقابليتين
 - أذكر زاويتين متبادلتين داخليا




- 2 لاحظ الشكل التالي حيث $(yy') \parallel (zz')$ و $\widehat{xOy} = \widehat{x'Az'}$
- مستقيمان متوازيان
بين أن $\widehat{xOy} = \widehat{x'Az'}$



- 3 تأمل الشكل التالي حيث $(Ox) \parallel (Pz)$ حيث $(Oy) \parallel (Pt)$
و $\widehat{xOy} = \widehat{zPt}$
بين أن $\widehat{xOy} = \widehat{zPt}$



- 4 تأمل الشكل التالي :
ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (AB) و (DC) ؟



4

5

6

الزاوية	زاوية متبادلة داخلياً مع زاوية متساوية	زاوية متساوية لـ نفس الجهة مع زاوية داخليّة متساوية من نفس الجهة	زاوية داخليّة من نفس الجهة مع زاوية متساوية داخليّة
\widehat{yBg}			
\widehat{zCi}			
\widehat{fBi}			
\widehat{uCi}			

7

أ) أرسم مثلثا RST.

ب) ابن نصف المستقيم (Rz) منصف الزاوية $\hat{N} = 70^\circ$ و $\hat{P} = 55^\circ$ و عين النقطة E من \widehat{SRT} الذي يقطع (ST) في النقطة E

ج) ابن المستقيم(xy) المار من T و الموازي لـ

$\widehat{F}(RE)$

أ) بين أن $\widehat{SRE} = \widehat{RFT}$ و $\widehat{RTF} = \widehat{ERT}$

ب) ما هي طبيعة المثلث RFT ؟

8

أ) أرسم مثلثا SVT حيث $ST = 4\text{cm}$

و $VT = 8\text{cm}$ و $SV = 6\text{cm}$

ب) عين النقطة E من (TS) لا تنتمي إلى [TS] حيث $SE = 1,5\text{cm}$

ج) أرسم المستقيم(xy) المار من E و الموازي

لـ (VT) الذي يقطع (SV) في النقطة F.

د) قارن زوايا المثلثين SEF و SVT .


9

لاحظ الشكل التالي حيث

$(AE) \perp (AB)$ ، $\widehat{ACD} = 40^\circ$ ، $\widehat{CAB} = 130^\circ$

بين أن المستقيم (CD) عمودي على

المستقيم (AB)




10

أنقل الشكل التالي على كراسك حيث

$(xy) \parallel (BC)$

$\widehat{zAt} = \widehat{xAz}$ و $\widehat{tAy} = \widehat{BAx}$



11) أرسم مثلثا MNP حيث $NP = 7\text{cm}$ حيث

ب) ابن نصف المستقيم (Rz) منصف الزاوية

$\widehat{PE} = 3\text{cm}$ حيث [MP]

2) أـ ابن المستقيم المار من E و الموازي لـ

F (NP) الذي يقطع (MN) في

بـ أحسب \hat{E} و \hat{F} زاويتي شبه

المنحرف NPEF


12) لاحظ الشكل التالي حيث المستقيمان

$\widehat{IJK} = \widehat{yIs}$ و $\widehat{tJr} = 120^\circ$ و (zt) متوازيان و $\widehat{xy} = 120^\circ$

أـ يوجد كل من \widehat{IJK} و \widehat{IKJ} و \widehat{IyJ} معللا جوابك .

2) ما هي إذن طبيعة المثلث IJK ؟


3) ماذا يمثل \widehat{Iy} بالنسبة إلى الزاوية \widehat{SIJ} ؟



13) الدائرتان المقدمتان في الشكل التالي لهما نفس المركز O .

1) ما هو قيس كل من الزاويتين OMN و OQP ؟

2) ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (MN) و (PQ) ؟



14

الرئيسية U

- أرسم متوازي الأضلاع $OPQR$. منصف الزاوية \widehat{POR} يقطع (PQ) في E . بين أن $PE = QR$.

18

- أرسم متوازي الأضلاع $EFGH$. $\widehat{HEG} = 70^\circ$ و $\widehat{FGH} = 35^\circ$ حيث ما هي طبيعة المثلث EHG ؟


19

- (1) ارسم مثلثا EFG
 (2) ابن النقطتين H و I بحيث يكون الرباعيان $EFGH$ و $EFIG$ متوازيي الأضلاع.
 (3) ما هي طبيعة الرباعي $EFIH$ ؟

20

- (أ) تأمل الشكل التالي حيث $(xy) \parallel (zt)$
 أنقل الجدول التالي ثم أجب بصواب أو خطأ عن كل اقتراح من الاقتراحات التالية

21




	متجاورتان ومتتامتان \widehat{BAC} و \widehat{uAB}
	$\widehat{CDE} = \widehat{vBy}$
	$\widehat{xAu} = \widehat{zCu}$
	$\widehat{vBx} = \widehat{tDE}$
	متبادلتان داخلية \widehat{CDE} و \widehat{vBx}
	متمااثلتان \widehat{zCu} و \widehat{xAu}
	متقابلتان بالرأس \widehat{tDE} و \widehat{vBx}
	متكاملتان \widehat{CDE} و \widehat{vBx}

15

- (1) أرسم مثلثا RST غير قائم في T حيث $\widehat{RST} = 54^\circ$ ثم ارسم ارتفاعه $[RA]$.
 (2) هل أن (RS) و (AB) متوازيان؟ علل ذلك.

- (أ) تأمل الشكل التالي ثم حسب قيس الزاويتين \widehat{ACD} و \widehat{BAC} .
 استنتج طبيعة الرباعي $ABCD$.



17

- (1) أرسم زاوية xOy قيسها 120° ثم منصفها $[Oz]$.
 (2) عين نقطة A على (Oz) ونقطة B على (Oy) حيث $OA = OB$. بين أن (OX) و (AB) متوازيان.

3) نعتبر I نقطة تقاطع منصفاً الزاويتين \widehat{FGH} و \widehat{GIH} بين أن I تنتهي للمستقيم \widehat{Fx} . أحسب \widehat{GIH} .

4) الارتفاعان الصارحان من G و H يتقاطعان في النقطة J. أحسب \widehat{GJH} .

أرسم مثلث ABC متوازي الضلعين قمة A الرئيسية A ونقطة M من [AB]. المستقيم المار من M الموازي للمستقيم (BC) يقطع [AC] في النقطة N.

1) برهن أن $\widehat{ANM} = \widehat{ACB}$ و $\widehat{AMN} = \widehat{ABC}$ استنتج طبيعة المثلث ANM.

2) أرسم المستقيم المار من M الموازي للمستقيم (AC) الذي يقطع (BC) في النقطة F والمستقيم المار من N الموازي للمستقيم (AB) الذي يقطع (AC) في النقطة E. E و NE و MF و (BC) في النقطة O.

بين أن كل مثلث من المثلثات التالية متوازي الضلعين : OEF و BMF و CNE.


أرسم مثلث OPL ثم $[Px]$ و $[Ly]$ منصفي الزاويتين \widehat{P} و \widehat{L}

المستقيم المار من O و الموازي لـ $[Px]$ يقطع (PL) في D و المستقيم الموازي لـ $[Ly]$ و المار من O يقطع (PL) في E.


بين أن محيط المثلث OPL يساوي DE

رسمنا زاوية \widehat{OXY} إلا أن جزءاً من الورقة قد احترق.

ما هو قيس تلك الزاوية (أعط قيمة تقريبية) واذكر طريقة لإنجاز ذلك دون إتمام المستقيمين.




ب) تأمل الشكل التالي



أنقل الجدول التالي ثم أجب بصواب أو خطأ عن كل اقتراح من الاقتراحات التالية

	D و d متوازيان
	Δ و Δ' متوازيان
	$x = 48^\circ$

ج) تأمل الرسم التالي. هل أن [EG] و [FH] لهما نفس المنتصف؟ علل جوابك.



22

أ) - أرسم مثلث ENS حيث $\widehat{ENS} = 30^\circ$ و $\widehat{ESN} = 50^\circ$.

منصف الزاوية \widehat{SEN} يقطع (SN) في I.

ب) - أرسم المستقيم (xy) المار من N و الموازي للمستقيم (EI).

2) أحسب قيس كل زاوية من الزوايا التالية :

\widehat{ENy} و \widehat{SNx} و \widehat{SEN} .

23

1) أرسم مثلث FGH حيث $\widehat{FGH} = 70^\circ$ و $\widehat{FHG} = 46^\circ$. أحسب \widehat{GFH} .

2) ليكن (Fx) منصف الزاوية \widehat{GFH} و (FK) الارتفاع الصارع من F للمثلث FGH. أحسب \widehat{KFX} .

تقايس المثلثات



محمد بن زهر

هو أبو بكر محمد بن أبي مروان ، ولد بإشبيلية سنة 507 هـ. جرى على سدن آبائه من التتقف والأدب. انصرف في الشؤون الطبية إلى الناحية العملية، فكان حسن المعالجة، جيد التدبيين، لا يماثله أحد في ذلك. ولم يذكر من تأليفه إلا رسائله في طب العيون. وتتجدر الإشارة إلى أن شهرة أبي بكر بن زهر لا تقوم على إنجازاته في حقل الطب وحده، بل بصورة خاصة على شعره، لا سيما موسحاته المبتكرة التي كان فيها من المقدمين، وقد تتفق، إلى ثقافته الطبية العلمية، بثقافة فقهية لغوية أدبية متينة وعميقة. وله موسحه المشهور (أيها الساق) الذي انتشر في المغرب والشرق. توفي سنة 595 هـ

المجلة العربية العلمية للفتىان

وما نيل المطالب بالتمنٌ

ولكن تؤخذ الدنيا غالباً

أحمد شوقي

تقايس المثلثات

استخدم


1

1. أنقل الشكل المقابل.

(أ) ابن النقطة A' مناظرة النقطة A بالنسبة إلى (BC)؟

ب) بين أن $AC = A'C$ و $AB = A'B$

ج) بين أن $\widehat{BAC} = \widehat{BA'C}$




2. في الشكل المقابل لدينا : النقاط F و E و D على استقامة واحدة

و $(FG) \parallel (DC)$ و $(UG) \parallel (FC)$

(أ) بين أن $\widehat{EFG} = \widehat{FDC}$ و $\widehat{FEG} = \widehat{DFC}$

ب) بين أن $\widehat{EGF} = \widehat{FCD}$



استلش واطبق

1

نشاط

أرسم على ورق شفاف مثلثاً


أبعاده 6cm و 4cm و 3cm .

تحقق بواسطة الورق الشفاف

من تطابق المثلث الذي رسمته

مع كل من المثلثين ABC و EFG

التاليين.



مثلثان مقايسان هما مثلثان متطابقان

(3) قارن الأضلاع AB و EF ثم EG و AC ثم BC ثم FG .


(4) قارن الزوايا \hat{A} و \hat{E} ثم \hat{B} و \hat{F} ثم \hat{C} و \hat{G} .

(5) هل أن المثلثين MNP و ABC متطابقان؟

إذا تقاييس مثلثان فإن أضلاعهما مقايسة
مثنى مثنى وزواياهما مقايسة مثنى مثنى

166

في المثلثين ABC و EFG تنطبق القمة A على القمة E فنقول أن كلاً منها هي نظيرة الأخرى كما ينطبق الضلع $[AB]$ على الضلع $[EF]$ فنقول أيضاً أن كلاً منها هو نظير الآخر وتنطبق الزاوية \widehat{ABC} على الزاوية \widehat{EFG} فنقول كذلك أن كلاً منها هي نظيرة الأخرى.



تطبيقات

1

انقل الرسم المقابل على كراسك.

- ابن النقاط L' و M' و N' مناظرات L و M و N على التوالي بالنسبة إلى المستقيم Δ .
- تحقق بواسطة الورق الشفاف أن المثلثين LMN و $L'M'N'$ متقاريان.

2


- أرسم مثلثا ABC ونقطة O خارجة عنه.
- ابن النقاط A' و B' و C' مناظرات النقاط A و B و C بالنسبة إلى O .
- أثبت أن أضلاع المثلثين ABC و $A'B'C'$ متقاربة مثنى مثنى.
- أثبت أن زوايا المثلثين ABC و $A'B'C'$ متقاربة مثنى مثنى.
- تحقق بواسطة الورق الشفاف أن المثلثين ABC و $A'B'C'$ متطابقان.

3

- أرسم متوازي الأضلاع $ABCD$ ولتكن النقطة O مركزه.
- تحقق أن المثلثين AOB و COD متقاريان.
- تحقق أن المثلثين ABC و CDA متقاريان.

الحالة الأولى لتقاويس المثلثات

نشاط




- أرسم على ورق شفاف مثلثا MNP حيث $MN = 3\text{cm}$ حيث $\hat{M} = 25^\circ$ و $\hat{N} = 70^\circ$ و $\hat{P} = 70^\circ$

(2) تحقق أن المثلث الذي رسمته ينطبق على المثلث الذي رسمه أحد زملائك.

- يمثل الرسم المقابل مثلثا EFG

- أرسم مثلثا ABC حيث $BC = FG$ و $\hat{C} = \hat{G}$ و $\hat{B} = \hat{F}$
- تحقق أن المثلثين ABC و EFG متقاريان.

ماذا تستنتج؟




الحالة الأولى : يتقايس مثلثان إذا قايس ضلع والراويتان المجاورةتان له في أحدهما ضلعا والزاويتين المجاورةتين له في الثاني.

تطبيقات

1


- . أرسم زاوية XOY قيسها 40° ونقطة A من منصفها (Oz).
ب) ابن على (Ox) نقطة B وابن على (Oy) النقطة C حيث $C = 60^\circ$.
ج) بين أن المثلثين OAB و OAC متقايسان
د) استنتج أن $OC = OB$.

2



- لاحظ الرسم حيث Δ و Δ' مستقيمان متوازيان و $AB = CD$.
I نقطة تقاطع المستقيمين (CB) و (AD)
أ) بين أن المثلثين ABI و CDI متقايسان.
ب) استنتج أن النقطة I منتصف كل من [BC] و [AD].

تمرين هدف بحل :



- يمثل الشكل المقابل متوازي الأضلاع ABCD مركزه O و Δ مستقيما يمر من O ويقطع كلاً من (AB) في E و (CD) في F و (BC) في G و (AD) في H.
1) قارن المثلثين OBE و ODF. استنتاج أن O هي منتصف [EF]
2) بين أن O هي منتصف [GH].

الحل :

- (1) في المثلثين OBE و OFD لنا $\widehat{OEB} = \widehat{OFD}$ (زاويتان متقابلتان بالرأس) (زاويتان متبادلتان داخلية)
 $OB = OD$ ([DB] منتصف)

إذن المثلثان OEB و ODF متقايسان حسب الحالة الأولى لتقايس المثلثات وبالتالي $OE = OF$ وبما أن O و E و F على استقامة واحدة فإن النقطة O هي منتصف [EF].


- (2) في المثلثين OBG و ODH لنا $\widehat{OBG} = \widehat{ODH}$ (متبادلتان داخلية)
 $OB = OD$ ([BOG] متقابلتان بالرأس) و ([ODH] منتصف)

إذن المثلثان ODH و OBG متقايسان حسب الحالة الأولى لتقايس المثلثات وبالتالي $OG = OH$ وبما أن النقاط O و G و H على استقامة واحدة فإن النقطة O هي منتصف [HG].


الحالة الثانية لتقايس المثلثات

نشاط

- (1) أرسم على ورق شفاف مثلثا ABC حيث $AB = 4\text{cm}$ و $AC = 3\text{cm}$ و $\widehat{BAC} = 40^\circ$. ثم تحقق أن المثلث الذي رسمته ينطبق على المثلث الذي رسمه أحد زملائه.



- (2) يمثل الرسم المقابل مثلثا EGF
- (أ) أرسم مثلثا MNP حيث $\hat{M} = \hat{E}$ و $MP = EG$ و $MN = EF$.
- (ب) تتحقق أن المثلثين EGF و MNP متقابسان.
- (ج) ماذا تستنتج؟



الحالة الثانية : يتقايس مثلاً إذا قايس ضلعان والزاوية المحصورة بينهما في أحدهما ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في الثاني.

تطبيقات

- 1 أ) أرسم مثلثا ABC متقابس الضلعين قمته الرئيسية A


ب) عين على $[AB]$ نقطة M وعلى $[AC]$ نقطة N بحيث

ج) قارن المثلثين ANB و AMC . استنتج أن

- 2 أ) أرسم مثلثا ABC متقابس الضلعين قمته الرئيسية A . لتكن I نقطة

تقاطع منصفا الزوايتين \widehat{ABC} و \widehat{ACB} .

ب) بين أن $BI = CI$



لاحظ الشكل المقابل حيث $ABCD$ متوازي

الأضلاع $BM = DN$.

بين أن $AN = CM$

- 3 أ) أرسم زاوية حادة \widehat{xOy} ثم عين على (Ox) نقطتين A و B وعلى (Oy) نقطتين C و D


بحيث $OB = OD$ و $OA = OC$

ب) بين أن المثلثين OAD و OCB متقابسان.

ج) استنتاج أن $AD = BC$

الحالة الثالثة لتقايس المثلثات :

نشاط



(1) أ) أرسم على ورق شفاف مثلثا ABC حيث $AB = 3\text{cm}$ و $BC = 6\text{cm}$ و $AC = 5\text{cm}$.

ب) تحقق أن المثلث الذي رسمته ينطبق على المثلث الذي رسمه أحد زملائك.

(2) يمثل الرسم المقابل مثلثا

أ) أرسم مثلثا MNP حيث $MN = IJ$ و $MP = IK$ و $MN = IJ$.

ب) تتحقق أن المثلثين IJK و MNP متقابسان،

ج) ماذا تستنتج؟

	<p>الحالة الثالثة : يتقايس مثلثان قائمان إذا قايسست الأضلاع الثلاثة في أحدهما الأضلاع الثلاثة في الثاني مثنى مثنى.</p>
--	---


تطبيقات

أ) أرسم متوازي الأضلاع $ABCD$. المستقيم المارّ من C والموازي للقطر $[BD]$ يقطع المستقيم E في النقطة

(AD)

ب) ما هي طبيعة الرباعي $DBCE$.


ج) استنتج تقايس المثلثين DCE و ABD .



تأمل الشكل المقابل.

ب) بين أن المثلثين BIJ و AIJ متقابسان.

ج) استنتاج منصف الزاوية \widehat{AIB} ومنصف الزاوية \widehat{BIC} .



لاحظ الشكل المقابل


أ) في المثلث AOC ضلعان وزاوية مقاييسة لضلعين

وزاوية في المثلث BOC . حدد هذه العناصر.

ب) هل $\angle AOC$ و $\angle BOC$ مثلثان متقابسان؟ علل جوابك.

حالات تفاسير متشابهين قائمتين

نشاط 1 الحالة الأولى



يمثل الشكل المقابل مثلاً $\triangle ABC$ قائم الزاوية


في

أ) ابن مثلثاً $\triangle MNP$ قائماً في M بحيث $\hat{N} = \hat{B}$

و $NP = BC$

ب) بين أن $\hat{P} = \hat{C}$

ج) استنتج أن المثلثين $\triangle ABC$ و $\triangle MNP$ متقاربان.



الحالة الأولى : يتضمن مثلاً قائمان إذا قايس الوتر زاوية حادة في أحدهما الوتر وزاوية حادة في الثاني.

تطبيق

أ) أرسم مثلثاً $\triangle ABC$ متضادين الضلعين قمة الرئيسيّة A .

ب) أرسم الارتفاعين $[CC']$ و $[BB']$

ج) تأمل الرسم وحدد مثلاً متضادين ثم استنتج أن $BB' = CC'$


نشاط 2 الحالة الثانية


يمثل الشكل التالي مثلثاً $\triangle ABC$ قائم الزاوية في A .

أ) أرسم زاوية قائمة \widehat{xExy} ، عين على (Ex) نقطة F بحيث $EF = AB$

ب) أرسم قوساً دائرياً مركزه F وشعاعه BC الذي يقطع (Ey) في نقطة G .

ج) تحقق (بواسطة البركار) من أن $EG = AC$ واستنتج أن المثلثين $\triangle ABC$ و $\triangle EFG$ متقاربان.





الحالة الثانية : يتقايس مثلثان قائمان إذا قايس الوتر وضع قائم في أحدهما الوتر وضلعا قائما في الثاني

تطبيقات

- 1) أرسم زاوية قائمة \widehat{xAy} . لتكن B نقطة من $[Ax]$ و C من $[Ay]$ بحيث
- أرسم المستقيم Δ المار من B والعمودي على $[Ax]$.
 - أرسم المستقيم Δ' المار من C والعمودي على $[Ay]$.
 - المستقيمان Δ و Δ' يتتقعان في نقطة M . تأمل الرسم وحدد مثلثين متقايسين
 - استنتج أن نصف المستقيم (AM) هو منصف الزاوية \widehat{xAy} .
 - ما هو قيس الزاوية \widehat{CAM} .

- 1.1) أرسم دائرة \odot مركزها O ثم عين نقطتين A و B ينتميان إلى \odot وغير متقابلين قطريا.
- ب) ابن المماسين L في A و B الذين يتقاطعان في T .
- 2) بين أن $TA = TB$.
- ب) استنتاج أن (OT) هو الموسط العمودي للقطعة $[AB]$.
- 3) بين أن (TO) هو منصف الزاوية \widehat{ATB} .

تمرين مرفق بحل

- أ) أرسم متوازي الأضلاع $ABCD$ والنقطتين H و K المسقطين العموديين على التوالي L و C على (AB) و (DC) وبين أن $DH = BK$

الحل



في متوازي الأضلاع ABCD لدينا :

- (AD) موازي لـ (BC) والمستقيم (AB) قاطعا لهما إذن $\widehat{CBK} = \widehat{DAB}$ (زاويتان متماثلتان) (1)


- المستقيمان (AB) و (DC) متوازيان والمستقيم (AD) قاطعا لهما إذن الزوايتان \widehat{ADH} و \widehat{BAD} متبادلتان داخليا وبالتالي (2) $\widehat{BAD} = \widehat{ADH}$

من (1) و (2) نستنتج $\widehat{CBK} = \widehat{ADH}$

في المثلثين القائمين ADH و CBK لدينا $AD = CB$ (الوتران متقابسان) لأن $ABCD$ متوازي $DH = BK$ متقابسان مما ينتج عنه الأضلاع $ADH = CBK$ وبالتالي فإن ADH و BK متقابسان مما ينتج عنه

المثلث المتقابس الخلعين

نشاط 1




في الرسم التالي ABC مثلث متقابس الخلعين قمته الرئيسية A والنقطة H منتصف $[BC]$ قارن المثلثين ACH و ABH واستنتج أن :

(أ) (AH) هو الموسط العمودي لقطعة المستقيم $[BC]$

ب) (AH) هو منصف الزاوية \widehat{BAC}

ج) $\widehat{B} = \widehat{C}$



زاويا القاعدة في مثلث متقابس الخلعين متقابستان.

ملاحظة في مثلث متقابس الخلعين ABC (قمة الرئيسية A) الموسط الصادر من A ينطبق على الارتفاع الصادر من A . الموسط العمودي للقاعدة $[BC]$ يحمل منصف الزاوية \widehat{BAC} وكذلك الموسط الصادر من A

تطبيق


ارسم زاوية \widehat{xAy} ومنصفها (Az) . نقطة من (Az) مخالفة للنقطة A . المستقيم المار من I والعمودي على (Az) يقطع (Ax) و (Ay) على التوالي في B و C . بين أن $\widehat{B} = \widehat{C}$.




أَرْسِمْ مُثَلَّثًا ABC بِحِيثَ $\widehat{ABC} = \widehat{ACB}$. أَرْسِمْ مُنْصَفَ الزَّاوِيَةِ \widehat{BAC} الَّذِي يَقْطَعُ [BC] فِي النَّقْطَةِ I .

أَثْبِتْ أَنَّ $\widehat{AIB} = \widehat{AIC}$

2- أَثْبِتْ تَقَائِيسَ المُثَلَّثَيْنِ AIC و AIB وَاسْتَنْتَجْ أَنَّ المُثَلَّثَ ABC مُتَقَائِسَ الْضَّلَاعِينَ قَمْتَهُ الرَّئِيْسِيَّةِ A .



تَطْبِيقٌ



فِي الشَّكْلِ الْمُقَابِلِ ABC مُثَلَّثٌ مُتَقَائِسَ الْضَّلَاعِينَ قَمْتَهُ الرَّئِيْسِيَّةِ A و $(EF) // (BC)$ و $(OF) // (AC)$ و $(AB) // (OF)$

1- بَيْنَ أَنَّ المُثَلَّثَ AMN مُتَقَائِسَ الْضَّلَاعِينَ.


2- قَارِنْ المُثَلَّثَينِ BME و CNF .

3- أَسْتَنْتَجْ أَنَّ المُثَلَّثَ OEF مُتَقَائِسَ الْضَّلَاعِينَ.

المُثَلَّثَاتِ المُتَقَائِسَةِ الأَضْلاَعِ

أَرْسِمْ مُثَلَّثًا ABC مُتَقَائِسَ الْضَّلَاعِينَ قَيْسِ إِحدَى زَوَّاِيَاهُ 60° . بَيْنَ أَنَّ المُثَلَّثَ ABC مُتَقَائِسَ الأَضْلاَعِ وَأَنَّ قَيْسَ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَّاِيَاهُ 60° .

أَرْسِمْ مُثَلَّثًا ABC مُتَقَائِسَ الأَضْلاَعِ . بَيْنَ أَنَّ قَيْسَ كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَّاِيَاهُ 60° .



تَطْبِيقٌ

أ) أَرْسِمْ مُثَلَّثًا ABC قَائِمَ الزَّاوِيَةِ في A حِيثَ $\hat{B} = 60^\circ$ و $AB = 3\text{cm}$

ب) نَعْتَبِرُ النَّقْطَةَ D مَنَاظِرَةَ النَّقْطَةَ B بِالنَّسْبَةِ إِلَى A .


بَيْنَ أَنَّ المُثَلَّثَ BCD مُتَقَائِسَ الأَضْلاَعِ وَاسْتَنْتَجْ طَولَ أَحَدِ أَضْلاَعِهِ .

الخاصية المميزة لمنصف الزاوية - الدائرة المحاطة بمثلث.

نشاط 1

أرسم زاوية \widehat{xOy} وابن منصفها $[Oz]$ عين نقطة M من $[Oz]$ مخالفة للنقطة O . ابن النقطتين H و K المسقطين العموديين للنقطة M على التوالي على المستقيمين (Ox) و (Oy) قارن المثلثين OMH و OMK .
استنتج أن $MK = MH$.

تبعد كل نقطة من منصف الزاوية نفس البعد عن ضلعي تلك الزاوية.



نشاط 2


تأمل الشكل المقابل.

- أ) قارن المثلثين AMK و AMH .
ب) استنتاج أن \widehat{AM} منصف الزاوية \widehat{xAy} .

إذا كانت نقطة تبعد نفس البعد عن ضلعي زاوية فهي تنتمي إلى منصف تلك الزاوية.

نشاط 3

أرسم مثلثا ABC . المنصافان (Ax) و (By) يتقاطعان في نقطة O .
نعتبر M و N المساقط العمودية للنقطة O على التوالي على المستقيمات (AB) و (AC) و (BC) .
أ) أثبت أن $OM = ON = OP$ وأستنتاج أن O تنتمي لمنصف الزاوية \widehat{C} .
ب) أرسم الدائرة Γ التي مرکزها O وشعاعها OM . ماهي وضعيتها بالنسبة إلى أضلاع المثلث ABC ؟




تتقاطع منصافات زوايا مثلث في نقطة مشتركة هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث.

تطبيق


أرسم زاوية غير منبسطة \widehat{xOy} وعين نقطة A من (Ox) مخالفة للنقطة O ونقطة B من (Oy) بحيث $OA = OB$. المستقمان العموديان على (Ox) و (Oy) على التوالي في A و B يتقاطعان في نقطة M .

- أ) أثبت أن (OM) هو منصف للزاوية \widehat{xOy} .
ب) استخرج من هذا الرسم طريقة لبناء منصف زاوية.


أحومد




مثلاًن مقايسان هما مثلاًن أضلاعها مقايسة مثنى مثنى وزواياهما مقايسة مثنى مثنى.



الحالة الأولى : يتقايس مثلاًن إذا قايس ضلع والزاويتان المجاورتان له في أحدهما ضلعاً والزاويتين المجاورتين له في الثاني.




الحالة الثانية : يتقايس مثلاًن إذا قايس ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في أحدهما ضلعين والزاوية المحصورة بينهما في الثاني.




الحالة الثالثة : يتقايس مثلاًن إذا قايس الأضلاع الثلاثة في أحدهما الأضلاع الثلاثة في الثاني مثنى مثنى

تقايس المثلثات القائمة



الحالة الأولى : يتقايس مثلاًن قائمان إذا قايس الوتر و زاوية حادة في أحدهما الوتر و زاوية حادة في الثاني.



الحالة الثانية : يتقايس مثلاًن قائمان إذا قايس الوتر و ضلع قائم في أحدهما الوتر و ضلعاً قائماً في الثاني.

أحوصل


زاويتا القاعدة في مثلث متقارب الضلعين متقارستان.




إذا تقاييس زاويتان في مثلث فإن هذا المثلث متقارب الضلعين.



تبعد كل نقطة من منصف زاوية نفس البعد عن ضلعي تلك الزاوية.
إذا كانت نقطة متساوية البعد عن ضلعي زاوية فهي تنتمي إلى منصف تلك الزاوية.



تقاطع منصفات زوايا مثلث في نقطة مشتركة هي مركز الدائرة المحاطة بالمثلث.



تمارين

1. أرسم مثلثين متقابلين $\triangle ABC$ و $\triangle MNP$ بحيث $[AB]$ منتصف المستقيم المار من I و الموازي لـ (BC) يقطع (AC) في النقطة J .

ب) بين أن المثلثين $\triangle AIJ$ و $\triangle BIK$ متقابيان.
2. ما هي طبيعة الرباعي $IJCK$.
3. استنتج أن $BC = 2IJ$.


4. أرسم دائرة \odot مرکزها O و $[AB]$ حبلا لا يمر من O . منصف الزاوية \widehat{AOB} يقطع \odot في M .

5. قارن المثلثين $\triangle OBM$ و $\triangle OAM$.
6. استنتج أن $MB = MA$ وأن (MO) هو منصف الزاوية \widehat{AMB} .

7. تأمل الرسم التالي حيث المثلث $\triangle EFG$ متقابس الأضلاع.

و النقاط M و N و P تنتهي على التوالي إلى $[EF]$ و $[EG]$ و $[FG]$

$FM = GN = EP$ حيث
بين أن المثلثات $\triangle FMP$ و $\triangle GNM$ و $\triangle NEP$ متقابيسة مثنى مثنى
استنتاج طبيعة المثلث $\triangle MNP$



8. انقل الشكل التالي على كراسك حيث $\widehat{ADC} = \widehat{BCD}$ و $AD = BC$ رباعي و $\widehat{ABC} = 30^\circ$ و $\widehat{B} = 75^\circ$.


9. أرسم مثلثا $\triangle ABC$ قائم الزاوية في A حيث $\widehat{ABC} = 30^\circ$. المستقيم العمودي على (BC) في C يقطع (AB) في النقطة D .

ب) حدد في المثلثين $\triangle ABC$ و $\triangle DBC$ ضلعا و زاويتين متقابستان مثنى مثنى.

ج) ماذا تستنتج؟

تأمل الشكل التالي


أ) بين أن المثلثين $\triangle ADC$ و $\triangle ABC$ متقابيان.
ب) استنتج أن (AC) و (DB) متعمدان.



10. أرسم دائرة \odot مرکزها O و $[AB]$ و $[CD]$ قطران لها.

1. بين أن المثلثين $\triangle OAD$ و $\triangle OBC$ متقابيان.
2. استنتاج أن المثلثين $\triangle ABC$ و $\triangle ADB$ متقابيان

11. لاحظ الرسم التالي حيث $ABCD$ متوازي الأضلاع و النقطتين I و J على التوالي منتصفين القطعتين $[AD]$ و $[AB]$.
1. بين أن المثلثين $\triangle FDI$ و $\triangle JAI$ متقابيان.
2. استنتاج أن $FI = IJ = JE$.




. أ) قارن المثلثين ADC و BCD .

ب) استنتج أن $BD = AC$


المستقيمان (AD) و (BC) يتقاطعان في E .

ما هي طبيعة المثلث EAB ؟



أ. بُين أن المثلثين OPA و OMB متقابisan.

ب) استنتاج أن المثلث POM قائم و متقابيس الضلعين



1. أرسم مثلثا EGF قائم الزاوية في E و النقطة I منتصف $[EF]$.

المستقيم العمودي على (EF) والمار من F يقطع (IG) في H .

1. قارن المثلثين EIG و FIH .


2. استنتاج أن $IH = IG$.

3. أ) قارن المثلثين FIG و EIH
ب) استنتاج أن $EH = FG$.

تأمل الرسم التالي حيث $ABDE \sim BCFG$


مربعان

بين أن $AG = DC$



لاحظ الرسم التالي حيث المثلثان EGF و MNP متقابisan

جد الأعداد x و y و z .



لاحظ الرسم التالي حيث $AB = AC$


1. قارن المثلثين ACK و ABH .


2. استنتاج أن $BK = CH$ و $BH = CK$.

تأمل الشكل التالي حيث (C) و (C') دائرتان لهما نفس المركز O .

1. بُين أن المثلثين HIO و AKO متقابisan.


2. ماذا يمثل المستقيم (AK) بالنسبة إلى الدائرة (C') ؟






تأمل الرسم التالي حيث $ABCD$ مربع و المستقيم (DM) مماس للدائرة \odot التي قطّرها $[AB]$.

20. هي نقطة تقاطع المستقيمين (OM) و (BC)
- أ. بين أن المثلثين OAD و OMD متقابليان $DM = DC$ استنتج أن
 - ب. بين أن المثلث CMR متقابلي الضلعين.



1. لاحظ الشكل التالي حيث LOT مثلث
- . $LO = LM$ و $LN = LM$.
 - . قارن المثلثين LON و LTM استنتاج أن $\widehat{LMT} = \widehat{LNO}$
 - . النقطة I هي نقطة تقاطع المستقيمين (ON) و (TM) .
 - . $\widehat{IMO} = \widehat{INT}$ أ. بين أن $MO = TN$ و
 - . ب. قارن المثلثين IOM و ITN . استنتاج أن $IM = IN$.
 - . ج. استنتاج أن (IL) منصف الزاوية \widehat{MIN} .



16. أرسم مثلثا MNP متقابلي الضلعين قمته الرئيسية M . منصف الزاوية \widehat{MNP} يقطع في A ومنصف الزاوية \widehat{MPN} يقطع في B .

2. قارن المثلثين NPA و NPB واستنتاج أن $MA = MB$

3. المستقيمان (NA) و (PB) يتقاطعان في I قارن المثلثين MIA و MIB .

4. استنتاج أن (IM) هو منصف الزاوية \widehat{AIB} .


17. أرسم مثلثا ROI متقابلي الضلعين قمته الرئيسية R . منصف الزاوية \widehat{ORI} يقطع في M . أرسم نقطة Q من $[RM]$ مغایرة لـ R و M . بين أن المثلث OQI متقابلي الضلعين.
- . بين أن (QM) منصف الزاوية \widehat{OQI} وأن M منتصف $[OI]$.

18. أرسم متوازي الأضلاع $ABCD$ ليكن O مركزه ولتكن النقطة E المسقط العمودي لـ D على (AC) والنقطة F المسقط العمودي لـ B على (AC)
- . بين أن المثلثين CBF و ADE متقابليان.
 - . استنتاج أن النقطة O منتصف $[EF]$.

19. لاحظ الشكل التالي حيث (AC) موازي $\widehat{BAC} = 90^\circ$ و $BD = AC$.
- . بين أن $AD = BC$.
 - . لتكن I منتصف $[AB]$.
 - . أ. قارن المثلثين ACI و BDI .
 - . ب. استنتاج أن I هي منتصف $[CD]$.




ب) قارن المثلثين LNM وMIF ثم استنتج
أن $LE = IF$



1. أ) أرسم مثلثا ABC قائم الزاوية ومتقابس الضلعين قمته الرئيسية A ثم أرسم AH ارتفاعه المنحدر من A
- ب) أرسم خارج المثلث ABC مستقيما (XY) يمر من A ولا يوازي (BC)
2. المستقيم المار من B والعمودي على (XY) يقطع (XY) في M والمستقيم المار من C والعمودي على (XY) يقطع (XY) في N
- أ) بين أن $HA = HB = HC$
- ب) قارن المثلثين ACN وAMB
- ج) استنتج أن $MN = BM + CN$
3. أ) قارن المثلثين BMH و ANH ماذا تستنتج بالنسبة إلى بقية العناصر التّنظيرية؟
- ب) بين أن المثلث MHN قائم الزاوية ومتقابس الضلعين.

1. أرسم زاوية قائمة \widehat{XOY} .
- أ) عين على Ox نقطتين A و B وعلى Oy نقطتين C و D بحيث $OA = OC$ و $OB = OD$ وبين أن $BC = AD$.
2. بين أن $MC = MA$
3. المستقيمان (BC) و(AD) يتقاطعان في M
- أ) قارن المثلثين BMA و DMC
- ب) استنتج أن $MA = MC$
- ج) استنتاج أن $\widehat{AOC} = \widehat{BOD}$



1. أ) أرسم مثلثا AIR متقابس الضلعين قمته الرئيسية A.

ب) أرسم الموسطين [II] و [RR'] ثم بين أن المثلثين R'IR و IIR' متقابسان.

ج) ماذا تستنتج بالنسبة لعناصر المثلثين؟

2. لتكن M نقطة تقاطع [II] و [RR'] .

بين أن المثلث MIR متقابس الضلعين.

3. برهن أن (MA) هو منصف الزاوية \widehat{IMR}

4. المستقيم المار من A والموازي لـ (IR) يقطع (II) في F و (RR') في E.

بين أن $IE = RF$ و $ME = MF$

23

لاحظ الشكل التالي حيث M منتصف \widehat{LI}

و (Ax) منصف الزاوية \widehat{LAI} . المستقيم المار من M

والعمودي على (AL) يقطع (AL) في E و (AI)

في F و (Ax) في J.

أ) بين أن المثلث AEF متقابس الضلعين

ب) استنتاج أن (Ax) هو الموسط العمودي لـ $[EF]$.

2. المستقيم المار من L والموازي لـ (AI) يقطع

N في $[EF]$

أ) بين أن LEN متقابس الضلعين قمته الرئيسية L

دَبَاعِيَاتُ الْأَضْلَالِع



ابن الشاطر (704-777هـ)

هو أبو الحسن علاء الدين علي المعروف بابن الشاطر. عالم رياضيات وفلك اشتهر في القرن الثامن الهجري. تألق في فن تعليم العاج ، فكان يكتن بالطبع. وقد أكسبته هذه المهنة ثروة كبيرة، برع ابن الشاطر في علمي الهندسة والحساب، ولكنه لم يلبث أن اتجه إلى علم الفلك فأبدع فيه، وهذا يظهر من ابتكاراته للعديد من الآلات مثل الأسطرلاب، وصنع آلة لضبط وقت الصلاة سماها سالبيطس. أما أهم إنجازات ابن الشاطر فهي تصحيحه لنظرية بطليموس التي ترى خطأً أن الأرض هي مركز الكون، وقد أشار ابن الشاطر إلى أن الأرض والكواكب المتحيرة هي التي تدور حول الشمس بانتظام، والقمر يدور حول الأرض. ترك ابن الشاطر عدداً كبيراً من المؤلفات جلها في الفلك والرياضيات.

المجلة العربية العلمية للفتىان

أجد الكلام إذا نطقت فإنما

عقل الفتى في لفظه المسموع

رباعيات الأضلاع

استخدم

متوازي أضلاع هو رباعي متوازي فيه كل ضلعين متقابلين

ابن متوازي أضلاع CVR حيث:
 $\widehat{CLR} = 130^\circ$ و $LR = 3\text{cm}$ و $LC = 5\text{cm}$

- أرسم مثلثا EFG غير قائم و [EH] الارتفاع الصادر من E.
- ب) المستقيم Δ المار من G والموازي لـ (EF) يقطع (EH) في A والمستقيم Δ المار من F العمودي على (FG) يقطع Δ في B.
ما هي طبيعة الرباعي EFBA ؟

أنقل الجدول التالي على كراسك ثم ضع (x) في الخانة المناسبة :

القطران متعامدان	القطران متقابلين	القطران يتقاطعان في المنتصف	←
			في المربع
			في المستطيل
			في المعين
			في متوازي أضلاع

- أرسم متوازي أضلاع ABCD وعِنْ النقطة I منتصف قطعة المستقيم [AC].
- ب) ما هي مناظرة النقطة A بالنسبة إلى I ؟ استنتج مناظر المستقيمين (AB) و (BC).
- ج) ما هي مناظرة النقطة C بالنسبة إلى I ؟ استنتاج مناظر المستقيمين (BC) و (AD).
- د) استنتاج مناظرة النقطة B بالنسبة إلى I.
- هـ) بين أن $AD = BC$ و $AB = CD$ و $\angle A = \angle C$ و $\angle B = \angle D$.
- وـ) بين أن النقطة I هي مركز تناظر متوازي الأضلاع ABCD.


في متوازي أضلاع القطران
يتقاطعان في منتصفهما

في متوازي أضلاع كل ضلعين
متساوين متقابلين

في متوازي أضلاع :
 - كل زاويتين متتاليتين متساوين.
 - كل زاويتين متقابلتين متساوين.

- تأمل الرسم أسفله حيث ABCD متوازي الأضلاع.
- قارن المثلثين ABD و CDB.

- ما إذا يمكن أن تستنتج بالنسبة للأضلاع ABCD ؟
- أ) بين أن الزاويتين \hat{A} و \hat{D} متكاملتان والزاويتين \hat{B} و \hat{C} متكاملتان



1

2


3

4

5

6

من بين الأشكال التالية ما هي متوازيات أضلاع :




- أ) ابن مستطيلا طول أحد أضلاعه 5cm ومساحته 35cm^2 .
ب) ابن مستطيلا طول أحد أضلاعه $8,5\text{cm}$ ومحيطة 28cm .

7

في الرسم أسفله $ABCD$ شبه منحرف $ECBF$ مناظرها بالنسبة إلى النقطة I منتصف $[BC]$


- أ) بين أن النقاط D و C و E على استقامة واحدة وكذلك النقاط A و B و F .
ب) بين أن الرباعي $AFED$ متوازي أضلاع ثم احسب مساحته بدلالة a و b و h .
ج) استنتج مساحة شبه المنحرف $ABCD$ بدلالة a و b و h .

8



9

يمثل الرسم أسفله تصميما لقطعة أرض مستطيلة الشكل تشقّها طريق حافتها متوازيتان.
أبعادها على التصميم وفق السلم $1/500$ كما هو مبين بالرسم.
احسب أبعاد الحقيقية لقطعة أرض
احسب المساحة الحقيقية للطريق ثم استنتج طولها.




استكشف وأطّلِ

I- متوازي أضلاع

نشاط 1


تأمل الرسم أسفله حيث O مركز كل من الدائريتين (C) و (C') .
ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟ علل جوابك.



رباعي محدب قطراته يتقاطعون في
متصفهما هو متوازي الأضلاع.


نشاط 2

في الرسم المقابل $AB=CD$ و $AD=BC$.
أ) بين أن المثلثين ABD و CDB متقابيان.
ب) قارن \widehat{ADB} و \widehat{BDC} ثم \widehat{ABC} و \widehat{DBC} .
ج) ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟




رباعي محدب يتقابس فيه كل ضلعين متقابلين
هو متوازي الأضلاع.

تطبيقات



لاحظ الرسم المقابل حيث $AB=AC=CD$ و $(AB) \parallel (CD)$. ما هي طبيعة الرباعي $ABCD$ ؟



لاحظ الرسم المقابل حيث $ABCD$ متوازي أضلاع و $CN=AQ$ و $BM=DP$.

أ) قارن المثلثين AMQ و CPN ثم DPQ و BNM .


ب) استنتج طبيعة الرباعي $MNPQ$ ؟ ثم طبيعة الرباعي $MAPC$.

ج) استنتج أن المستقيمات (AC) و (MP) و (NQ) تتقاطع في نقطة.

1

2

نَشَاطٌ 3



لاحظ الرسم المقابل حيث $MNPQ$ رباعي محدب


و $MN \parallel PQ$ و $MN = PQ$ موازي لـ (PQ)

أ) لتكن O نقطة تقاطع المستقيمين (MP) و (NQ) .

قارن المثلثين MNO و PQO .

ب) استنتج أنَّ النقطة O منتصف القطعتين $[MP]$ و $[NQ]$.

ج) ما هي إذن طبيعة الرباعي $MNPQ$ ؟



رباعي محدب له ضلعان متوازيان و متقابيان
هو متوازي الأضلاع.


تطبيقات

1

أ) ارسم متوازي أضلاع $LION$ حيث $LI=7\text{cm}$ و $OI=4\text{cm}$ و عين النقطتين M من $[LI]$ و P من $[ON]$ حيث $LM=OP=3\text{cm}$

ب) ما هي طبيعة الرباعي $LMOP$ ؟

ج) عين النقطة Q من $[IO]$ حيث $IQ=1\text{cm}$ ثم أرسم باستعمال المسطرة فقط النقطة E بحيث يكون الرباعي $IQLE$ متوازي الأضلاع.



لاحظ الرسم المقابل حيث $ABCD$ و $BCFE$ متوازي الأضلاع.

بين أنَّ (AE) و (DF) متوازيان.

2

أ) ارسم مثلثاً ABC حيث $AB=6\text{cm}$ و $AC=4\text{cm}$ و $BC=3\text{cm}$ ثم عين النقطتين I و O منتصفى $[AB]$ و $[AC]$ على التوالي.

ب) ابن النقطة N مناظرة النقطة I بالنسبة إلى O .

ج) ما هي طبيعة الرباعي $ANCI$ ؟


د) استنتاج طبيعة الرباعي $BINC$ ثم حدد OI .

3

4

وحدة قيس الطول هي الصنتمر.

في الرسم المقابل لدينا $AD=3.2$ والمثلثان ABC و ADC لهما نفس المساحة وقيسها بالصنتمر المربع .
 $.AB=CD$ ($AB \parallel CD$) و BC ثم استنتج أن $\hat{A}=\hat{C}$




نشاط

لاحظ الرسم المقابل حيث $MNPQ$ محدب و $\hat{M}=\hat{P}$ و $\hat{N}=\hat{Q}$ محدب

$$(1) \text{ أحسب } 2\hat{P}+2\hat{N}+2\hat{M}+2\hat{Q}$$

(2) أستنتج أن الزاويتين \hat{M} و \hat{Q} من ناحية \hat{N} و \hat{P} من ناحية أخرى متكاملتان.

(3) استنتج طبيعة الرباعي $MNPQ$



رباعي محدب زواياه المتقابلة


متقائمة هو متوازي أضلاع

تطبيقات

1

أ) لاحظ الرسم المقابل ثم احسب أقيسة زوايا الرباعي $IJCK$.



ب) ما هي طبيعة الرباعي $IJCK$ ؟



لاحظ الرسمين التاليين وحدد في أي حالة

من الحالتين (1) و (2) الرباعي $EFGH$ متوازي أضلاع.

2



تمرين مدقق بحل

- أ) أرسم متوازي أضلاع EFGH مركزه O المستقيم المار من F والموازي لـ(EG) يقطع (EH) في A ويقطع (GH) في B
ب) بين أن F منتصف [AB]
ج) أرسم النقطة O مناظرة O بالنسبة إلى F . بين أن $OA=O'B$


الحل :

- أ) إنجاز الرسم
ب)
■ لدينا (BF) موازي لـ(EG) (حسب المعطيات)
■ $EFGH$ متوازي أضلاع إذن (EF) موازي لـ (GB)
وبالتالي الرباعي $EFBG$ متوازي أضلاع
■ لدينا (AF) موازي لـ (EG) (حسب المعطيات)
■ $EFGH$ متوازي أضلاع إذن (GF) موازي لـ (EH)
أي (GF) موازي لـ (EA)
وبالتالي الرباعي $AFGE$ متوازي أضلاع
 $FB=EG$ متوازي أضلاع إذن }
 $AF=EG$ متوازي أضلاع إذن }
■ لدينا A و F على استقامة واحدة $FB=EG=AF$ إذن النقطة F منتصف [AB].
ج) لدينا F منتصف [AB] وأي أن F منتصف [OO']
إذن الرباعي المدب $AO'BO$ قطراء يتقاطعان في منتصفهما و بالتالي هو متوازي أضلاع
و منه نستنتج أن $OA=O'B$.

II- متوازيات الأضلاع الخاصة

نماط 1

- أ) ارسم قطعتي مستقيم [GH] و [KL] متقايسين ومتقاطعين في منتصفهما O.
ب) ما هي طبيعة الرباعي GKHL ؟
ج) بين أن كلاً من المثلثين OGK و OKH متقايسين الضلعين.
د) احسب $\widehat{GKO} + \widehat{OKH}$ استنتاج إذن طبيعة الرباعي GKHL.



تطبيقات

لاحظ الرسم المقابل ثم بين أن الرباعي MAEL مستطيل

1

1. نريد بناء مستطيل IJKL حيث $\hat{I}J = 6\text{cm}$ حيث $\hat{I}J = 35^\circ$

2

(أ) ارسم مثلثا IJL وفق المعطيات السابقة.

(ب) أكمل بناء النقطة K.

2. ابن مستطيلا MNOP حيث $\hat{M}N = 4,5\text{cm}$ و $30^\circ = \hat{M}P$

3

ارسم متوازي أضلاع ABCD

ارسم المستقيم Δ المار من A والعمودي على (DC) والمستقيم Δ' المار من B والموازي لـ Δ المستقيمان Δ و Δ' يقطعان (DC) على التوالي في I و R
بين أن الرباعي ABRI مستطيل
استنتج أن $CD = IR$ و $CD = IR$

تمرين مرفق بحل

(أ) ارسم مثلثا ABC قائما في A . عين النقطة I منتصف الوتر [BC]. نريد أن نبين أن $IA = IB = IC$.

(ب) لتكن D مناظرة A بالنسبة للنقطة I ما هي طبيعة الرباعي ABDC ؟


(ج) استنتاج أن $IA = IB = IC$

(2) نريد أن نبين ما يلي: في مثلث MRS إذا كانت النقطة J منتصف الضلع [RS] تحقق فإن المثلث MRS قائم في M .

(أ) ارسم قطعة مستقيم [RS] ثم عين النقطة J منتصفها.

(ب) ارسم نقطة M مخالفة لـ R و S حيث $JM = JR = JS$

(ج) ما هي طبيعة المثلث MRS ؟ علل جوابك.



الحل :


(أ) الرسم

ب) لدينا في الرباعي $ABDC$ النقطة I منتصف $[BC]$
ونعلم أن A و D متناظرتان بالنسبة إلى I إذن I منتصف $[AD]$
وبالتالي الرباعي $ABDC$ متوازي أضلاع له الزاوية \hat{BAC} قائمة
إذن فهو مستطيل.


ج) لدينا في المستطيل $ABDC$ القطران متقاريان ويتقاطعان في منتصفهما I .
إذن $IA=IB=IC=ID$ وبالتالي النقاط A و B و C و D تنتهي إلى الدائرة التي
مركزها I .

(أ) و (ب) لاحظ الرسم.

(ج)



لتكن M' مناظرة النقطة M بالنسبة إلى J إذن J منتصف $[MM']$
النقطة J منتصف $[RS]$
إذن $RMSM'$ متوازي أضلاع (القطران يتقاطعان في منتصفهما)
لدينا $RS=MM'$ إذن $JR=JS=JM=JM'$
وبالتالي الرباعي $RMSM'$ هو مستطيل ومنه نستنتج أن
الزاوية \hat{RMS} قائمة والمثلث MRS قائم.



2


نشاط

لاحظ الرسم المقابل حيث $[RE] \parallel [MI]$ متعامدان في منتصفهما O .

أ) قارن MR و ME ثم IR و IE .

ب) قارن RM و RI .

ج) استنتج طبيعة الرباعي $MEIR$.



رباعي محدب قطران متعامدان ويتقاطعان في منصفهما هو معين
متوازي الأضلاع قطران متعامدان هو معين.

تطبيقات

أ) ارسم مثلثا ABC متقارن أضلاع النقاط I و J و K منتصفات [AB] و [BC] و [AC] على التوالي.

ب) بين أن المثلثين AIK و CJK متقارنان.

ج) استنتج طبيعة الرباعي BIKJ.

أ) ارسم دائرة مرکزها O و عين نقطتين A و B منها.

ب) عين النقطة O' مناظرة O بالنسبة إلى المستقيم (AB).

ج) ما هي طبيعة الرباعي OAO'B؟ علل جوابك.

عين نقطتين A و I حيث IA=5cm


ثم ابن النقاط B و C و D ليكون ABCD معينا مرکزه I و محیطه . 28cm

3

نشاط

أ) ارسم متوازي أضلاع ABCD حيث AB=AD

ب) بين أن ABCD معين.



تطبيقات

أ) ارسم مثلثا ABC متقارن الضلعين قمته الرئيسية A ثم عين نقطة M على [BC].


المستقيم المار من M والموازي لـ (AC) يقطع (AB) في D والمستقيم المار من M والموازي

لـ (AC) يقطع (BC) في E.

ب) بين أن DM=DB

ج) المستقيم المار من B والموازي لـ (AC) يقطع (ME) في F. بين أن (DF) عمودي على (BM).

1



في متوازي أضلاع $MNPQ$ [لدينا] $\hat{M} \hat{N}$ منصف الزاوية.

2

أ) قارن $\hat{P} \hat{N}$ و $\hat{M} \hat{P}$.

ب) ما هي طبيعة المثلث MNP ؟

ج) ما هي طبيعة متوازي أضلاع $MNPQ$ ؟

3 نشاط

هل أن الجمل التالية صحيحة؟ علل جوابك.

■ المربع هو متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان متقابسان و زاوية قائمة.

■ المربع هو مستطيل له ضلعان متتاليان متقابسان.

■ المربع هو معين له زاوية قائمة.

■ رباعي محدب أضلاعه متقابسة و له زاوية قائمة هو مربع.

	<p>رباعي محدب أضلاعه متقابسة و زاوياته قائمة هو مربع</p>
--	--

تطبيقات

1

أ) ارسم دائرة C مرکزها O .

ب) عين على C نقطتين A و B حيث $\hat{A} \hat{O} \hat{B} = 90^\circ$.

ج) الممسان للدائرة في A و B يتقاطعان في النقطة D . ما هي طبيعة الرباعي $AOBD$.


2

في كل حالة من الحالات التالية ارسم الرباعي المقترن حسب المعطيات ثم حدد طبيعته.

(1) الرباعي $PQRS$ حيث $PQ=QR$ و $PR=SQ$ و $SQ \perp PR$.

(2) الرباعي $EFGH$ حيث $[EG] \perp [FH]$ و $EFGH$ قطرا نفس الدائرة و $\hat{G} \hat{E} \hat{F} = 45^\circ$.

(3) الرباعي $CORD$ حيث المثلثان COR و RDC قائمان و متقابلا الضلعين.



لاحظ الرسم المقابل حيث $ABCD$ مربع و $AE=AC$.


3

أ) بين أن (CE) منصف الزاوية $\hat{A} \hat{C} \hat{D}$.

ب) أوجد أقيسة زوايا المثلث BCE .

مسائل إدماجية

مسألة 1



يمثل الرسم المقابل مثلثا ABC قائما في A حيث $AB < AC$ و $[AH]$ الارتفاع الصادر من A.

1. أ) أنقل الرسم على كراسك ثم عين النقطة E مناظرة B بالنسبة للنقطة H.

ب) بين أن المثلث ABE متقاريس الضلعين.

2. لتكن النقطة D مناظرة A بالنسبة إلى H. ما هي طبيعة الرباعي $ABDE$ ؟

3. بين أن $CA = CD$


4. المستقيم (DE) يقطع (AC) في F والمستقيم المار من D والموازي للمستقيم (AC) يقطع (AB) في النقطة L و (BC) في النقطة K.

أ) ما هي طبيعة الرباعي $AFDL$ ؟ استنتج أن $EF = BL$.

ب) بين أن $DC = DK = AK$

ج) بين أن المثلثين BKL و ECF متقارسان.

مسألة 2



يمثل الرسم المقابل مثلثا ABC و $[BH]$ الارتفاع الصادر من B.

1. أ) أنقل الرسم على كراسك

ب) أرسم المستقيم Δ المار من C والعمودي على (AC)

والمستقيم Δ' المار من H والموازي (BC). لتكن E نقطة تقاطع Δ و Δ' .


2. ما هي طبيعة الرباعي $BHEC$ ؟

3. منصف الزاوية $B\hat{H}E$ يقطع (BC) في F. بين أن $BH = BF$.

4. لتكن G نقطة من $[HE]$ حيث $HG = BF$. ما هي طبيعة الرباعي $BHGF$ ؟

5. لتكن النقطة K مناظرة E بالنسبة إلى C. بين أن $HK = BC$ استنتج طبيعة الرباعي $BHCK$.

مسألة 3



مثلث غير متقاريس الخلعين. منصف الزاوية $B\hat{A}C$ يقطع (BC) في النقطة D

المستقيم المار من B والموازي ل (AD) يقطع (AC) في نقطة E.

1. بين أن $AE = AB$.

2. لتكن النقطة F مناظرة E بالنسبة إلى A. المستقيمان (BF) و (AD)

يتقاطعان في نقطة I

بين أن I منتصف [BF].

3. لتكن H مناظرة النقطة A بالنسبة إلى I. بين أن (AF) موازي ل (HB) .



4. بيّن أنَّ الرباعي $AEBH$ متوازي أضلاع وأنَّ $AI = \frac{1}{2}EB$
 5. لتكن النقطتين M و N المسقطين العموديين للنقطة D على (AB) و (AC) على التوالي.


نرمز بـ A' للمسقط العمودي للنقطة A على (BC) .

أ) احسب بطريقتين مساحة المثلث ABD .

ب) احسب بطريقتين مساحة المثلث ACD .

$$\text{ج) استنتج أن } \frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$$

مسألة 4



يمثل الرسم المقابل مثلثا ABC قائم الزاوية في A

. ومربعين $ABDE$ و $ACFG$

1. أ) أنقل الرسم على كراسك.

ب) بيّن أنَّ النقطات A و D و F على استقامة واحدة.

2. المستقيم المارِّ من A والعمودي على (BC)

يقطع (BC) في H و (GE) في M .

أ) ما هي مناظرة الزاوية $\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ بالنسبة إلى (DF)

ب) بيّن أنَّ كلاً من المثلثين AME و AMG متقابس الضلعين.

ج) استنتاج أنَّ M منتصف $[EG]$

3. المستقيمان (DE) و (FG) يتقاطعان في K .

أ) بيّن أنَّ الرباعي $AEKG$ مستطيل.

ب) استنتاج أنَّ المستقيمات (AH) و (GF) و (DE) تتقاطع في نقطة واحدة.

4. لتكن P المسقط العمودي لـ D على (BC) و N المسقط العمودي لـ F على (BC)

أ) قارن المثلثين ABH و BDP ثم المثلثين ACH و CFN

ب) بيّن أنَّ $BC = PD + NF$

أحوصل

متوازي أضلاع هو رباعي يتواءزى
فيه كل ضلعين متقابلين

في متوازي أضلاع

- القطران يتقاطعان في منتصفهما.
- كل زاويتين مترافقتين متكاملتان وكل زاويتين مترافقتين متساويتان.
- كل ضلعين متقابلين متساويان.

رباعي محدب

قطراه يتقاطعان في منتصفهما هو متوازي أضلاع

رباعي محدب

زواياه المترافقان متساوية هو متوازي أضلاع

رباعي محدب

يتقاس فيه كل ضلعين متقابلين هو متوازي أضلاع

رباعي محدب


له ضلعان متوازيان متقابيان هو متوازي أضلاع




المستطيل هو رباعي له أربع زوايا قائمة




المستطيل هو متوازي أضلاع له زاوية قائمة




- في مستطيل القطران متقابسان ويتقاطعان في منتصفهما.
- كل رباعي محدب قطرانه يتقاطعان في منتصفهما ومتقابسان هو مستطيل




المعين هو رباعي أضلاعه الأربعة متقاربة




رباعي محدب قطرانه يتقاطعان في منتصفهما ومتعامدان هو معين



متوازي أضلاع له ضلعان متتاليان ومتقابسان هو معين



المربي هو رباعي أضلاعه متقاربة وزواياها قائمة



- رباعي محدب أضلاعه متقاربة وله زاوية قائمة هو مربع
- مستطيل له ضلعان متتاليان متقاربان هو مربع

نَهَارِيَه

ليكن متوازي أضلاع $EFGH$ مركزه O

$\hat{OFE} = 25^\circ$ و $\hat{HEF} = 25^\circ$

$EF = 5\text{cm}$

أ) أرسم المثلث OEF ثم متوازي أضلاع $.EFGH$

ب) أحسب \hat{FOE} ثم استنتج طبيعة المثلث $.OEF$

أ) أرسم مثلثا ABC متقارن الضلعين قمته الرئيسية A ثم عين نقطة D من $[BC]$.

ب) أرسم المستقيمين Δ و Δ' المارين من D والموازيين على التوالي $L(AC)$ و $L'(AB)$. يقطع (AB) في النقطة E و $L'(AC)$ في F .

ج) أحسب محيط الرباعي $AEDF$ بدلة AB

في كل حالة من الحالات التالية حدد الأبعاد والأقىسة المطلوبة في مستطيل $RECT$ مركزه I .

$EC=5\text{cm}$ ، $RE=7\text{cm}$ (1)

أحسب RT و TC


، $\hat{IER}=20^\circ$ ، $IE=2.2\text{cm}$ (2)

أحسب IR و ET و IC و IT و

TE ، $\hat{RIT}=40^\circ$ ، $RC=8\text{cm}$ (3)


أحسب IR و IE و IC و IT و \hat{TIC}

6




لاحظ الرسم المقابل حيث $DEFG$ متوازي الأضلاع
حدد الأبعاد ID و IE و OD و GE

7




تأمل الشكل المقابل حيث كل من $ABCD$ و $AECF$ متوازي أضلاع بين أن $EBFD$ متوازي أضلاع.

8



تأمل الرسم المقابل حيث $ABCD$ متوازي أضلاع والمستقيم Δ موازي $L(BD)$.
قارن BD و $PM+QN$.



لاحظ الرسم المقابل حيث $TSRU$ متوازي الأضلاع
حدد أقىسة الزوايا SUR و TUR و TUS و SRU

1

2

3

4

5

9


ليكن $ABCD$ مستطيلا حيث $AB=4\text{cm}$

$AD=3\text{cm}$

(أ) أرسم الشكل ثم عين نقطة E على $[AB]$ حيث $DE=6\text{cm}$. وعين النقطة F بحيث الرباعي $CDEF$ متوازي أضلاع.

(ب) احسب مساحة متوازي أضلاع $CDEF$

(ج) المستقيم المار من D العمودي على (CF) يقطعه في النقطة H . احسب DH .



13

لاحظ الرسم المقابل حيث :

- المستقيم Δ موازي لـ (BC) .
 - المستقيم (DE) موازي لـ (AB) .
 - المستقيم (DF) موازي لـ (AC) .
- بين أن $CE=BF$.

(أ) أرسم متوازي أضلاع $ABCD$ مركزه

14

ب) عين نقطة M من $[AB]$ ونقطة N

من $[CD]$ بحيث $AM=CN$

ج) بين أن النقطة O منتصف $[MN]$.

(أ) ابن متوازي الأضلاع $ABCD$.

ب) عين النقاط M و N و E و F بحيث : M و N على التوالي منتصفى $[AB]$ و $[DC]$.

النقطة E مناظرة N بالنسبة إلى M .

النقطة F مناظرة M بالنسبة إلى N .

ج) بين أن المستقيمين (AN) و (MC) متوازيان.

د) استنتج طبيعة الرباعي $BEDF$.

(أ) ابن متوازي الأضلاع $ABCD$ حيث

$\hat{B} > \hat{A}$. منصفا الزاويتين

$\hat{A}\hat{D}\hat{C}$ و منصفا الزاويتين

$\hat{A}\hat{B}\hat{C}$ و $\hat{B}\hat{C}\hat{D}$ يتتقاطعان في J

ب) قارن المثلثين AID و BJC واستنتج

أن $\hat{I}=\hat{J}$.

ج) بين أن $\hat{I}=\hat{J}$.

د) استنتج طبيعة الرباعي $AICJ$.

15

ابن معينا $ABCD$ مركزه O حيث $AC=2,4\text{cm}$

$BD=6,6\text{cm}$

عين النقطتين I و J على التوالي منتصفى $[OA]$ و $[OC]$

أحسب مساحتى $ABCD$ و $IBJD$. مازا تلاحظ ؟

10

(أ) أرسم متوازي أضلاع $IJKL$ والنقطة O منتصف $[IK]$.

ب) أرسم المستقيمين Δ_1 و Δ_2 العموديين على (IK) والمارين على التوالي من J و L . يقطع

(KL) في A و Δ_2 يقطع (IJ) في B .

ج) بين أن النقطة O منتصف $[AB]$.

د) استنتاج طبيعة الرباعي $IBKA$.

بين أن $\hat{A}=\hat{B}$.

11

16

ليكن $ABCD$ مربع حيث $AC=d$ و $AB=a$

أ) بين أن $2a^2 = d^2$.

ب) استنتاج مساحته إذا علمت أن $AC=10$ بالصنتمر.

12

17

أرسم مثلثا ABC . منصف الزاوية \hat{BAC} يقطع المستقيم(BC) في النقطة D.

أرسم المستقيم Δ المار من D والموازي لـ(AB). Δ يقطع(AC) في E.

قارن EA و ED .

لتكن F النقطة من [AB] حيث $BF=AE$. قارن EF و BD

18

ابن مستطيلا EFGH مرکزه I في كل حالة من الحالات التالية :

(ا) $\hat{HFG} = 55^\circ$ ، $EG=8\text{cm}$ و $EH=5\text{cm}$ ، (ب)

$\hat{EIF} = 110^\circ$ ، $EG=8\text{cm}$ و $EF=10\text{cm}$ ، (ج)

(د) $\hat{EIF} = 126^\circ$ ، $E\hat{G}H = 35^\circ$ و $EF=6\text{cm}$ ،

(ه) $IH=5\text{cm}$ ، $EF=8\text{cm}$ و $HG=9\text{cm}$ ،

$$(ز) EF = \frac{2}{3} EG$$

19

أرسم مستقيما (xy) وعِين نقطة O منه.

(أ) أرسم نصف مستقيم [Oz] غير عمودي على (xy)

(ب) ابن(Ov) و(Ou)[منصفي الزاويتين xOz و yOz على التوالي.

ثم عِين نقطة A من (Ou) ونقطة B من (Ov).

(ج) ابن النقطة C بحيث AOBC متوازي أضلاع.

(د) أحسب $u\hat{O}v$ واستنتج طبيعة الرباعي AOBC.

20

أنقل المعين المقابل على كراسك حيث

$$OI=OJ=1\text{cm}$$


عين النقاط A(-3,0) و B(0,-1) و

ثم ابن النقاط U و S و T بحيث

RSTU مستطيلا

▪ (AB) محور تناظر له.

▪ ومركزه نقطة ترتيبتها -2 .



21 أ) أرسم مستطيلا MNPQ مرکزه O
ب) ابن النقطتين E F مناظرتي N و Q

على التوالي بالنسبة إلى(MP) .

ج) ما هو مناظر المستقيم(NQ) بالنسبة

إلى (MP) ؟

د) استنتاج أن الرباعي ENFQ مستطيل.

ابن المعين ABCD في كل حالة من الحالات التالية :

$$AB=5,4\text{cm} \text{ و } AC=8,2\text{cm}$$

24 ب) AC=9,4cm ومحيطه يساوي 24,8cm

$$\hat{BCD} = 48^\circ \text{ و } AB=6,4\text{cm}$$

1) ارسم دائريتين C و' لها نفس المركز

A وشعاعهما على التوالي 6cm و 8cm

2) ارسم قطران [EF] من C وقطرا [GH] من

. (GH) \perp (EF) .

ما هي طبيعة الرباعي EGFH ؟ ما هي مساحته ؟

أ) أرسم قطعة مستقيم [AB] حيث

$$AB=4\text{cm}$$

ب) أرسم الدائريتين \mathcal{C} و \mathcal{C}' مرکزیهما على التوالي A و B ولهم نفس الشعاع 3cm .

ج) \mathcal{C} و \mathcal{C}' يتقاطعان في النقطتين C

و D . ما هي طبيعة الرباعي ACBD ؟

1) ارسم مستقيما Δ و نقطتين M و N

ليستا من نفس الجهة بالنسبة لـ Δ

ب) ابن نقطتين A و B بحيث يكون

. A $\in \Delta$ MANB معينا و Δ

ج) ما هما موقعى النقطتين M و N

اللذان لا تمكنان من بناء النقطتين A

و B ؟

2) اجب عن نفس الأسئلة بتعويض معين

بمستطيل.

26

- (1) أرسم مستطيلا ABCD .
- (2) ابن النقاط A' و B' و C' و D' حيث :
- مناظرة النقطة A بالنسبة إلى A'
 - مناظرة النقطة B بالنسبة إلى B'
 - مناظرة النقطة C بالنسبة إلى C'
 - مناظرة النقطة D بالنسبة إلى C'
- (3) بين أن الرباعي A'B'C'D' متوازي أضلاع.
- (4) بين أن مساحة الرباعي A'B'C'D' هي خمس أضعاف مساحة المستطيل ABCD

27

- (1) ارسم مثلثا ABC محيطه يساوي 21cm و $\hat{BAC} = 60^\circ$ و $AB=AC$
- (أ) نعتبر D و E مناظرتى النقطتين B و C على التوالى بالنسبة للنقطة A و F مناظرة النقطة A بالنسبة للمستقيم (BC) .
- حدد طبيعة الرباعيين BCDE و ABFC .
- (ب) احسب قيس كل زاوية من زوايا الشكل المتحصل عليه.

28

- ارسم دائرة مركزها I وقطريين منها [CD] و [AB] متعامدان.
- ما هي طبيعة الرباعي ACBD ؟

29

- (1) ارسم مستقيما D ثم عين نقطتين A و I بحيث $I \in D$ و $A \notin D$
- (2) ابن مربعا مركزه I بحيث يكون D محور تناظر له و A نقطة من أحد أضلاعه.

30

- (أ) عين نقطتين A و I ثم ابن النقاط B و C و D بحيث يكون ABCD مربعا مركزه I
- (ب) عين نقطة O ثم ابن مربعا RSTU مركزه O وطول ضلعه 6cm

الهرم والمخروط والكرة



ابن العوام

هو أبو زكريا يحيى بن محمد بن العوام الإشبيلي الأندلسي، عالم في الزراعة. كل ما نعرفه عنه أنه كان يعيش في إشبيلية في القرن السادس للهجرة. وقد درس العلوم المنتشرة في عصره والحيوان، والعلوم الزراعية القديمة. ألف كتاباً قيماً مشهوراً في الزراعة الأندلسية، دعاه (كتاب الفلاحة) الذي ترجم وطبع عدة مرات.

المجلة العربية العلمية للفتيان


يا جامع العلم نعم الذَّخْر تجمعه

لَا تعدلنَّ بِهِ دُرّاً وَلَا ذهباً


أبو الأسود الدُّؤلَى

الهرم والمخروط والكرة


استحضر




يمثل الشكل المقابل موسورا قائماً وجهاً جانبية مربعات.
احسب مساحته الجانبية.



حاوية أقلام شكلها الخارجي مكعب و الداخلي في شكل إسطوانة دائريّة قائمة كما يبيّنه الرسم المقابل.
ما هو حجمها؟






يمثل الرسم المقابل موسورا قائماً قاعدته في شكل شبه منحرف.
احسب ارتفاعه إذا علمت أن مساحته الجملية تساوي 66cm^2 .





يمثل الرسم المقابل علامة كيلومترية.
ما هي تكلفة تلوين العلامات الكيلومترية على طريق تربط بين مدینتين تفصلهما 125 km إذا علمت أن تكلفة تلوين المتر المربع الواحد هي 11,400 ديناراً؟

(1) احسب محيط قرص دائري شعاعه 3 cm

(ب) استنتج طول القوس \widehat{AB} في كلّ شكل من الأشكال (1) و (2) و (3)





- (2) احسب مساحة قرص دائري شعاعه 3cm
ب) استنتج مساحة كل شكل من الأشكال(1) و(2) و(3)
ج) احسب الزاوية $A\hat{O}B$ إذا علمت أن مساحة القطاع الدائري المقابل بالصنتمتر المربع تساوي $\frac{15\pi}{8}$.

- د) احسب الزاوية $A\hat{O}B$ إذا علمت أن محيط القطاع الدائري المقابل بالصنتمتر يساوي $\frac{8\pi}{3}$.



استلشف وأطّبّق

نشاط 1

ما هو بالنسبة لـ كل مجسم من المجسمات (1) و(2) و (3)

أ) شكل قاعدته ؟

ب) شكل أوجهه الجانبية ؟




نشاط 2

أ- يمثل الرسم المقابل مربعاً محاطاً بأربعة مثلثات متقاربة الضلعين.

ارسمه على ورق مقوى وفق أبعاده الحقيقية.


ب- قم بطي المثلثات على التوالي وفق أضلاع المربع للحصول على مجسم.



الهرم هو مجسم قاعدته مصلع وأوجهه مثلثات.

يسمى المجسم المتحصل عليه هرم ويسمى الشكل المقابل نشرا له.

تطبيقات



أي مجسم من المجسمات التالية يمثل هرماً؟

أنقل الجدول التالي وأكمله :

هرم ثانٍ	هرم أول	
7	عدد أوجهه الجانبية
.....	24	عدد أحرفه
.....	عدد قممه

1


2

3

4

3 نشاط

الهرم المخروط




الرسم المقابل يمثل نشراً للهرم.
انقله على ورق شفاف واصنعه.

هرم قاعدته مثلث يسمى
هرماً ثلاثياً


ارسم نشراً للهرم ثلاثي طول كل حرف منه 6cm .

المجسم (c) يسمى
مخروطاً دورانياً.



فيما يلي رسوم منظورية لأربعة مجسمات.
حدد من بينها الهرم والموشور والاسطوانة الدائرية القائمة.

يمثل الرسم المقابل نشراً لمخروط دوراني حيث $\hat{ASB} = 135^\circ$ حيث $SA=SB=8\text{cm}$




أ) أنقله على ورق مقوى وفق أبعاده الحقيقية.

ب) قم بقص الشكلين (1) و(2).

ج) ادْرِ الشَّكْل (1) حَوْلَ الشَّكْل (2) بِحِيثُ يُحيطُ

القوس الدائري المحدود بالنقطتين A و B بالقرص الدائري الذي مرکزه O.



مصطلحات


تسمى النقطة S قمة المخروط والقرص الدائري قاعدته.

تسمى قطعة المستقيم [SO] ارتفاعه.

تسمى قطعة المستقيم [SA] عدده.

المخروط الدوراني هو مجسم قاعدته قرص دائري وارتفاعه يمثل بعد رأسه عن مركز قاعدته.

تطبيقات



يمثل الرسم التالي نشراً لمخروط قطره 4 cm وطول عدده 6 cm.



أ) احسب محيط القاعدة.

ب) استنتج أن الزاوية \hat{ASB} تساوي 120°

1


2

في ما يلي مخروطاً دورانياً ونشرا له.




أ- احسب المساحة الجانبية لهذا المخروط الدوراني.


ب- احسب مساحته الجملية.



- يمثل الشكل المقابل نشراً للهرم قاعده مربع.
- رسمه على ورق مقوى وفق أبعاده الحقيقية واصنعه.
 - قم مع زميلين لك بتركيب مكعب باستعمال أحجاماتكم الثلاثة.
استنتج إذن حجم الهرم.



الهرم المخروطي




الحجم V للهرم مساحة قاعدته B وارتفاعه h هو :

$$V = \frac{1}{3} Bh$$



أي : طول الارتفاع \times مساحة القاعدة

$$V = \frac{1}{3}$$



- يمثل الشكل التالي نشراً للوجه الجانبي لمخروط دوراني قمته S .
- انقله على ورق مقوى واصنعه.

- ب) اصنع وعاء في شكل اسطوانة دائيرية قائمة بدون قاعدة شعاعها 3cm و ارتفاعها 4cm .
 ج) لاحظ أن الوعاء والمخروط لهما نفس الارتفاع .
 د) املأ الاسطوانة الدائرية القائمة بمسحوق مستعملوا الوعاء كوحدة كيل .
 ه) كم من مرّة ملئت الوعاء لتتمكن من ملء الاسطوانة الدائرية القائمة ؟



حجم المخروط :


$$V = \frac{\text{مساحة القاعدة} \times \text{طول الارتفاع}}{3}$$

أي :


$$V = \frac{\pi r^2 h}{3}$$

حيث ارتفاعه h و r شعاع قاعدته

تطبيقات



- يمثل الشكل المقابل مكعبا طول حرفه 6cm .
 I وJ وK هي منتصفات الأحرف [AB] و[FB] و[CB] على التوالي .
 ماذا يمثل حجم الهرم BIJK بالنسبة لحجم الهرم BAFC ؟




- 1) أحسب حجم الخزروف التالي حيث قطر الاسطوانة الدائرية 2cm وارتفاعها 5mm وقطر المخروط 15mm .
 2) ما هي كتلة الخزروف علماً أن كتلة الصنتمتر المكعب من الخشب الذي استعمل لصنعيه هي 0,8g ؟

1

2

أي هذه الأهرام له أكبر حجم؟

3




تأمل الشكل المقابل


4

أ- احسب h ارتفاع المخروط إذا كان له نفس حجم الهرم.

ب- احسب ارتفاع المخروط إذا علمت أن نسبة حجمه يمثل 65,44% من حجم الهرم.




الهرم المخروط



احسب ارتفاع الماء بهذا الوعاء
علماً أن x و y و z أعداد كسرية متناسبة
طريدا على التوالي مع 8 و 6 و 10.
وأن حجم الماء يمثل 87,5% من حجم الوعاء.

5





بين أن هذا الشكل هو نشرا لمخروط

6

احسب المساحة الجانبية S لمخروط طول عمه a وشعاعه r حيث


$$r=3\text{cm} \text{ و } a=6\text{cm}$$

برهن ارخميدس أن كل اسطوانة يكون فيها الارتفاع ضعف القطر تسع ثلث كرات لها نفس قطر الاسطوانة. استنتج حجم كرة قطرها $2R$.




تطبيقات

1




هل للجسمين التاليين نفس الحجم؟



2

احسب باللتر سعة الحوض الممثل في الشكل المقابل؟





3

يمثل الرسم المقابل مشكاة (قارورة ماء الزهر).

أ- احسب حجم ماء الزهر فيها.


ب- ما هي النسبة المائوية لماء الزهر بالمشكاة ؟

ج- ما هو ثمن هذه المشكاة إذا علمت أن ثمن اللتر الواحد من ماء الزهر يساوي تسعة دنانير وأن ثمن المشكاة وهي فارغة ديناران.



أهرامات الجيزة بمصر


رتب أحجام المجرسات التالية :



الكرة الأرضية



أحجام




- الهرم هو مجسم قاعدته مضلع وأوجهه مثلثات.

الحجم V لهرم مساحة قاعدته B وارتفاعه

$$V = \frac{1}{3} Bh \quad \text{هو : } h$$

$$V = \frac{\text{أي طول الإرتفاع} \times \text{مساحة القاعدة}}{3}$$




- المخروط الدواراني هو مجسم قاعدته قرص دائري وارتفاعه يمثل بعد رأسه عن مركز قاعدته.

$$V = \frac{\pi r^2 h}{3} \quad \text{حجم المخروط :}$$

حيث h ارتفاعه و r شعاع قاعدته أي

$$V = \frac{\text{مساحة القاعدة} \times \text{طول الإرتفاع}}{3}$$




- حجم كرة قطرها $2R$ هو

$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

نَهَارِيَه

أ) حدد من بين الأشكال التالية المجسمات التي تمثل نشرا لهرم




ب) ارسم متوازي الأضلاع ABCD

حيث $AD = 4\text{cm}$ و $AB = 8\text{cm}$

و $\hat{B}AD = 120^\circ$ واصنع به هرماً ثلاثي منتظم حرفه 4cm معللاً ذلك.

خيمة في شكل مخروط دوراني قطره 4m وارتفاعه 3m كم من شخص يمكن له الإقامة تحت الخيمة علماً أن كمية الهواء اللازمة لكل فرد للتنفس طبيعيا هي 2.5m^3 .

نعتبر المجسمين التاليين حيث $a > b$
قارن حجميهما



حول إلى اللتر(1) ثم إلى الديسلتر (dl) المقادير التالية :

أـ 250cl ، 24dal ، 633dam^3 ، 92cm^3


بـ 0.06m^3 ، 750ml ، 4hl ، 8.9m^3

أـ سلك من النحاس اسطواني الشكل قطره 2mm وطوله 1m . احسب حجمه.

بـ في 1mm^3 من النحاس يوجد 8.9×10^{19} ذرة كم هو عدد الذرات في ذلك السلك ؟

يمثل الشكل المقابل جزءاً من نشر لهرم أوجده الجانبية مثلثات متقابسة الضلعين وقاعدته مستطيل أنقله واتقم النشر.

حدد من بين الأشكال التالية ما هي التي تمثل نشرا لهرم ؟




يمثل الشكل المقابل مخروطاً دورانياً قمته S ومركز قاعدته O أحسب ارتفاعه OS ومساحته الجانبية إذا علمت أن مساحة قاعدته $625\pi\text{m}^2$ وحجمه $SA=65\text{m}$ 12500m^3

9


يمثل الشكل المقابل رسمياً منظورياً لهرم قمته S وقاعدته IJK مثلثاً قائماً في I.

- (1) أنجز نشرا له.
- (2) أحسب حجمه.




10

حدد من بين الأشكال التالية كل شكل يمثل نشراً للهرم



11

الشكل التالي يمثل نشراً لمخروط دائري قائم قمته S. أحسب طول القوس AB وشعاع قاعدته r



12


كرة القدم قطرها 24cm احسب حجمها.

13

هرم كيوبيس هو هرم قاعدته مربع ضلعه 233m وارتفاعه 146m.

إذا أخذنا الحجر الذي يكون هرم كيوبيس (لا نعتبر الفراغات التي بداخله) وأردنا أن نبني به سداً على شكل موشوراً قائماً ثلاثي القاعدة. سُمك السد 50m وطول أحد أضلع قاعدته 400m.

التوأمة في الفضاء



الإنطاكي

هو أبو القاسم علي بن أحمد الإنطاكي، الملقب (بالمجتبى) من أعلام القرن الرابع للهجرة. ولد في إنطاكية، وانتقل إلى بغداد، فاستوطنها حتى وفاته حوالي السنة 376 هـ، وكان من أصحاب عضد الدولة البويمي والمقدمين عنه. وكان على نبوغه، مشاركاً في علوم الأولئ. وأشار القسطي وابن النديم إلى عدد من آثاره، منها: (التحت الكبير في الهندي)، (تفسير الأرثماطيقي)، (شرح إقليدس)، (كتاب في المكعبات)، (الموازين العددية).

المجلة العربية العلمية للفتيا

تحيا البلاد إذا ما مسّها مطر
كما يحلي سواد الظلمة القمر

العلم يحيي قلوب الميتين كما
والعلم يجلّي العمى عن قلب صاحبه


ابن عبد ربّه

التواءز في الفضاء


استخدم

1


لاحظ المجسمات التالية ثم انقل الجدول أسفله وأكمله :




(a)




(b)



(c)




(d)



(e)

المجسم	(e)	(d)	(c)	(b)	(a)
اسمه					
عدد قممه					
عدد أحرفه					
عدد أوجهه الجانبية					
شكل قاعدته					
عدد أحرفه الخفية					
عدد أوجهه الخفية					



ارسم على كراسك شكلاً منظوراً لمكعب



2

انقل الشكل المقابل ثم أكمله لتحصل على رسم
منظوري للهرم ABCD

3

يمثل الرسم المقابل ثلاثة أحرف لمتوازي
المستويات ABCDA'B'C'D' انقله وارسم
بقية أحرف المجسم.

4



يمثل الرسم المقابل ثلاثة أحرف لموشور قائم
ABCA'B'C'
انقله وارسم بقية أحرف المجسم.


5

استكشف وأطّبِق

المستوي في الفضاء


نشاط 1

أ - أصنع من الورق المقوى مجسماً (S) في شكل موشور قائم ABCA'B'C' وصفيحتين مستطيلاتي الشكل (P) و (Q) كما هو مبين أسفله.




بـ- ضع الصفيحة (P) ملائمة لأحد أوجه المجسم (S).
لاحظ أن كل نقطة من الوجه تنطبق على نقطة من الصفيحة (P) فإذا تصورنا الصفيحة غير محدودة الجهات نحصل عندئذ على مستوى نرمز له بـ P وهو مستوى ذلك الوجه.

(S)



نقول إن الصفيحة (P) تمثل مستوى P وكذلك الصفيحة (Q) تمثل مستوى Q وأن كل وجه من (S) يحدد مستوى من الفضاء.


نشاط 2




أ) ضع الصفيحة (P) ملائمة للقمم الثلاثة A و B و C من الجسم (S) ولا حظ أن كل نقاط الوجه ABC قد التصقت بالصفيحة أي أن مستوى الوجه ABC و مستوى الصفيحة (P) ينطبقان.

بـ) ضع الصفيحة (Q) ملائمة للقمم A' و B' و C' من الجسم (S). ماذا تلاحظ؟

نرمز للمستوى المحدد
بالنقاط A و B و C بـ (ABC).



ثلاث نقاط من الفضاء ليست
على استقامة واحدة تحدد
مستوى واحدا.



يمثل الشكل المقابل مكعبا ABCDA'B'C'D' والمستوى (P) المحدد
بالنقاط E و F و G
1) اذكر مستويين تنتهي لهما كل من النقطتين
B و A


تطبيقات

1

- 2) اذكر نقاط من المكعب تنتهي إلى المستوى P وأخرى لا تنتهي إليه.
- 3 أ) هل أن النقطة E تنتهي إلى المستوى (ADH) ؟
- ب) هل أن النقطة B تنتهي إلى المستوى (ADH) ؟

مستقيم محتو في مستوى

نشاط 3




1) ضع الصفيحة (P) ملاصقة للقمتين A و A' من المجسم (S) .

هل توجد نقاط من $[AA']$ لا تنتهي إلى الصفيحة (P) ؟

هل توجد نقطة من المستقيم (AA') لا تنتهي إلى المستوى P ؟


كل نقطة من المستقيم (AA') تنتهي إلى المستوى P . نقول أن المستقيم (AA') محتو في المستوى P
ونكتب $(AA') \subset P$.

نقول عن مستقيم أنه محتو في مستوى إذا كانت كلّ نقاط هذا المستقيم تنتهي إلى ذاك المستوى
مستقيم Δ محتوي في مستوى P يعني كلّ نقطة من Δ تنتهي إلى P ونكتب $\Delta \subset P$.



إذا كانت لمستقيم نقطتان مشتركتان مع مستوى فهو محتو في هذا المستوى أي
إذا كان A و B نقطتين مختلفتين من مستوى P فإن $(AB) \subset P$

تطبيقات



لاحظ الشكل المقابل و انقل الجمل أسفله معوضا في كل مرة النقطة بأحد الرموز التالية :

$\in, \notin, \subset, \not\subset$

$M \dots (BEF)$ ، $A \dots (EFG)$


$A \dots (EBC)$ ، $(BM) \dots (AEF)$

$C \dots (DHF)$ ، $M \dots (ABG)$ ، $(FN) \dots (AEC)$

$(BN) \dots (BHC)$ ، $(GM) \dots (EFG)$

الوضعيّات النسبيّة لمستقيميّن

نشاط 4



يمثل الشكل المقابل متوازي المستطيلات . ABCDEFGH

أ) اذكر مستقيميّن محتويين في المستوى (ABC) ومتوازيين


ب) اذكر مستقيميّن محتويين في المستوى (BCG) ومتقاطعين.

ج) اذكر مستقيميّن محتويين في المستوى (ADH). ما هي وضعيّتها النسبيّة ؟

		<p>- مستقيمان من نفس المستوى هما متوازيان أو متقاطعان. - مستقيمان غير متوازيان وغير متقاطعين هما ليسا في نفس المستوى</p>
--	--	--

مستقيمان متوازيان هما مستقيمان محتويان في نفس المستوى
وغير متقاطعين

تطبيقات



لاحظ الشكل المقابل حيث M نقطة من [AB]

1) أ- ما هو المستوى الذي يحوي كلاً من المستقيميّن

(CM) و (AB) ؟

ب- ما هي الوضعية النسبيّة للمستقيميّن (CM) و (AB) ؟


2) أجب عن السؤال السابق بالنسبة إلى المستقيميّن المقدّمين في كلّ حالة من الحالات التالية :

(AF) و (EM) •

(EF) و (HG) •

(AB) و (HM) •

3) اذكر مستقيميّن متقاطعين وآخرين متوازيين في مستوى الوجه ABFE .




يمثل الشكل المقابل متوازي المستطيلات . ABCDEFGH .

1) أ- اذكر مستوى يحوي المستقيم (AD).

ب- اذكر مستوى يحوي المستقيم (CG).

ج- هل يوجد مستوى يحوي كلا المستقيمين (AD) و (CG) ؟
نلاحظ أن المستقيمين (AD) و (CG) غير متوازيين وغير متقاطعين نقول إنهم ليسا في نفس المستوى.


2) اذكر مستقيمين آخرين ليسا في نفس المستوى.



* مستقيمان في الفضاء يكونان في نفس المستوى أو لا .

* مستقيمان ليسا في نفس المستوى يكونان غير متوازيين وغير متقاطعين .

تطبيقات



يمثل الشكل المقابل هرما قاعده مربع.
انقل الجمل التالية وأكمل الفراغات بـ : متقاطعان أو متوازيان أو ليسا في نفس المستوى.

- (DC) و (SB) هما مستقيمان

- (BC) و (AD) هما مستقيمان

- (SO) و (AC) هما مستقيمان

- (DB) و (SC) هما مستقيمان

الوضعيات النسبية لمستقيم ومستوى


يمثل الشكل المقابل موسورا قائما ABCDEF .
ليكن P مستوى الوجه EFD .

أ. أكمل


$$(AE) \cap P = \dots$$

$$(BD) \cap P = \dots$$

$$(CF) \cap P = \dots$$




المستقيم (AE) قطع المستوى P في نقطة واحدة E .
نقول أن المستقيم (AE) والمستوى P متقاطعان في النقطة E .




إذا كان لمستقيم ومستوي نقطة مشتركة واحدة نقول أنهما متقاطعان في تلك النقطة.

نشاط 2



- 1 - لاحظ المجسم المقابل حيث
موشور قائم و(P) مستوي القاعدة ' .
أ) اذكر حرفًا ووجها ليس لهما نقطة مشتركة .
ب) هل أن المستقيم (AB) قاطع للمستوى P ؟
د) اذكر مستقيما آخر لا يقطع المستوى P ؟




عندما يكون مستقيم ومستوي غير متقاطعين نقول أنهما متوازيان

.2


- أ) اذكر مستقيماً محتوى في P وموازي لـ (AB)

إذا كان مستقيم مواز لمستقيم من مستوي فهو مواز لهذا المستوي.

- ب) اذكر مستقيماً محتوى في P وموازي لـ (AC) مازا تستنتج بالنسبة للمستوي والمستقيم (AC) ؟
ج) أثبت أن المستقيم (BC) و المستوى P متوازيان.



تطبيقات




يمثل الشكل المقابل موسورا قائما.

- اذكر ثلاثة مستقيمات قاطعة لمستوي الوجه $AA'B'B$
- هل أن المستقيم (BC) قاطع لمستوي الوجه $AA'F'F$
- اذكر ثلاث مستقيمات موازية للمستوي (ABC)
- هل أن المستقيم (BB') موازي للمستوي (EDE') ؟

مستويان متقطعان

نطاق 8



للحظ الرسم التالي حيث $ABCA'B'C'$ موسور قائم و P


مستوي الوجه $AA'B'B$ و (Q) مستوي الوجه $BB'C'C$

- بين أن المستقيم (BB') محتو في المستوى P وفي المستوى Q .

- هل توجد نقاط مشتركة بين المستويين P و Q لا تنتمي إلى (BB') ؟


نقول أن المستويين P و Q متقطعان ونكتب

$$P \cap Q = (BB')$$



إذا كانت A و B و C ثلات نقاط مشتركة بين مستويين متقطعين فهي على استقامة واحدة.

تطبيقات



يمثل الشكل المقابل متوازي المستطيلات $ABCDEFGH$
حدد تقاطع المستويين المقدمين في كل حالة :

- (DHG) و (ABC)
- (AEF) و (GBF)
- (CGH) و (DBF)

1

يمثل الشكل المقابل مستقيمين D و D' متقاطعين في


نقطة O ومحتوين في المستوى P .

نقطة لا تنتمي إلى المستوى P .


نعتبر المستوى Q المحدد بالنقطة M والمستقيم D

والمستوى R المحدد بالنقطة M والمستقيم D' .

حدد تقاطع المستويين Q و R .



تمرين مرفق بحل



(أ) انقل الشكل المقابل حيث

M و N نقطتان من المستوى P

و A و B و C ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة

ولا تنتمي إلى P و (MN) و (BC) غير متوازيين.

(ب) أثبت أن (BC) و P متقاطعان في نقطة K حيث

M و N على استقامة واحدة . عين النقطة K .

الحل :


(ب) تنتمي كل من النقطتين M و N إلى المستويين (ABC) و (P) .

إذن يتقاطع هذان المستويان وفق المستقيم (MN) $(ABC) \cap P = (MN)$

المستقيمان (MN) و (BC) محتويان في المستوى (ABC) و هما غير متوازيين إذن فهما متقاطعان في نقطة K .

وبما أن المستقيم (BC) غير محتوى في المستوى P فإنّه يقطعه في النقطة K : $P \cap (BC) = \{K\}$

النقطة K تنتمي إلى المستقيم (MN) وبالتالي فالنقاط M و N على استقامة واحدة.



مستويان متوازيان



نشاط

9

أ) ضع الصفيحة (P) ملائمة
للوجه ABC من المجسم (S) والصفيحة
(Q) ملائمة للوجه A'B'C' من نفس
المجسم كما في الشكل المقابل.

ب) هل هناك نقاط مشتركة بين
المستويين P و Q ؟

نقول أنهما متوازيان ونكتب: $Q \parallel P$ أو $P \parallel Q$



مستويان متوازيان هما مستويان غير متقاطعين

تطبيق 1

ليكن P و Q مستويان متوازيان.

أجب بـ "صواب" أو "خطأ" معللاً جوابك

أ) كل مستقيم من المستوي P هو موازي للمستوي Q

ب) كل مستقيم من المستوي Q هو موازي لكل مستقيم من المستوي P.


ćماریه مرفقة بحلول

ćماریه 1

يمثل الشكل المقابل هرما ثلاثيا ABCD ومستويها P موازيا للمستوي (BCD).

قطع المستقيم [AD] و [AC] و [AB] تقطع المستوى P على التوالي في I و J و K.

بين أن (IK) // (BD) // (CD) و (IJ) // (BC) و (JK) // (BD).



الحل

لدينا

* المستقيم (IJ) محتو في المستوى P


* المستقيم (BC) محتو في المستوى (BCD)

$$P \cap (BCD) = \emptyset$$

$$(BC) \cap (IJ) = \emptyset$$

و بما أن (IJ) و (BC) محتويان في نفس المستوى (ABC) فإن $(IJ) \parallel (BC)$.
بنفس الطريقة نبين أن $(IK) \parallel (BD)$ و $(JK) \parallel (CD)$.

تمرين 2



يمثل الشكل المقابل مستوىين متوازيين P و Q .
لتكن E نقطة من Q و A و C ثلاثة نقاط من P
ليست على استقامة واحدة.


- أ) بين أن المستويين (ABE) و (Q) متلقاطعان.
ب) نعتبر المستقيم Δ تقاطع المستويين (ABE) و (Q).
حدد $\Delta \cap (AB)$
ج) استنتج أن Δ و (AB) متوازيان.

الحل

- أ) لـ $A \in (ABE)$ و $A \notin Q$ إذا المستويين (ABE) و Q غير منطبقان.
وبما أن $E \in Q$ و $E \in (ABE)$ فإن المستويين (ABE) و Q متلقاطغان.
ب) $Q \cap (ABE) = \Delta$
 $\Delta \cap (AB) = \emptyset$ مستقيم محتو في المستوى Q و (AB) مستقيم محتو في المستوى P و نعلم أن $\Delta \cap (AB) = \emptyset$ إذن $\Delta \parallel (AB)$.
ج) بما أن Δ و (AB) محتويان في نفس المستوى (ABE) و لا يتقاطعان ($\Delta \cap (AB) = \emptyset$) فإنهما متوازيان.

تطبيق

2



في الشكل المقابل P و Q مستويان متوازيان
و R مستوى ثالث يقطع المستوى P وفق المستقيم D
ويقطع المستوى Q وفق المستقيم D' بين أن المستقيمين D و D' متوازيان.

تطبيق

3

ليكن D مستقىماً موازياً لمستوى P .
أجب بـ "صواب" أو "خطأ" معللاً جوابك.
كل مستوى موازي للمستقيم D هو موازي لمستوى P .

تمرين

3

يمثل الشكل المقابل متوازي المستطيلات ABCDEGH .
و M نقطة من [DH]

1) بين أن المستويين (AMG) و (BFG) متلقعان.

(2) ليكن $(AMG) \cap (BFG) = \Delta$
بين أن Δ و (AM) متوازيان.

3) أ- عين K نقطة تقاطع المستقيمين Δ و (BF) .

ب- بين أن $(AMG) \cap (ABF) = (AK)$
 $(AK) \parallel (MG)$


ج- بين أن $(AMGK)$ رباعي طبيعة .

4) استنتج طبيعة الرباعي ABGH .

5) بين أن الرباعي ABGH هو متوازي الأضلاع.

6) نعتبر O مركز متوازي الأضلاع ABGH


أثبت أن المستقيم (BH) هو قاطع المستوى (AMG) في النقطة O .



(1) يشترك المستويان (AMG) و (BFG) في النقطة G و هما غير منطبقان (A) تنتهي إلى المستوى (AMG) ولا تنتهي إلى المستوى (BFG) إذن هما متقاطعان.

(2) لنا $(AM) \cap \Delta = \emptyset$ إذا $\Delta \subset (BFG) \cap (AED) = \emptyset$ وبما أن Δ و (AM) محتويان في نفس المستوى (AMG) فإنّهما متوازيان.

(3) أ- انظر الشكل.



ب- يشترك المستويان (AMG) و (ABF) في نقطتين A و K ($K \in (BF)$ و $K \in \Delta$) $\Delta \subset (AMG)$ و هما غير منطبقان (G) تنتهي إلى المستوى (AMG) ولا تنتهي إلى المستوى (ABF) إذن هما متقاطعان وفق المستقيم (AK).

ج- لنا $(AK) \subset (ABE)$ و $(MG) \subset (DCG)$ و $(AK) \cap (MG) = \emptyset$ إذا $(ABE) \cap (DCG) = \emptyset$ وبما أن (AK) و (MG) محتويان في نفس المستوى (AMG) فإنّهما متوازيان.

(4) لنا (KG) و $(KG) \parallel (AM)$ إذن الرباعي AMGK هو متوازي أضلاع.


(5) نعلم أن الحرفين [AB] و [HG] متوازيان و متوازيان إذن الرباعي المحدب ABGH هو متوازي أضلاع.

(6) النقطة O هي مركز متوازي أضلاع ABGH إذن O هي منتصف القطعة [BH] و وبالتالي فهي تنتهي إلى المستقيم (BH).

و هي أيضاً منتصف القطعة [AG] و نعلم أن المستقيم (AG) محتو في المستوى (AMG) إذن O تنتهي إلى المستوى (AMG) وبالتالي فهي نقطة مشتركة للمستقيم (BH) والمستوى (AMG). النقطة B تنتهي إلى المستقيم (AG) ولا تنتهي إلى المستوى (AMG) إذن المستقيم (BH) غير محتو في المستوى (AMG) وبالتالي فهو يقطع المستوى (AMG) في النقطة O.


أحوميل

$P = (ABC)$




ثلاث نقاط من الفضاء
ليست على استقامة واحدة
تحدد مستوى واحد من
الفضاء

$B \in P$ و $A \in P$
 $(AB) \subset P$ إذن




إذا كانت لمستقيم نقطتان
مشتركتان مع مستوى فهو
محتو في هذا المستوى

إذا كان $D' \subset P$ و $D \subset P$
فإن $D//D'$ أو $D \cap D' = \emptyset$
متقاطعان




مستقيمان من نفس
المستوى هما متقاطعان أو
متوازيان.

$D \cap D' = \emptyset$
و D و D' غير متوازيين




مستقيمان ليسا في نفس
المستوى
هما مستقيمان غير
متوازيان و غير متقاطعين

$P//Q$



مستويان متوازيان هما
مستويان غير متقاطعين.

$P \cap Q = D$




مستويان متقاطعان
يتقاطعان وفق مستقيم

$D//P$



مستقيم و مستوى
متوازيان


$D \cap P = \{A\}$




مستقيم D يقطع
مستوى P في نقطة A

تمارين


- ج) بين أن المستقيم $(B'C)$ محتو في المستوى (BCC')
وأن $(B'C)$ و (CC') متقطعين.
- د) بين أن (N) و المستوى (ACC') متقطعين.
رسم النقطة I نقطة تقاطعهما.
- ه) ارسم النقطة J نقطة تقاطع المستقيم (BM)
و المستوى (ACC') .



- 1 يمثل الشكل أسفله مستوى P
محددا بمستقيم D وبنقطة A لا تنتهي إلى
نعتبر D مستقيما مارا من النقطة A
وقطعا للمستقيم D في نقطة B
بين أن المستقيم D محتو في المستوى P




- ارسم الشكل أسفله حيث :
ABCDEFHG
مكعبا و M نقطة من $[BC]$ و N نقطة من $[CG]$
أ) ما هي الوضعية النسبية للمستقيم (AM)
و المستوى (ADE) ؟
ب) ما هي الوضعية النسبية للمستويين (ADE)
و (BCF) ؟



- ج) ما هي الوضعية النسبية للمستقيم (AM)
و المستوى (BCF) ؟
د) بين أن المستقيمين (FM) و (CG) محتويان
في نفس المستوى.
ه) المستقيمان (FM) و (CG) يتقاطعان في نقطة I
رسم هذه النقطة.
و) عين نقطة تقاطع المستقيم (FM) والمستوى
 (DCG)
ز) بين أن المستقيم (BN) والمستوى (EFG)
متقطعان و عين النقطة J نقطة تقاطعهما.

- 2 يمثل الرسم أسفله مستويين متقطعين P و Q
ومستقيما D قاطعا لهما على التوالي في
 N و M
أ) حدد $P \cap D$ و $Q \cap D$
ب) انقل الشكل وأرسم المستقيمات (NB) و (NA) و (MA) و (AB) .




- 3 انقل الشكل التالي حيث
موشورا قائما
 M نقطة من الحرف $[B'C']$ و N نقطة من
الحرف $[BC]$.
أ) ما هي الوضعية النسبية للمستقيم (AA')
و المستوى (BCC') ؟
ب) استنتج أن المستقيمين (AA') و (MN) غير
متقطعين.

5

انقل الشكل التالي حيث

- * P' مستويان متقاطعان وفق المستقيم D
- نقطة تتنمي إلى D .
- D' مستقيم يقطع P في A ويقطع P' في B .
- (ا) ارسم Q للمستوى (ABC) .
- (ب) حدد $Q \cap P$ و $Q \cap D$.
- (ج) بين أن المستقيمين D و D' ليسا في نفس المستوى.




6

يمثل الشكل التالي متوازي المستطيلات

$ABCDEFGH$


- 1) حدد تقاطع المستويين (EGC) و (EDG) .
- 2) ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين (DF) و (EG) ؟
- 3) بين أن (AH) و (BG) متوازيان.
- 4) نعتبر I و J مركزي المستطيلين $ABFE$ و $BFGC$ على التوالي.
- بين أن المستويين (AFC) و (BEG) متقاطعان حسب المستقيم (IJ) .



7

يمثل الرسم التالي مستوى P و مستقيما D موازيا له.

- (أ) ارسم مستوى Q محتوا المستقيم D وقاطع للمستوى P حسب مستقيم D' .
- (ب) ما هي الوضعية النسبية للمستقيمين D و D' ؟
- (ج) ماذا يمكنك أن تستنتج؟




8


يمثل الشكل التالي مكعبا $ABCDEFGH$ حيث I و K نقطتان تتنمي على التوالي إلى أحرف $[AB]$ و $[BC]$ و $[AD]$.

- (1) انقل الشكل.
- (2) حدد تقاطع المستويين (ABF) و (BCG) .
- (3) أ- بين أن المستقيمين (JG) و (BF) متقاطعان
ب- استنتاج أن المستقيم (JG) والمستوى (ABF) متقاطعان و حدد O نقطة تقاطعهما.
- (4) ما هي الوضعية النسبية لكل من :
 - المستقيمين (EK) و (IJ) ؟
 - المستقيمين (KI) و (GJ) ؟
 - المستقيمين (HJ) و (DI) ؟
- (5) ما هي الوضعية النسبية للمستويين (AEH) و (GKH) ؟

9



- (1) يمثل الرسم التالي متوازي المستطيلات طول أحرفه 10 cm و 15 cm و 20 cm و C و J منتصفات ثلات أحرف من هذا الشكل.
أحسب حجمي الهرمين JIAKE و CEKBJ .
- (2) أ - بين أن كلا من الرباعي EJBK والرباعي IEKA متوازي أضلاع.
ب - استنتج طبيعة الرباعي IJBA .
- (3) بين أن الرباعي CDJI متوازي أضلاع.
ب - استنتاج طبيعة الرباعي ACDB .
- (4) أ - بين أن المستويين (ABC) و (IEC) يتقاطعان حسب المستقيم (CD) .
ب - بين أن المستويين (ABC) و (JDB) يتقاطعان حسب المستقيم (DB) .



- ليكن SABC هرما ثلاثيا قمته S و P مستويا موازيا للمستوى (ABC)
قطع المستقيم [SA] و [SB] و [SC] على المستوى P على التوالي في M و N و P .
أنجز رسمًا لذلك وبين أن (MP) // (AC) و (NP) // (BC) و (MN) // (AB) .

10